

**MÉDICO PLANTONISTA**  
**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS**

**Perguntas de um operário que lê**

**Bertold Brecht**

Quem construiu Tebas, a das sete portas?  
Nos livros vem o nome dos reis,  
Mas foram os reis que transportaram as pedras?  
Babilônia, tantas vezes destruída,  
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas  
Da Lima Dourada moravam seus obreiros?  
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde  
Foram os seus pedreiros? A grande Roma  
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem  
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio  
Só tinha palácios  
Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida  
Na noite em que o mar a engoliu  
Viu afogados gritar por seus escravos.

O jovem Alexandre conquistou as Índias  
Sozinho?  
César venceu os gauleses.  
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço?  
Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha  
Chorou. E ninguém mais?  
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos  
Quem mais a ganhou?

Em cada página uma vitória.  
Quem cozinhava os festins?  
Em cada década um grande homem.  
Quem pagava as despesas?

Tantas histórias  
Quantas perguntas

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua leitura, podemos AFIRMAR que:

- a) A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes feitos e grandes homens.
- b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”.**
- c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história.
- d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete portas”.



6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é:  
a) **Personificação**      b) Hipérbole      c) Metonímia      d) Eufemismo

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?

- a) Futuro do presente      b) Futuro do pretérito  
c) Pretérito imperfeito      **d) Pretérito perfeito**

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é:

- a) Pronome apassivador.      **b) Índice de indeterminação do sujeito.**  
c) Parte integrante do verbo.      d) Partícula expletiva.

9. *Compreendo o \_\_\_\_\_ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas e de \_\_\_\_\_.* Completa CORRETAMENTE às lacunas:

- a) Porquê, porque.      b) Por quê, porquê.      c) Porque, porquê      **d) Porquê, Porquê**

10. **NULA**

### PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Julgue os itens.

- I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos e instituições públicas.  
II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.  
III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar.

Estão CORRETAS:

- a) I e III.      b) I      c) II e III      **d) Todas estão corretas.**

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como:

- a) Estado de não doença.  
b) A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças.  
c) Estado de cura da doença.  
**d) Qualidade de vida da população.**

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário:

a) **Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento.**

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios.

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento.

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos.

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser:

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços público.

**b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público e privado).**

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público ou privado).

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços (público e privado).

15. O Princípio da \_\_\_\_\_ leva em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.

a) Equidade

b) Universalidade

**c) Integralidade**

d) Igualdade

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Está CORRETO:

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) I, III, IV

**d) Todos estão corretos**

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

**a) universalidade da cobertura e do atendimento.**

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com participação dos trabalhadores e dos empregadores.

18. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização.**

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS:

- a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade.
- c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.**
- d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO:

- a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde.
- b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.
- c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades coletivas.**

21. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA.

- a) O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação.**
- b) A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno.
- c) O início da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de complicações maternas.
- d) A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação antiretroviral.

22. Gestante com história de ter realizado apenas 1 dose de antitetânica há 4 anos atrás. Marque a opção ERRADA.

- a) Na dúvida da veracidade, deve fazer as três doses da vacina.
- b) Estando muito perto do parto poderá fazer as doses da vacina com intervalo menor.
- c) Deve completar o esquema vacinal com mais 2 doses.
- d) Tem que completar todo o esquema antes do parto.**

23. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com penicilina benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta correta.

- a) Tratar o parceiro.
- b) Deve ser memória imunológica.
- c) Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro.**
- d) Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos.

24. Sobre as doenças respiratórias. Marque a opção INCORRETA.

**a) As infecções respiratórias nas crianças nos primeiros anos de vida são mais bacterianas e exigem maior uso de antibióticos.**

- b) Criança com quadro de infecção respiratória aguda, com taquipneia e tiragem subcostal deve pensar em pneumonia.
- c) Criança com menos de dois meses de idade com pneumonia é mais recomendado a hospitalização.
- d) A ausculta pulmonar é de suma importância na propedêutica de criança com infecção respiratória aguda.

25. Senhor, 26 anos, residente de Reriutaba-Ce, chega à unidade de saúde, com história de febre, cefaleia, mal estar e dor abdominal. Há cerca de 4 (quatro) dias vem doente. Fez uso de analgésico no dia e refere melhora. Temperatura de 37,5°C e exantema maculopapular. PA deitada: 120 x 60mmHg. Marque a opção errada.

- a) Está recomendada a abordagem clínica como se fosse um caso de dengue.
- b) Está recomendado repouso no próprio domicílio e medicação sintomática para dor.**
- c) Está recomendada a solicitação de hemograma com contagem de plaquetas.
- d) Está recomendada a verificação da Prova do laço.

26. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e desidratação. Relata a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não melhorou. Marque a opção INCORRETA.

- a) Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de soro oral e aumentar a frequência da administração.
- b) Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade de saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).
- c) Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral iniciando com a fase rápida.**
- d) Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a alimentação sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite.

27. Senhora de 35 anos, alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Relata a paciente que mora com 2 filhos menores de 4 anos e com desnutrição leve. Marque a opção INCORRETA.

- a) Está recomendado pesquisar de tuberculose na dona Joana, solicitando o exame microbiológico do escarro.
- b) O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose e há necessidade de realizar Raio X de tórax.
- c) No caso da mãe com tuberculose, está recomendada a investigação nas crianças com a realização de exame físico, ppd e raio X de tórax.
- d) No caso da mãe com tuberculose com filhos assintomáticos, basta consultas periódicas de acompanhamento.**

28. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As fístulas perianais ocorrem mais tipicamente na doença de Crohn.
- b) Devem-se evitar procedimentos cirúrgicos extensos na doença de Crohn.
- c) O megacólon tóxico é complicação exclusiva da retocolite ulcerativa idiopática.**
- d) As fístulas perianais devem ser abordadas inicialmente por meio de tratamento clínico.

29. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando história de episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação líquida. Relata a mãe que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. Apresentando de alterado, ao exame, apenas um abdome doloroso difusamente à palpação. Marque a opção ERRADA.

- a) Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de líquidos.
- b) Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes.
- c) Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol.**
- d) Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto.

30. Criança de 12 anos de idade apresenta-se à consulta médica com história de tosse e falta de ar, que tem a levado algumas vezes à emergência para uso de medicação endovenosa. Relata ainda que há anos apresenta essas crises com frequência, que apresenta também quando pega poeira; atualmente vem com cerca de 3 vezes por semana, melhorando quando usa aerossol com broncodilatador. Marque a opção correta.

- a) Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide fora das crises.**
- b) Esse quadro é compatível com asma intermitente e a conduta está correta e deveria usar corticoide apenas nas crises agudas.
- c) Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide apenas nas crises agudas.
- d) Esse quadro é compatível com bronquite crônica e deve apenas introduzir antibiótico nas crises.

31. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que vem com quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA.

a) Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o teste ergométrico.

b) Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a dose do anti-hipertensivo.

c) Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o aumento da dose da medicação.

**d) Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o ECG e o raio X de tórax.**

32. Paciente de 58 anos de idade com história de dor torácica episódica que aparece durante o jogo de futebol e/ou quando fica irritado, dura em torno de 10 minutos, melhorando com o repouso. Ao exame físico não foi encontrado nenhuma alteração. Marque a opção CORRETA.

a) Nesse caso, o ECG normal exclui a hipótese de angina pectoris estável.

b) Nesse caso, o ECG não está recomendado, pois a primeira hipótese é de ansiedade generalizada.

c) Nesse caso, o ECG está recomendado, pois a primeira hipótese é de angina pectoris instável.

**d) A primeira hipótese é angina pectoris estável e o teste ergométrico está recomendado, mesmo com ECG normal.**

33. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, relata que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. Orientado, temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a opção ERRADA.

a) Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o tratamento antibiótico.

b) A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na idade do paciente e na gravidade do quadro clínico.

c) Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritograma e leucograma.

**d) A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se apenas na idade e no estado geral do paciente.**

34. Paciente, 50 anos de idade com história de dor torácica tipo angina e náuseas há 20 minutos. Sem história pregressa de coronariopatia, de episódio semelhante ou de qualquer outra patologia. Ao exame: pressão arterial de 120 X 70mmHg; ausculta cardiopulmonar e pulso normais. Marque a opção errada (incorreta).

a) Está recomendado a administração de 200mg de aspirina VO amassados ou mastigado.

b) Está recomendado o encaminhamento imediato para unidade hospitalar de referência.

c) Está recomendado a administração de 5mg de dinitrato de isossorbida sublingual.

**d) Está recomendado deixar o paciente em observação, sendo encaminhado se apresentar sinais de alteração cardiovascular.**



35. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de saúde com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas de idade gestacional. Marque a opção ERRADA.

- a) **Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio.**
- b) Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico diferencial.
- c) Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento.
- d) Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial.

36. Entende-se como câncer gástrico precoce:

- a) tumor sempre curável por ressecção endoscópica.
- b) tumor que se estende até a muscularis própria sem acometer serosa.
- c) **tumor que se estende até a submucosa com ou sem acometimento linfonodal.**
- d) tumor que do ponto de vista clínico é assintomático.

37. Paulo, 27 anos, técnico de eletricidade, apresenta queimadura de membro superior direito e tórax, após acidente de cabo de alta tensão. A respeito da queimadura elétrica pode-se afirmar, EXCETO:

- a) O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso.
- b) **A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico.**
- c) O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas.
- d) A mioglobínúria é causa frequente de insuficiência renal aguda.

38. Mário um pré-escolar de 2 anos que recentemente apresentou episódio de sangramento retal abundante. Seu pediatra solicitou uma cintilografia com pertecnetato de tecnécio, pois tinha como principal hipótese diagnóstica:

- a) invaginação intestinal.
- b) **divertículo de Meckel.**
- c) má-rotação com volvo.
- d) pólipos colônicos.

39. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame físico. Marque a opção CORRETA.

- a) Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar tratamento medicamentoso.
- b) Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas semanas que vem em uso.
- c) Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de tratamento medicamentoso.
- d) **Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica medicamentosa de uso crônico.**

40. Paciente com sintomas atípicos de refluxo gastroesofageano (rouquidão, tosse, estomatite) realiza endoscopia que não revela esofagite. Antes de planejarmos o tratamento, qual exame você indicaria?

**a) pHmetria com manometria esofágica.**

- b) manometria esofágica.
- c) cintilografia do esôfago.
- d) seriografia esôfago-estômago-duodeno (SEED).

41. O padrão-ouro para o diagnóstico de litíase urinária é:

- a) ultra-sonografia.
- b) pielografia intravenosa.
- c) tomografia computadorizada helicoidal sem contraste.**
- d) tomografia computadorizada helicoidal com contraste.

42. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento pré-natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e aumento dos níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares auxiliares, EXCETO:

- a) perfil biofísico fetal.**
- b) proteinúria de 24 horas.
- c) atividade antitrombina III.
- d) calciúria de 24 horas

43. Paciente de 50 anos é submetido à colecistectomia videolaparoscópica há 6 meses. Apresentou nesse período episódios de icterícia com regressão espontânea associada a discreta dor epigástrica. A principal hipótese etiológica é:

- a) estenose cicatricial .
- b) colangite esclerosante.
- c) coledocolitíase primária.
- d) cálculo residual.**

44. Em relação à DHEG, estão CORRETAS:

- I- As drogas de primeira linha no controle da emergência hipertensiva são a hidralazina, labetalol e nifedipina.
- II- Os anti-hipertensivos devem ser iniciados sempre que a pressão sistólica for superior a 140 mmHg.
- III- O uso de hipotensores previne o aparecimento das formas graves.
- IV- Os diuréticos são as drogas de escolha na presença de edema.

- a) I**
- b) I e III
- c) II
- d) II e IV

45. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a alternativa CORRETA.

- a) A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante autorização judicial.
- b) Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidade comprovada.
- c) É vedado durante o período da gestação, exceto em caso de necessidade comprovada.
- d) Todas as alternativas estão corretas.**

46. Na investigação diagnóstica de um caso de anemia foram encontrados os seguintes achados laboratoriais: HB = 9,5 g/dl; Ht = 29%, VCM = 86 fL (VN = 80-100); ferro sérico = 30 mcg/dl (VN = 30-160); saturação de transferrina = 15% (VN = 10-20); TIBC = 220 mcg/dL (VN = 228-428) e ferritina sérica = 650 ng/mL (VN = 30-300). Assinale a anemia mais provável de estar acometendo esse paciente:

- a) ferropriva  
**c) doença crônica**
- b) talassemia major  
d) megaloblástica

47. Qual dos medicamentos abaixo empregado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 reduz o índice de massa corpórea?

- a) pioglitazone      b) acarbose      c) glimepirida      **d) metformina**

48. Em relação ao sulfato de magnésio na DHEG, estão CORRETAS:

- I- Sua indicação deve se limitar aos casos de eclampsia, devido às elevadas taxas de intoxicação.  
II- O tratamento da intoxicação deve ser realizado com carbonato de cálcio.  
III- Presença de reflexos tendinosos exaltados sinaliza intoxicação.  
IV- O esquema de Sibai consiste na administração de 6 g EV em bolus, seguido de 3 g/hora EV em dose de manutenção.

- a) Nenhum item correto.**      b) Apenas uma opção.  
c) Apenas duas opções.      d) Três opções.

49. Uma paciente de 36 anos apresenta declínio importante da função renal nos últimos dias, sendo caracterizado quadro de insuficiência renal aguda (IRA). Seu médico formulou a hipótese de glomerulonefrite rapidamente progressiva e estava programando uma biópsia renal. Dos parâmetros urinários e sedimentoscopia descritos abaixo, qual melhor espelha essa condição?

- a) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade urinária baixa.  
b) Cilindros leucocitários; fração de excreção de sódio maior que 1%; osmolaridade urinária baixa.  
c) Cilindros granulosos largos; fração de excreção de sódio menor que 1 %; osmolaridade urinária alta.  
**d) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade urinária alta.**

50. Em relação à anemia ferropriva podemos afirmar, EXCETO:

- a) A protoporfirina eritrocitária apresenta níveis elevados.  
b) Esplenomegalia é encontrada em cerca de 5 – 10% dos casos.  
c) A poiquilocitose é evento terminal.  
**d) Raramente é causa de anemia na infância.**