



CONCURSO PÚBLICO ENFERMEIRO PADRÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01 Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 4,00 pontos cada questão, assim distribuídas:

Língua Portuguesa
05 questões

Conhecimento Específico
20 questões

02 Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

03 Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a **Folha de Respostas**. Verifique se os dados que aparecem na **Folha de Respostas** estão corretos. Caso contrário notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

04 Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

05 Tenha cuidado com a **Folha de Respostas** para não **dobrar, amassar** ou **manchar**. A **Folha de Respostas somente** poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão.

06 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão.

07 Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes da Folha de Respostas em branco.

08 Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta**, sem deixar claros, conforme exemplo:



09 **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo "calculadora", *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie.

10 Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida sobre as questões da prova.

11 O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova.

12 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova.

13 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

✂ Corte na linha pontilhada

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Respostas															
Questões	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Respostas															

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo com atenção para responder às questões, que possuem apenas uma alternativa correta.

Nobel é reconhecimento a multilateralismo

Mais do que um prêmio a Barak Obama pessoa física ou à gestão de ainda poucos meses do presidente democrata, o Nobel da Paz reconhece a importância do multilateralismo no mundo depois de oito anos da dupla Bush/Cheney, da mentalidade “nós contra eles”, das “guerras preventivas”, da “guerra ao terror”.

E nesse quesito – o multilateralismo, a iniciativa de privilegiar a diplomacia em vez da força, o diálogo com inimigos no lugar do isolamento e a participação em fóruns mundiais como um sinal positivo, não de enfraquecimento dos EUA -, Obama tem um trabalho de alguns anos para mostrar. Na verdade, o **democrata** fez sua campanha e se destacou dos concorrentes baseado nele.

Campanha que começou oficialmente em fevereiro de 2007 [...]

Nos meses seguintes, e até a eleição, ele manteve o discurso, bancando o risco de parecer “fraco” em relação à segurança nacional, **pecha** que os republicanos grudam com sucesso nos democratas há décadas, mas que dessa vez não colou.

Além disso, no primeiro mês à frente da Casa Branca, ele plantou o alicerce no qual pretende basear os quatro anos de Presidência, mandando fechar Guantánamo, proibindo a tortura e outras medidas de exceção, acenando já no discurso de posse com diálogo a regimes hostis como Irã e Coreia do Norte, lançando a semente de seu ambicioso plano antiproliferação de armas nucleares.

Quase nada saiu do papel, essa era **a crítica** ontem em Washington e **o motivo da surpresa**. [...]

Seja como for, o Nobel premiou a ideia de paz de Barak Obama. Foi por ela também que o político foi eleito.

(SÉRGIO DÁVILA, de Washington. Jornal Folha de São Paulo, Mundo. A favor. 10 de outubro de 2009. p. A13.)

01 Após a leitura, sabemos que o texto está organizado sobre a temática de

- (A) o prêmio Nobel da paz.
- (B) o conhecimento do multilateralismo.
- (C) a democracia do presidente americano.
- (D) a escolha de Obama como Nobel da paz.
- (E) as ideias de Obama sobre o enfraquecimento dos EUA.

02 O contexto é um grande auxiliar para a compreensão do texto. Nesse trecho jornalístico, observamos que o significado de alguns termos é contextual. No 2º parágrafo, o termo “**democrata**”, de acordo com o contexto em que se encontra, refere-se a

- (A) Bush.
- (B) Cheney.
- (C) Obama.
- (D) Concorrente.
- (E) Regime.

03 “**Pecha**” sabemos que se trata de uma “falha”. Sendo assim, esse termo (4º parágrafo) propicia maior coesão ao texto e recupera o sentido de

- (A) manutenção do discurso.
- (B) fraqueza aparente em relação à segurança.
- (C) coragem absoluta diante do enfraquecimento.
- (D) sucesso nos esclarecimentos sobre segurança.
- (E) democratas bancando as eleições há décadas.

04 **Além disso**” conecta-se ao parágrafo anterior para enfatizar que o presidente fez mais do que apenas discursar (4º e 5º parágrafos). Ele

- (A) plantou um plano lançando uma semente.
- (B) ficou à frente da Casa Branca no primeiro mês de sua presidência democrática.
- (C) baseou-se nos quatro anos da Presidência anterior para não correr o risco de parecer “fraco”.
- (D) proibiu os regimes que não tivessem o quesito do trabalhador.
- (E) tem um trabalho a fazer, mas não precisa mostrar dentro de alguns anos.

05 Sujeito, sabemos, é o termo sobre o qual falamos algo. Dessa forma, identifique-o respondendo qual é que era **a crítica e o motivo da surpresa** em Washington?

- (A) Plantar o alicerce da política nacional.
- (B) Ter uma visão do futuro e coibir abusos.
- (C) Poucas ideias de Obama terem saído do papel.
- (D) Práticas de atos relevantes à segurança nacional terem sido realizadas.
- (E) Tomar medidas plausíveis com os acontecimentos da atualidade em nível dos americanos.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

06 Manoel, 72 anos, foi admitido na sala de Recuperação Pós-anestésica, em POI de videolecistectomia. De acordo com o Índice de Aldrete e Kroulik, os parâmetros de avaliação a serem considerados são

- (A) temperatura / atividade motora / ritmo cardíaco.
- (B) hematócrito / capnografia / atividade elétrica cardíaca.
- (C) saturação de O₂ / pressão arterial / nível de consciência.
- (D) concentração de N₂O / frequência respiratória / pressão arterial média.
- (E) atividade elétrica cardíaca/ PVC/frequência respiratória.

07 José, 43 anos, foi admitido no setor como sintomático respiratório, com suspeita de Tuberculose pulmonar. É morador de rua, por isso, optou-se por internação para investigar o caso. É correto afirmar (FUNASA):

- (A) Se o primeiro BAAR der negativo, o paciente poderá receber alta.
- (B) Iniciar o tratamento específico imediatamente.
- (C) Realizar notificação à vigilância epidemiológica.
- (D) Instituir isolamento respiratório mesmo antes da confirmação do caso.
- (E) Proceder vacina BCG pois esse paciente não tem como comprovar sua vacinação anterior.

08 Clara tem 5 anos, pesa 17 kg e está internada com infecção por *Staphylococcus aureus* multirresistente. A prescrição médica solicita vancomicina 10mg/kg de 12 em 12 horas. Disponível frasco com 500 mg de vancomicina e diluente 10 ml. Analise as alternativas a seguir:

- I. A dose a ser dada a cada 12 horas é de 170 mg.
- II. Para infusão intravenosa da vancomicina após diluição do pó liofilizado, deve-se diluir a dose correta de novo em 100 a 200 ml de soluções como: soro glicosado a 5%, soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%); glicose a 5% e cloreto de sódio a 0,9%; lactato de Ringer.
- III. As doses administradas devem ser programadas para infusão intravenosa por um período de pelo menos 60 minutos.

Estão corretas as afirmativas.

- (A) Somente II e III
- (B) Todas estão incorretas
- (C) Todas estão corretas
- (D) Somente I e III
- (E) Somente I e II

09 Ana é admitida em trabalho de parto, evoluindo para parto normal sem distocia. Esse é seu primeiro filho. A irmã teve de tomar imunoglobulina humana anti-Rh. Ela quer saber se necessita também dessa imunoglobulina. A imunoglobulina humana anti-Rh deve ser administrada quando

- (A) mãe Rh negativo, bebê Rh positivo.
- (B) mãe Rh positivo, bebê Rh positivo.
- (C) mãe Rh negativo, bebê Rh negativo.
- (D) mãe Rh positivo, bebê Rh negativo.
- (E) Para a gestante Rh negativo, não imunizada em gravidez anterior, independentemente da tipagem sanguínea do recém-nascido.

10 De acordo com o Manual de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde, (Brasil, 2005), sobre hipertensão arterial na gestação e eclâmpsia, é incorreto afirmar:

- (A) Duas formas de hipertensão podem complicar a gestação: hipertensão pré-existente (crônica) e hipertensão induzida pela gestação (pré-eclâmpsia/eclâmpsia), que podem ocorrer isoladamente ou de forma associada.
- (B) A pré-eclâmpsia/eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª semana de gestação, classicamente, pelo desenvolvimento gradual de hipertensão e proteinúria.
- (C) A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato.
- (D) São indicativos de Emergência – pressão arterial diastólica maior ou igual a 110mmHg com presença de sintomatologia clínica: o controle pressórico deve ser rápido, em até uma ou duas horas. A impossibilidade de previsão na evolução do quadro impõe, como medida ideal, o encaminhamento e a internação da paciente para acompanhamento hospitalar.
- (E) A pré-eclâmpsia apresenta-se quando o nível da pressão arterial for menor ou igual a 140/90 mmHg, com proteinúria e após 20 semanas de gestação. Pode evoluir para eclâmpsia. É mais comum em nulíparas ou gestação múltipla.

11 A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados, independentemente da classe social. Sobre Dengue (Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança: Ministério da Saúde, 2008) é correto afirmar, exceto:

- (A) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico, na ausência de manifestações hemorrágicas.
- (B) Técnica para prova do laço: Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou sentada). Calcular o valor médio: $(PAS+PAD)/2$. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos em adultos (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses. Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças.
- (C) Instituir medidas de isolamento em todos os casos suspeitos.
- (D) Na dengue, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39°C a 40°C) de início abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem ser observados por dois a seis dias.
- (E) São sinais de alarme: Dor abdominal intensa e contínua, hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia.

12 O uso de sondas para suporte nutricional, é de extrema importância e reconhecido como fator definitivo na recuperação de doentes, especialmente nos idosos, pois permite o aporte de nutrientes. Sua indicação está também associada às patologias que levam a dificuldades na deglutição, impossibilitando a alimentação por via oral. Sobre sondagem nasoenteral é correto afirmar, exceto:

- (A) Infundir dieta de preferência em bomba de infusão, pois a infusão rápida pode levar a casos de distensão abdominal, diarreia e vômitos.
- (B) Durante a administração de dieta, infusões de líquidos e medicamentos – posicionar o paciente sentado e/ou, sendo acamado, manter cabeceira elevada por no mínimo 30 graus e não deitar o paciente logo após ingestão alimentar e hídrica.
- (C) Por ser muito fina, a sonda pode entupir-se facilmente, impossibilitando a administração da dieta enteral. Para evitar esse problema, deve-se injetar, com uma seringa, 40 ml de água na sonda, antes e após a administração da dieta ou de medicamento.

- (D) É importante que, diariamente, seja realizada a limpeza das narinas e a troca da fixação para evitar a formação de lesões na região.
- (E) O posicionamento da sonda enteral no estômago só pode ser determinado pela realização de radiografia.

Estão corretas as afirmativas:

13 A hiperbilirrubinemia neonatal é um evento frequentemente observado em recém-nascidos a termo e prematuros, resultante do aumento dos níveis séricos de bilirrubina total. A fototerapia é o recurso mais utilizado para o tratamento da hiperbilirrubinemia não-conjugada. Analise as alternativas abaixo.

- I. No tratamento da icterícia o objetivo principal é evitar o acúmulo de bilirrubina no cérebro, o que pode causar uma doença chamada Keirrisson, que traz grandes problemas ao desenvolvimento da criança.
- II. Alguns cuidados são necessários durante o tratamento fototerápico, tais como: a exposição apropriada do RN, que deve estar totalmente despido, a mudança de decúbito a cada quatro horas, a monitorização da temperatura axilar a cada duas horas, o balanço hídrico rigoroso e a proteção ocular.
- III. Outro método é a exosanguineotransfusão indicada para reduzir rapidamente a concentração de bilirrubina, quando há risco de acometimento do cérebro, especialmente se houver hemólise. A via de acesso preferencial é a veia umbilical.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) todas estão corretas
- (E) todas estão incorretas

14 Sobre Aleitamento Materno, é incorreto afirmar:

- (A) Recomenda-se que as crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuar a serem amamentadas até os 2 anos de idade.
- (B) São condições maternas em que é contraindicada a amamentação: infecção pelo HIV e Hepatite A e B.
- (C) Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
- (D) Deve-se encorajar a amamentação sob livre demanda.
- (E) A mãe que, comprovadamente, amamenta o filho tem direito a ser dispensada, em cada dia de trabalho, por dois períodos distintos de duração máxima de uma hora, para o cumprimento dessa missão.

15 Segundo o Programa Nacional de Imunização, é incorreto afirmar:

- (A) As vacinas produzidas com vírus ou bactérias atenuados não devem ser administradas ou imunossuprimidas com pacientes portadores de SIDA (AIDS) com sintomas, em quimioterapia ou transplantados.
- (B) São vacinas com vírus ou bactérias vivos atenuados: BCG, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e febre amarela.
- (C) Mulher grávida que esteja com a vacina antitetânica em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto.
- (D) A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
- (E) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) não deve ser administrada em mulheres de acima de 12 anos de idade.

16 Segundo o Programa Nacional de Imunização, é correto afirmar:

- (A) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- (B) Não pode ser administrada a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano antes dos 2 meses de vida.
- (C) O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano é de 8 semanas.
- (D) A Vacina BCG pode ser administrada a partir do nascimento, devendo ser administrado mais 2 doses de reforço.
- (E) A via de administração da vacina contra febre amarela é intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa; em crianças com mais de dois anos de idade, pode ser aplicada na região deltoide. Não deve ser aplicada na região glútea, pois a adoção desse procedimento se associa com menor produção de anticorpos, pelo menos em adultos.

17 A classificação de artigos usados na assistência ao paciente segundo o potencial de transmissão de infecção possibilita uma abordagem racional da indicação de desinfecção ou esterilização. Segundo essa classificação:

- I. artigos críticos são utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e em mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo todos os materiais diretamente conectados.
- II. os artigos não-críticos têm indicação de desinfecção de alto nível, no mínimo, não necessitando de esterilização.
- III. artigos semicríticos – entram em contato com pele não-integra ou mucosas íntegras (mucosa colonizada).

Assinale a alternativa correta.

- (A) Todas estão corretas
- (B) Somente I e III estão corretas
- (C) Somente I e II estão corretas
- (D) Somente II e III estão corretas
- (E) Todas estão incorretas

18 As cirurgias são classicamente categorizadas segundo o seu potencial de contaminação, com o objetivo de estimar a probabilidade da ocorrência de infecção do sítio cirúrgico. Relacione a 2ª coluna de acordo com a primeira.

- (1) Cirurgias Limpas
 - (2) Cirurgias Potencialmente Contaminadas
 - (3) Cirurgias Contaminadas
 - (4) Cirurgias Infectadas
-
- () Procedimentos cirúrgicos que envolvem aparelho digestivo (Gastrectomia), aparelho gênito-urinário (nefrectomia).
 - () Feridas traumáticas recentes (fratura exposta há menos de 4 horas), ferida com drenagem de secreção espessa, não purulenta. Colecistectomia com inflamação.
 - () Angioplastia, revascularização miocárdica, hemorragias sem inflamação, esplenectomia, cirurgias plásticas e neurocirurgias.
 - () Perfuração intestinal, fratura exposta (há mais de 4 horas), presença de secreção purulenta.

A sequência correta é:

- (A) 2, 4, 1, 3
- (B) 4, 3, 1, 2
- (C) 2, 3, 1, 4
- (D) 1, 3, 2, 4
- (E) 3, 2, 4, 1

19 Graciela, 17 anos, deu entrada no Pronto Socorro. Após atendimento médico, foi internada com hipótese diagnóstica de meningite. É correto afirmar em relação a isolamento:

- (A) Se for meningite viral, manter isolamento respiratório por 24 horas, apenas.
- (B) Se for meningite bacteriana, manter isolamento respiratório por 24 horas, após início da antibioticoterapia.
- (C) Se for meningite bacteriana, manter isolamento respiratório durante todo período que a paciente permanecer internada.
- (D) Se for meningite bacteriana, manter isolamento respiratório por 72 horas, após início da antibioticoterapia.
- (E) se for meningite viral, manter isolamento respiratório por 72 horas, apenas

20 Durante a anamnese do Sr. Benevides, ao solicitar informações sobre a história das doenças e cirurgias em sua família, obtiveram-se as seguintes respostas:

- I. A mãe retirou o seio por câncer.
- II. Ele fez cirurgia para retirar a vesícula .
- III. O pai retirou o baço.
- IV. A filha retirou o ovário.

Ao fazer as anotações utilizando os termos técnicos adequados, o profissional registrou corretamente:

- (A) I = mamoplastia; II = colecistectomia; III =hepatectomia; IV = ooforectomia
- (B) I = mastectomia; II =vesiculectomia; III = esplenectomia; IV = ooforectomia
- (C) I = mastoplastia; II = cistectomia; III = esplenectomia; IV = ooforectomia
- (D) I = mastectomia; II = colecistectomia; III = esplenectomia; IV = ooforectomia
- (E) I = mastectomia; II = colecistectomia; III =laparotomia ; IV = histerectomia

21 Conceitos e definições da saúde e epidemiologia.

- (1) Epidemiologia
 - (2) Morbidade
 - (3) Epidemia
 - (4) Endemia
 - (5) Patogenicidade
 - (6) Virulência
- () Ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período, (temporalmente ilimitada), e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais.
 - () É a capacidade do agente de produzir *efeitos graves ou fatais*, relaciona-se à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar.

- () Ocorrência em uma comunidade ou região de casos de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado.
- () É a capacidade do agente, uma vez instalado, de *produzir sintomas e sinais* (doença).
- () É a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde (fenômenos e processos associados) em populações humanas.
- () É a variável característica das comunidades de seres vivos, refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas doenças) num dado intervalo de tempo em uma determinada população. A morbidade mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população.

A sequência correta é:

- (A) 4, 6, 3, 5, 1, 2
- (B) 6, 3, 4, 5, 1, 2
- (C) 2, 1, 3, 1, 5, 2
- (D) 4, 5, 3, 6, 2, 1
- (E) 3, 5, 4, 6, 1, 2

22 A Resolução COFEN Nº 272/2002, dispõe sobre a SAE (Sistematização da Enfermagem). Sobre essa resolução é correto afirmar:

- (A) A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente/cliente/usuário, devendo ser composta por: Histórico de enfermagem; Exame Físico; Diagnóstico de Enfermagem; Prescrição da Assistência de Enfermagem; Evolução da Assistência de Enfermagem; Relatório de Enfermagem
- (B) Nos casos de Assistência Domiciliar - HOME CARE - esse prontuário deverá permanecer junto à equipe de atendimento domiciliar, em sua sede/base, objetivando otimizar o andamento do processo, bem como atender o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
- (C) Prescrição de Enfermagem: É o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. Essa prescrição só poderá ser implantada após aprovação do médico.
- (D) Ao enfermeiro compete a implantação, o planejamento e a organização do processo de enfermagem. Estando inserido em uma equipe de enfermagem, o enfermeiro pode delegar aos técnicos de enfermagem a responsabilidade pela sistematização, mantendo para si a responsabilidade de avaliação.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

23 A constatação imediata da PCR (Parada Cardiorrespiratória), assim como o reconhecimento da gravidade da situação, é de fundamental importância, pois permite iniciar prontamente as manobras de reanimação. Baseando-se no protocolo de Suporte Avançado de Vida, procedimentos iniciais após o reconhecimento de uma PCR são:

- I. Iniciar suporte básico de vida (ABCD primário).
- II. Solicitar ajuda / desfibrilador / monitor.
- III. Manter a cabeça e o tórax no mesmo plano.
- IV. Colocar a vítima em decúbito dorsal horizontal em uma superfície plana e dura.

A sequência correta de atendimento é:

- (A) A sequência de atendimento não é relevante.
- (B) I, II, III, IV
- (C) II, I, III, IV
- (D) II, IV, III, I
- (E) IV, I, III, II

24 O Suporte Básico de Vida no atendimento da PCR (Parada Cardiorrespiratória) consiste em iniciar imediatamente manobras que restitua a oxigenação e a circulação em órgãos nobres, seguindo-se uma sequência denominada ABCD primário. Acerca disso, enumere a segunda coluna com base nas informações da primeira coluna.

- (1) A
 - (2) B
 - (3) C
 - (4) D
- () Boa respiração – ventilação primária não-invasiva – uso de método de barreira ou bolsa-válvula-máscara(ambú).
 - () Via aérea – abrir a via aérea, desobstruir.
 - () Desfibrilação imediata.
 - () Compressões torácicas.

A sequência correta é:

- (A) 2, 1, 3, 4
- (B) 3, 4, 1, 2
- (C) 2, 1, 4, 3
- (D) 1, 2, 3, 4
- (E) 1, 2, 4, 3

25 Com relação ao tratamento de feridas com fechamento por primeira intenção, é incorreto afirmar:

- (A) O curativo padronizado nas primeiras 24 horas é feito com gaze estéril e solução fisiológica 0,9% uma vez ao dia, ou mais, de acordo com a exsudação.
- (B) Após as primeiras 24 horas, se houver exsudação, a incisão será mantida com curativo fechado.
- (C) A retirada de pontos deverá ser realizada entre o 7º e o 8º dia de sutura, considerando-se as condições do processo de cicatrização.
- (D) Quando a incisão se apresentar seca, poderá ser mantida aberta, e a higienização efetuada durante o banho.
- (E) As úlceras de pressão infectadas são consideradas como feridas com fechamento por primeira intenção.