

01 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

02 – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.

04 – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.



05 – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.



06 – Assinale o que for correto.

- 01) As fraturas do colo umeral em 4 partes são indicativas de osteossíntese.
- 02) A fratura de Monteggia caracteriza-se por fratura do 1/3 distal da ulna e luxação da cabeça do rádio.
- 04) As luxações anteriores de quadril, clinicamente mostram o membro inferior encurtado, fletido, em rotação interna e adução.
- 08) A complicação tardia mais frequente nas fraturas supracondilíneas é o cotovelo varo.
- 16) Nas fraturas de calcâneo encontramos alterações da articulação subtalar em 60% a 70% dos casos.

07 – Assinale o que for correto no que respeita às correlações.

- 01) Panner – epicôndilo umeral.
- 02) Freiberg – cabeça do segundo metatarso.
- 04) Osgood Schlatter – patela.
- 08) Sever – calcâneo.
- 16) Kienbock – escafoide carpiano.

08 – Assinale o que for correto.

- 01) A cifose juvenil de Scheuermann é uma deformidade fixa com acunhamento de pelo menos 3 vértebras.
- 02) A doença de Letterer Swive é a forma aguda da histiocitose X.
- 04) A distrofia muscular de Duchenne ocorre predominantemente no sexo masculino.
- 08) Deformidades ósseas, manchas café com leite e tumores subcutâneos são características da neurofibromatose.
- 16) Os métodos de Cobb e Ferguson são utilizados na mensuração do ângulo nas curvas escolióticas.

09 – No que respeita à enfermidade de Legg Perthes, assinale o que for correto.

- 01) A dor pode ser referida apenas no joelho em função da distribuição sensitiva do nervo obturador.
- 02) A alteração da cabeça femoral deve-se à etiologia infecciosa.
- 04) A patologia apresenta várias fases, sendo que a primeira caracteriza-se por quadro de sinovite.
- 08) Radiologicamente a segunda fase da doença caracteriza-se pela opacidade da cabeça femoral.
- 16) O tratamento da patologia visa diminuir a dor, preservar o contorno da cabeça e minorar o tempo de permanência no leito.

10 – No que respeita ao exame metamérico do membro superior, assinale o que for correto.

- 01) A perda de sensibilidade do dedo médio, alteração de reflexo tricipital, déficit motor do tríceps e flexores do punho fazem pensar em compressão da raiz C7.
- 02) A alteração do reflexo bicipital e estiloradial, déficit motor do bíceps braquial, alteração sensitiva da face lateral do antebraço são relativas à compressão de C6.
- 04) A raiz C8 quando submetida a compressão leva a alterações do reflexo bicipital, perda de sensibilidade do polegar e déficit motor de interósseos.
- 08) Alteração reflexa bicipital e debilidade motora de deltoide e bíceps são manifestações da compressão de C5.
- 16) Nas compressões da raiz T1 não se observa alterações dos reflexos.

11 – No que respeita ao conceito de várias fraturas, assinale o que for correto.

- 01) A fratura marginal da superfície articular do rádio com desvio dorsal ou volar chama-se de Barton.
- 02) A fratura de Smith é aquela em que há fratura do 1/3 distal do rádio, apófise estilóide da ulna e desvio dorsal do fragmento distal do rádio.
- 04) A fratura de Jefferson se caracteriza por lesão da coluna cervical a nível de C5C6 com cominuição vertebral.
- 08) A fratura de Colles caracteriza-se por desvio dorsal do fragmento distal do rádio e apófise estilóide da ulna.
- 16) A fratura de Galeazzi caracteriza-se por fratura do rádio e ruptura da articulação rádio-ulnar distal.

12 – Assinale o que for correto.

- 01) O encondroma é o tumor mais frequente dos ossos da mão.
- 02) Os cistos sinoviais são tumorações benignas e frequentes no dorso do punho. Apresentam índice de cura superior a 90% quando se realiza exérese cirúrgica sob bloqueio ou anestesia geral.
- 04) O condrosarcoma nos ossos da mão é uma ocorrência rara e deve ser diferenciado do encondroma.
- 08) O osteoma osteoide é um tumor cuja dor piora à noite e não cede com aspirina.
- 16) Os xantomas são tumores relativamente frequentes na mão, ocorrendo com maior frequência na face palmar dos dedos. Quando múltiplos podem estar associados à hipercolesterolemia.

13 – Assinale o que for correto.

- 01) A contratura decorre mais frequentemente em fraturas do 1/3 proximal do úmero em crianças.
- 02) A dor é o sintoma mais consistente na contratura de Volkman.
- 04) A confirmação do diagnóstico da isquemia de Volkman se dá através da demonstração do aumento da pressão compartimental.
- 08) A presença de pulso radial descarta o diagnóstico de isquemia de Volkman.
- 16) Na contratura de Volkman a isquemia se estabelece simultaneamente nos músculos e nervos.

14 – No que respeita às fraturas do escafoide carpiano, assinale o que for correto.

- 01) As fraturas do escafoide são as mais frequentes do carpo e, uma vez não diagnosticadas em exame radiológico inicial acurado, devem ser descartadas nos traumas dessa região.
- 02) Um percentual considerável dos ossos escafoides possuem apenas um forame arterial no polo proximal o que concorre para estabelecimento da necrose avascular.
- 04) As cirurgias de enxertia óssea na pseudoartrose têm produzido consolidação em percentual que supera 80% dos casos.
- 08) A estiloidectomia é uma técnica que não tem indicação em qualquer circunstância nas fraturas de escafoide.
- 16) Quando o fragmento proximal consiste em 1/4 ou menos do escafoide, ou na mesma condição pós-fracasso na enxertia está indicado a excisão cirúrgica do fragmento.

15 – No que respeita ao osso semilunar, que constitui estrutura importante a ser avaliado nas lesões traumáticas do punho, assinale o que for correto.

- 01) As incidências radiográficas oblíquas são fundamentais no diagnóstico da luxação do semilunar.
- 02) O osso luxado na incidência antero-posterior do punho apresenta formato triangular.
- 04) A luxação posterior do semilunar é a mais frequente e pode provocar compressão aguda do nervo mediano.
- 08) A redução incruenta não é alternativa viável mesmo nas luxações diagnosticadas precocemente.
- 16) Para abordagem cirúrgica dessas lesões pode-se utilizar incisão dorsal, incisão palmar ou incisão combinada.

16 – Assinale o que for correto.

- 01) O torcicolo congênito é causado por fibromatose no interior do esternocleidomastoideo, sendo mais frequente no lado direito.
- 02) A deformidade de Sprengel se caracteriza por elevação congênita da escápula.
- 04) As manobras de Ortolani e Barlow são utilizadas no diagnóstico da luxação congênita de quadril.
- 08) A pseudoartrose congênita de tibia encontra-se com frequência associada à neurofibromatose.
- 16) Talo vertical congênito encontra-se com frequência associado à artrogripose e à mielomeningocele.

17 – No que respeita aos tumores ósseos, assinale o que for correto.

- 01) O osteoblastoma é um tumor benigno que ocorre preferencialmente em pacientes do sexo masculino com menos de 30 anos.
- 02) A encondromatose múltipla, quando associada a hemangiomas de tecido mole, é conhecida como síndrome de Maffucci.
- 04) O tumor de células gigantes ocorre a nível do joelho em aproximadamente 50% dos casos, não havendo risco de degeneração maligna.
- 08) Os osteocondromas são tumores ósseos benignos com localização frequente nas metáfises dos ossos longos, podendo sofrer degeneração condrosarcomatosa.
- 16) O sarcoma ostogênico é mais comum em jovens entre 10 e 15 anos atingindo a metáfise dos ossos longos.

18 – No que respeita à anatomia e à dinâmica do joelho, assinale o que for correto.

- 01) O joelho apresenta movimento de flexão e extensão com componente rotacional.
- 02) Os ligamentos colaterais medial e lateral são estruturas intraarticulares bem como os ligamentos cruzados e os meniscos.
- 04) O ligamento colateral lateral estende-se do epicôndilo femoral lateral ao platô tibial externo.
- 08) O menisco lateral também mantém ligações anatómicas com os ligamentos cruzados.
- 16) O menisco medial é uma estrutura fibrocartilaginosa em forma de "C", cujo corno anterior está fixado à tibia e ao ligamento cruzado anterior.

19 – No que respeita à fratura do tornozelo, assinale o que for correto.

- 01) A classificação de Danis-Weber para as fraturas do tornozelo enfoca o mecanismo da lesão e o aspecto da fratura do maléolo medial.
- 02) Nas incisões para abordagem do maléolo lateral deve-se proteger o nervo sural.
- 04) Nas fraturas de Cotton deve-se fixar o maléolo posterior quando o fragmento envolver mais de 25% da superfície articular.
- 08) Para perfeito funcionamento da articulação, ao realizar-se a síntese do maléolo fibular, esta deve preservar o comprimento normal, a posição no sulco da tibia e estar fixada à tibia através da sindesmose.
- 16) As fraturas de pilão tibial são lesões simples mesmo quando cominutas e devem ser tratadas conservadoramente em quaisquer circunstâncias.

20 – Assinale o que for correto.

- 01) A patela bipartida pode ser diagnosticada em incidências AP ou Axial e deve ser diagnóstico diferencial de fraturas marginais.
- 02) A artrite infecciosa pós-ferimento infectado articular é de tratamento mais simples que as artrites hematogênicas.
- 04) Plicas sinoviais devem ser diferenciadas das lesões meniscais através do exame físico, devendo ser tratadas conservadoramente. Na falha desse tratamento é indicado o tratamento cirúrgico.
- 08) Na osteocondrite dissecante a única etiologia aceita é o traumatismo exógeno.
- 16) Na osteocondrite dissecante do joelho a lesão está mais comumente localizada no côndilo femoral lateral.