



**01** – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

**02** – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

**03** – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.

**04** – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.

**05** – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.

**06** – Em relação à distímia, assinale o que for correto no que se refere aos sintomas mais comuns.

- 01) Baixa autoestima.
- 02) Piora matinal.
- 04) Sentimentos de desesperança.
- 08) Fadigabilidade aumentada.
- 16) Irritabilidade.

---

**07** – Estudo feito por Almeida Filho e colaboradores (1997) revelou que, considerando a prevalência durante toda a vida, determinados transtornos psiquiátricos podem ser observados com mais frequência em três capitais brasileiras. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Transtornos depressivos, transtornos psicóticos, transtornos obsessivos-compulsivos, transtornos de ajustamento e dependência ou abuso de álcool.
- 02) Transtornos depressivos, transtornos de somatização e dissociativos.
- 04) Transtornos depressivos, transtornos de somatização e dissociativos, mania e ciclotimia, transtornos de ajustamento e dependência ou abuso de álcool.
- 08) Fobias, transtornos de ansiedade e dependência ou abuso de álcool.
- 16) Transtornos depressivos, transtornos de ansiedade e dissociativos, fobias, transtornos de ajustamento e dependência ou abuso de álcool.

---

**08** – Assinale o que for correto, no que se refere ao autismo.

- 01) História de complicações obstétricas.
- 02) Melhora do comportamento quando clinicamente doente.
- 04) Aparecimento dos sintomas antes da idade de 3 anos.
- 08) Aumento do limiar para dor.
- 16) Alucinações e delírios.

**09** – Assinale o que for correto, no que se refere aos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos.

- 01) Ataxia.
- 02) Sedação.
- 04) Desinibição do comportamento.
- 08) Redução do limiar convulsivo.
- 16) Depressão respiratória.

---

**10** – Assinale o que for correto, no que se refere ao autismo infantil.

- 01) É dez vezes mais comum nos meninos do que nas meninas.
- 02) Para o diagnóstico, é necessário evidenciar o atraso ou desvio do comportamento durante os primeiros três anos de vida.
- 04) Mostra influência da classe social.
- 08) Aproximadamente 50% das crianças autistas não desenvolvem fala adequada.
- 16) Falham geralmente na utilização de gestos antecipatórios.

---

**11** – Assinale o que for correto, no que se refere ao transtorno hipocondríaco.

- 01) Falta uma resposta positiva ao reassuramento médico.
- 02) Há uma preocupação persistente com enfermidades físicas.
- 04) Ocorre menos em homens do que em mulheres.
- 08) Pacientes adultos com hipocondria frequentemente têm um modelo familiar na sua infância para os seus sintomas.
- 16) Encontra-se associado com classes socioeconômicas baixas.

**12** – Assinale o que for correto, no que se refere aos transtornos somatoformes.

- 01) Na abordagem dos transtornos de somatização, o clínico geral deve ser o principal médico do paciente e se possível o único.
- 02) Transtorno de somatização, transtorno conversivo, transtorno doloroso, hipocondria e transtorno dismórfico corporal são os principais transtornos somatoformes.
- 04) Os transtornos conversivos são os mais frequentes dos transtornos somatoformes.
- 08) Não é recomendável que, nas consultas do paciente com transtorno de somatização, o clínico sempre faça pelo menos um exame físico parcial dirigido ao órgão ou sistema relacionado à queixa do paciente.
- 16) Com as evidências advindas da anamnese, do exame físico e dos exames laboratoriais, o paciente costuma atribuir seu sofrimento a um problema clínico não detectado ou não adequadamente tratado.

**13** – Assinale o que for correto, no que se refere ao Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

- 01) Raramente observa-se comorbidade com transtornos do humor e outros transtornos de ansiedade.
- 02) A Buspirona reduz menos os sintomas somáticos do que os sintomas cognitivos do TAG.
- 04) Irritabilidade, tensão muscular, distúrbio do sono, fadigabilidade, dificuldade de concentração e inquietação, são frequentemente relatados.
- 08) Foram descritas anormalidades no córtex occipital de pacientes com TAG, em estudos funcionais e estruturais de imagem cerebral, e é nessa região que existe a maior concentração de receptores benzodiazepínicos.
- 16) Estima-se que o TAG seja quatro vezes mais prevalente do que o transtorno do pânico e três vezes mais permanente do que a fobia simples, e que as mulheres sejam duas vezes mais afetadas do que os homens.

**14** – Assinale o que for correto, no que se refere aos transtornos psiquiátricos no puerpério.

- 01) A maior taxa de infanticídio está associada à presença de psicose puerperal.
- 02) A psicose puerperal está associada a um mau prognóstico.
- 04) Baixas doses de antipsicóticos podem evitar o desenvolvimento de psicose puerperal grave nas pacientes que têm seus quadros precocemente detectados.
- 08) Existe uma alta taxa de recorrência dos quadros de psicose puerperal e de depressão pós-parto.
- 16) Os seguintes psicofármacos apresentam risco crescente na utilização durante a lactação: haloperidol, lítio e ácido valproico.

**15** – O médico que está prestando atendimento a jovens usuários de drogas deve notificar, compulsoriamente, aos pais a vigência de determinadas situações. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Risco de suicídio.
- 02) Síndrome de abstinência grave.
- 04) Intoxicação grave.
- 08) Abuso sexual.
- 16) Meios usados pelo adolescente para adquirir a droga.

**ATENÇÃO!**  
**AS PRÓXIMAS QUESTÕES TÊM**  
**APENAS UMA RESPOSTA CORRETA**

**16** – Assinale o que for correto, no que se refere ao quadro neurológico frequentemente associado à depressão.

- 01) Tumor cerebral.
- 02) Epilepsia.
- 04) Doença de Parkinson.
- 08) Demência tipo Alzheimer.
- 16) Toxoplasmose cerebral.

---

**17** – Assinale o que for correto, no que se refere aos medicamentos que podem produzir depressão.

- 01) L-dopa, amitriptilina e indometacina.
- 02) Lorazepam, fosfatidilserina e selegilina.
- 04) Haloperidol, baclofen e moclobemida.
- 08) Interferon, corticóides e reserpina.
- 16) Penicilina, carbamazepina e alfa-metildopa.

---

**18** – Segundo o novo Código Civil Brasileiro, determinados indivíduos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Dentre as alternativas abaixo, indique a que detém indivíduos que se enquadram nesse contexto.

- 01) Apresentam transtornos mentais de tipo psicótico.
- 02) Se enquadram na rubrica loucos de todo gênero.
- 04) Apresentam enfermidades e/ou retardo mentais graves.
- 08) Mesmo por causa transitória, não possuem o pleno discernimento.
- 16) Mesmo por causa transitória, não podem exprimir a sua vontade.

**19** – Assinale o que for correto, no que se refere ao alcoolismo.

- 01) Hiperatividade autonômica, náuseas ou vômitos, insônia, ansiedade, agitação psicomotora, ilusões ou alucinações. Tremores nas mãos só surgem após a interrupção do uso intenso e prolongado de bebidas alcoólicas.
- 02) Na abstinência alcoólica a maior intensidade dos sintomas é atingida após o quarto ou quinto dia de abstinência.
- 04) A gamaglutamil-transferase (GGT), que é o marcador mais sensível e específico do alcoolismo, retorna ao nível normal após uma semana de abstinência.
- 08) Além da GGT, são também úteis na avaliação do paciente alcoolista o volume corpuscular médio (VCM), o ácido úrico, os triglicerídeos, a transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) e a transaminase glutâmico-oxaloacética (TGO).
- 16) Na síndrome de Korsakoff o uso regular de tiamina por meses não está associado a uma recuperação parcial ou total de um subgrupo de pacientes.

---

**20** – Assinale o que for correto, no que se refere aos transtornos conversivos.

- 01) Deve-se considerar esquizofrenia catatônica, transtorno de somatização, transtorno histriônico de personalidade, transtorno de ajustamento, episódios depressivos e transtornos de estresses pós-traumático no diagnóstico diferencial.
- 02) Na cegueira histérica as pupilas reagem ao estímulo luminoso, mas os potenciais evocados nem sempre são consistentes com a visão normal.
- 04) Nas pseudoconvulsões é comum o paciente apresentar sonolência ou quadro confusional após os episódios.
- 08) O padrão de distribuição da anestesia, parestesias ou hiperestésias nos quadros conversivos costuma estar de acordo com a distribuição da inervação central ou periférica.
- 16) Os quadros conversivos raramente são antecedidos por situações estressantes.