


# CONCURSO PÚBLICO DE EMPREGO PÚBLICO ANDIRÁ - PARANÁ

Edital 003/2010 – PSB – DATA DA PROVA: 04/09/2010

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: ODONTÓLOGO  
**CARGO: ODONTÓLOGO**

## LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

**Boa Prova!**

## Capitu

Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta \_\_\_\_\_ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. Caminhei para ela; naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta:

- Que é que você tem?
- Eu? Nada.
- Nada, não; você tem alguma cousa.

Quis \_\_\_\_\_ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de \_\_\_\_\_, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos.

- Que é que você tem? Repetiu.
- Não é nada, balbuciei finalmente.

E emendei logo:

- É uma notícia.
- Notícia de que?

Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como...

- Então?
- Você sabe...

Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era.

*Assis, Joaquim Maria Machado de. "Capitu" In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26.*

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:**

- a) fez-a – insistir – xita.
- b) fê-la – insistir – chita.
- c) fez-a – ensistir – chita.
- d) fê-la – incistir – xita.

**02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi:**

- a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro.
- b) O rumor da porta.
- c) A inquietação de Capitu.
- d) A inscrição que ele viu no muro.

**03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica:**

**I - As paroxítonas *ofícios*, *águas* e *notícia* são acentuadas porque terminam em ditongo.**

**II - As palavras *mácula*, *cálculo* e *rápido* são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas.**

**III - Os monossílabos *trás*, *pé* e *quê* são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

**04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta:**

- a) A palavra *gesto* no 1º parágrafo significa *fisionomia*, *semblante*, *feiço*.
- b) As palavras *passo* e *paço* são homônimas homófonas assim como *acender* – *ascender*.
- c) A palavra *desbotado* (5º parágrafo) tem como antônimo *descolorado*.
- d) As alternativas a, b e c estão corretas.

**05 - Em “mas não achei língua...” (5º parágrafo) o nexos mas estabelece relação de:**

- a) consequência.
- b) concessão.
- c) oposição.
- d) explicação.

**06 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá:**

**I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com área média de 40,00 ha por lote.**

**II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros.**

**III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma centena de tanques de criação de peixes.**

**De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta:**

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Duas afirmativas estão corretas.
- c) Uma afirmativa está correta.
- d) Nenhuma afirmativa está correta.

**07 - O município de Andirá surgiu durante a vigência do “Estado Novo” imposto pelo Presidente Getúlio Vargas, nesta época a democracia foi deixada de lado por cerca de 15 anos. Que prefeito ficou no cargo entre 16 de Março de 1.946 a 03 de Dezembro de 1.947, sendo o último antes da volta das Eleições Diretas no Brasil?**

- a) Erasmo Canhoto.
- b) Manoel Alves do Amaral.
- c) Moacyr Corrêa.
- d) Vergínio Rosário.

**08 - Em que ano ocorreu o “Cercos da Lapa” durante a “Revolução Federalista”?**

- a) 1.892.
- b) 1.893.
- c) 1.894.
- d) 1.895.

**09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO ocorreu nesta data?**

- a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro.
- b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro.
- c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck.
- d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves.

**10 - A mudança da cor gengival é um importante indicador visual de atividade da doença periodontal. Sobre as alterações da coloração gengival na doença periodontal é correto afirmar:**

- a) A gengiva saudável geralmente é esbranquiçada, com pequenos pontos de pigmentação melânica.
- b) A cor magenta é significativa de doença periodontal ativa, como GUNA.
- c) A alteração de cor mais comum associada com a doença gengival é um vermelho intenso.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**11 - Sobre as doenças periodontais agressivas gerais e localizadas é incorreto afirmar:**

- a) Geralmente, os pacientes com periodontite agressiva generalizada apresentam perda óssea vertical bilateral simétrica com perda de inserção maior que 4 mm nos primeiros molares permanentes e incisivos permanentes.
- b) Na periodontite agressiva localizada a flora bacteriana parece ser dominada por *Actinobacillus actinomycetemcomitans* em combinação com *Bacteroides intermedius* entre outros microorganismos.
- c) Na periodontite agressiva, a resposta do hospedeiro pode ser expressa como uma diminuição da resposta quimiotóxica dos neutrófilos em resposta à infecção bacteriana.
- d) A periodontite agressiva é uma doença onde apesar de haver uma taxa rápida e severa de destruição periodontal, o acúmulo de placa encontrado pode ser pequeno e não consistente com tamanha destruição.

**12 - O uso de soluções irrigantes em conjunto com a instrumentação mecânica é importante para ajudar a debridar o canal e eliminar bactérias. Sobre as soluções irrigadoras é correto afirmar:**

- a) Um dos objetivos da irrigação do canal é promover uma desinfecção em áreas do canal onde a limpeza mecânica não foi acessível.
- b) A solução de hipoclorito de sódio 0.5% exibe uma excelente atividade antimicrobiana e afeta minimamente a cicatrização periodontal.
- c) A extrusão inadvertida de hipoclorito de sódio em alta concentração através do forame apical pode causar um dano substancial a esse tecido e também dor.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**13 - A lesão central de células gigantes é uma lesão intraóssea benigna incomum, e consiste em um tecido fibroso celular, que contém múltiplos focos hemorrágicos, agregados de células gigantes multinucleadas e, por vezes, fragmentos de trabéculas ósseas. Sobre esta patologia é correto afirmar:**

- a) Esta lesão acomete mais os homens, com predileção para faixa etária de 10-25 anos.

- b) O comportamento clínico dessa lesão também pode ser agressivo, com dor, podendo causar perfuração cortical e reabsorção óssea, podendo levar à alterações assimétricas na face e deslocamentos dentários.
- c) O tratamento tradicional é radioterapia e acompanhamento.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**14 - O selamento marginal é um importante fator a ser levado em consideração quando se diz respeito à longevidade da restauração, principalmente quando se trata de materiais adesivos. Sobre os mecanismos de adesão dos materiais a estrutura dentária é incorreto afirmar:**

- a) A presença de umidade na dentina após o condicionamento ácido é essencial, pois mantém as fibrilas expandidas, impedindo seu colapso, e possibilita a infiltração dos monômeros nos espaços interfibrilares, resultando na formação da camada híbrida.
- b) O excesso de água na dentina também pode afetar negativamente o processo adesivo, pois pode promover separação entre as fases hidrófobas e hidrófilas dos componentes monoméricos do sistema de união.
- c) Para remover o excesso de água na dentina deve-se usar diretamente o jato de ar comprimido em direção ao preparo cavitário.
- d) Sistemas de adesivo à base de água obtém melhores resultados em superfícies de dentina mais secas.

**15 - O freio lingual nos recém-nascidos se estende desde a base anterior da língua até a base do osso alveolar da mandíbula. Depois de algumas semanas, ocorre um alargamento gradual da língua e o freio passa a ocupar a porção central do ventre da língua, a qual será sua posição definitiva. As alterações funcionais do músculo genioglossa, assim como também um freio lingual curto são fatores que podem desencadear a anquiloglossia. Sobre a anquiloglossia é correto afirmar:**

- a) A anquiloglossia nunca estará associada a qualquer tipo de síndrome.
- b) O critério mais comumente usado como diagnóstico é pela observação clínica do freio lingual, onde ele geralmente se encontra curto e grosso, fazendo com que a língua adote um formato de coração quando se pede que o paciente protrua a língua.
- c) Sempre que o freio lingual estiver curto, ele nunca terá elasticidade para cumprir sua função, sendo necessária a remoção cirúrgica do mesmo.
- d) Crianças com anquiloglossia não tem comprometimento do seu crescimento mandibular.

**16 - Sobre o tratamento da anquiloglossia é correto afirmar:**

- a) A cirurgia está indicada em todos os casos de anquiloglossia.
- b) A melhor idade para se realizar a cirurgia de frenectomia é após os 15 anos.
- c) Antes dos quatro meses de idade, a frenectomia pode ser realizada sem anestesia.
- d) Todas estão corretas.

**17 - Os hemangiomas são proliferações benignas relativamente freqüentes dos canais vasculares que podem estar presentes ao nascer ou apresentar-se na primeira infância. Sobre os hemangiomas é incorreto afirmar:**

- a) Alguns hemangiomas podem crescer de forma gradual, continuando a ser benigno.
- b) Se ocorrer em tecidos bucais, suas características clínicas podem ser multinodulares e de cor roxa, azul ou violácea.
- c) Uma maneira de se realizar um diagnóstico diferencial entre outras lesões vermelhas da cavidade bucal é a vitropressão.
- d) Quando se realiza a vitropressão, o diagnóstico para hemangioma se dá porque mesmo com a pressão do vidro, a lesão continua vermelha.

**18 - Um dos principais objetivos no manejo do paciente infantil com cárie é a utilização de técnicas não invasivas, que permitem o tratamento da patologia dentária sem afetar o comportamento da criança. Sobre as técnicas de atendimento infantil não-invasivas podemos afirmar:**

- a) o objetivo do método de remoção químico-mecânico da cárie dental é eliminar a porção mais superficial (infectada) da cárie mediante a utilização de um gel e instrumentos rotatórios de baixa rotação deixando a dentina desmineralizada afetada, a qual pode ser reparada.
- b) uma das desvantagens do uso do Cariosolv<sup>TM</sup> é que ele pode provocar necrose pulpar.
- c) o gel de papaína, desenvolvido em São Paulo, tem como base uma enzima proteolítica que interage com o colágeno parcialmente degradado do tecido cariado, rompendo a ligação das fibras de colágeno deste, deixando intacta a dentina sadia.
- d) todas estão corretas.

**19 - A técnica da pulpotomia consiste na extirpação da polpa coronal e na proteção do tecido remanescente com um material que favorece a cicatrização e a formação de uma barreira dentinária que permite conservar a vitalidade da polpa radicular. Sobre pulpotomia é incorreto afirmar:**

- a) um dos materiais mais usados em pulpotomia de dente decíduo é o formocresol.
- b) a pasta iodoformada também é efetiva para pulpotomias em dentes decíduos.
- c) nunca é encontrado fistula em dentes que foram pulpotomizados e medicados com formocresol.
- d) pode ocorrer reabsorção radicular interna em dentes decíduos pulpotomizados, mas isso não representa um fator determinante de patologia pulpar.

**20 - Sobre a estomatite protética podemos afirmar:**

**I - é uma inflamação da mucosa de suporte que está em contato com a superfície interna da prótese**

**II - é mais freqüente no rebordo mandibular**

**III - a *Candida albicans* contribui com a etiologia e o desenvolvimento dessa patologia**

**IV - o tratamento se dá através do uso de anti-inflamatórios não esteroidais**

**V - o fluconazol é um medicamento que pode se usado nessa patologia**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas
- b) apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas
- c) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- d) todas as afirmativas estão corretas

**21 - A prescrição de antibióticos profiláticos em cirurgias bucais menores para prevenir processos infecciosos é um tópico controverso na odontologia. Sobre os regimes profiláticos prévios a cirurgias bucais menores é correto afirmar:**

- a) A clorexidina é o antibiótico mais comumente empregado previamente a cirurgias bucais.
- b) A literatura apóia como principio que o antibiótico deve ser administrado no período pré-operatório por um tempo pequeno, e a dose deve ser efetiva para alcançar as concentrações plasmáticas e tissulares adequadas para prevenir a infecção.
- c) O emprego da amoxicilina pré-operatória aumenta a presença de edema pós-operatório.
- d) O emprego de amoxicilina pré-operatória diminui significativamente o nível de dor no pós-operatório.

**22 - Sobre o fibroma ameloblástico é incorreto afirmar:**

- a) É um tumor odontogenico benigno misto, de ocorrência rara.
- b) Radiograficamente, o fibroma se apresenta com um único halo radiopaco.
- c) Ele pode estar associado a um dente incluso.
- d) Geralmente, as lesões apresentam diâmetro de 1 a 8 cm, sendo que as lesões maiores podem romper a cortical óssea.

**23 - Ao estarmos diante de um preparo cavitário profundo, nos deparamos com uma dentina vital com grandes aberturas tubulares temporariamente bloqueadas pela *semar layer*, mas se aplicarmos um sistema adesivo que inclua condicionamento ácido, a *semar layer* será eliminada, deixando sair para superfície uma maior quantidade de fluido tubular, que poderia comprometer o selamento da restauração, podendo ocasionar microinfiltração, levando a danos pulpares. Uma prática comum quando restauramos esse tipo de cavidade, é realizar um forramento com ionômero de vidro. Sobre o ionômero de vidro é correto afirmar:**

- a) Os cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade possuem melhor resistência compressiva do que os cimentos de ionômero de vidro convencionais, porém, possuem menor resistência ao desgaste e solubilidade aumentada.
- b) As qualidades mecânicas dos ionômeros de vidro são adequadas para preencher cúspides socavadas, às vezes recebendo o nome de “dentina artificial”.
- c) As principais indicações para os cimentos de ionômero de vidro convencionais são para áreas restauradas submetidas a grandes esforços mastigatórios, como as restaurações de classe II.
- d) Todas estão corretas.

**24 - Sobre a periodontite agressiva é correto afirmar:**

- a) Na periodontite agressiva, os microorganismos presentes na placa iniciam e conduzem o avanço da enfermidade destrutiva com perda de inserção e dos tecidos de suporte do dente, em pacientes jovens susceptíveis.
- b) A periodontite agressiva pode persistir em pacientes adultos.
- c) A principal característica desta doença periodontal é sua rápida progressão, com perda de inserção e destruição óssea, em pacientes sistemicamente saudáveis, onde também pode ser encontrada uma predisposição familiar para essa enfermidade.
- d) Todas estão corretas.

**25 - As cáries secundárias, também denominadas cáries recorrentes ou de recidiva constituem uma das razões mais freqüentes de falha das restaurações. Sobre esse tipo de cárie é incorreto afirmar:**

- a) A cárie secundária é clinicamente e radiograficamente igual a cárie primária, o que a diferencia é que ela está adjacente a uma restauração.
- b) Este tipo de cárie trata-se de tecido cariado que não foi removido durante o preparo cavitário.
- c) A cárie secundária pode originar-se no esmalte e na dentina ao longo da interface dente-restauração, constituindo uma lesão de parede.
- d) A lesão de parede pode originar-se como conseqüência da difusão de íons de hidrogênio através de microespaços na interface dente-material restaurador.

**26 - Os materiais restauradores provisórios são usados em endodontia para selar a cavidade de acesso entre as sessões terapêuticas, e depois de terminado o tratamento até que se coloque a restauração definitiva. Um dos materiais mais usados como selador provisório é o IRM. Sobre este material é correto afirmar:**

- a) O IRM evita o crescimento bacteriano na superfície dentária.
- b) Uma das desvantagens do IRM é que ele possui alta solubilidade.
- c) Após a inserção do IRM na cavidade, deve-se avisar o paciente que fique pelo menos 5 minutos sem mastigar nada naquela região.
- d) Todas estão corretas.

**27 - A saliva é formada por órgãos que em seu conjunto são conhecidos como glândulas salivares, que por sua vez se classificam como maiores e menores. Sobre a saliva e sua formação é correto afirmar:**

- a) Na saliva humana, a concentração fisiológica de mucina não permite a formação de um gel mucoso in vivo.
- b) A secreção mucosa de indivíduos resistentes à cárie tem uma viscosidade 3 vezes mais alta do que aqueles indivíduos susceptíveis à cárie.
- c) A saliva mais viscosa é produzida pela glândula parótida.
- d) A presença de saliva aumenta o coeficiente de fricção entre as superfícies dentárias.

**28 - Baseado na seguinte descrição: “ como característica específica da coroa este dente possui a anatomia da face lingual mais desenvolvida, a ponta da cúspide é aguda, o contato mesial se dá nas junções dos terços incisal e médio e o distal se dá no terço médio”, podemos deduzir que trata-se do dente:**

- a) Primeiro pré-molar inferior
- b) Canino inferior
- c) Canino superior
- d) Primeiro pré-molar superior

**29 - Estes dentes irrompem entre os 7 e 8 anos de idade, e sua raiz irá completar a formação por volta dos 10 anos. Sua cavidade pulpar é bastante simples, com a câmara coronária apresentando 3 cornos pulpares. Este dente não é simétrico, pois seu contorno distal é ligeiramente mais arredondado e menor quando comparado ao mesial, que é mais achatado e longo. O seu pequeno e único cingulo está situado distalmente ao longo eixo da raiz. Esta descrição trata-se do seguinte dente:**

- a) Incisivo lateral inferior
- b) Incisivo central superior
- c) Canino inferior
- d) Incisivo central inferior

**30 - Sobre a lei 8080 do SUS é incorreto afirmar:**

- a) Possui como princípio a centralização político-administrativa, com direção única à esfera do governo federal.
- b) Nos seus princípios e diretrizes, ainda reza sobre a participação da comunidade no funcionamento do SUS.
- c) Um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação dos fatores e determinantes da saúde.
- d) A execução de ações de vigilância sanitária está incluída no campo de atuação do SUS.