

ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE \_\_\_\_\_

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE  
EMPREGOS PÚBLICOS

CEO DE \_\_\_\_\_

**ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS**

**LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA**

**LOCAL DA PROVA**

Endereço: \_\_\_\_\_

**INSTRUÇÕES**

1. A Prova Objetiva terá a duração de 3 horas.
2. A Prova Escrita versará sobre conhecimentos específicos inerentes ao respectivo emprego, previstos no conteúdo programático, sendo composta de 20 questões de múltipla escolha, no valor de 5,0 (cinco) pontos cada questão. A prova total vale 100 pontos.
3. As questões da prova apresentam um enunciado seguido de quatro alternativas designadas pelas letras A, B, C E D.
4. Para cada questão da prova marque somente uma opção que você considera como a resposta correta.
5. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma reclamação será aceita após trinta minutos do início da prova.
6. Decorrido o tempo determinado pela Comissão de Seleção, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção da prova.
7. Ao receber o cartão-resposta verifique se seu nome está correto.
8. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho. Não haverá substituição do cartão-resposta.
9. Não amasse nem dobre o cartão-resposta, para que não seja rejeitado pela leitura ótica.
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura ou que apresentar mais de uma alternativa assinalada.
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica (tinta azul ou preta) para marcação das respostas; qualquer forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua eliminação.
12. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartão-resposta e o caderno de prova, devendo, ainda, assinar a lista de frequência.
13. O gabarito abaixo, para simples conferência, pode ser destacado para uso do candidato.

**GABARITO PARA CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## PROVA OBJETIVA

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

- Com relação à aferição da pressão arterial de um paciente, podemos afirmar **CORRETAMENTE** que:
  - O importante é realizar um bombeamento no manguito excessivamente rápido, visto que assim favorece a auscultação.
  - O importante para uma boa aferição é a correta localização da artéria braquial na fossa antecubital.
  - Somente a pressão sistólica deve ser anotada e levada em consideração para a realização de qualquer intervenção.
  - Somente a pressão diastólica deve ser anotada e levada em consideração para realização de qualquer intervenção.
- Assinale a alternativa que inclui **CORRETAMENTE** os sinais clássicos do diabetes melito:
  - Polidipsia, polifagia e poliúria.
  - Paladar alterado e pouca incidência da doença cárie dentária.
  - Pouca incidência da doença cárie dentária e redução do fluxo salivar.
  - Aumento da secreção da glândula salivar parótida e candidíase.
- Representa uma possível consequência do nível de glicose elevado em um paciente diabético não compensado:
  - Aumento da cicatrização tecidual.
  - Menor risco hemorrágico.
  - Maior risco de infecção.
  - Acromegalia.
- Em relação às diáteses hemorrágicas, assinale a alternativa **CORRETA**:
  - A hemofilia B é uma patologia decorrente da deficiência de fator VIII.
  - A doença de von Willebrand apresenta função normal das plaquetas e deficiência de fator VIII.
  - Trombocitopenia é uma condição patológica hereditária relacionada com a deficiência de fatores de coagulação.
  - A hemofilia A é uma condição hematológica caracterizada pela deficiência de fator VIII.
- Assinale a alternativa **CORRETA** que contém os achados clínicos que determinam a possível presença de distúrbio hemorrágico.
  - Hematoma, hemangioma e petéquias.
  - Púrpura, sangramento gengival espontâneo e hemartrose.
  - Púrpura, sangramento gengival e hematoma.
  - Hematoma, sangramento gengival e petéquias.
- Os marcadores bucais no comprometimento imunológico do paciente HIV+, definido pelo Ministério da Saúde em 1996, são:
  - Queilite angular, xerostomia e língua pilosa.
  - Xerostomia, alterações dermatológicas e gengivite.
  - Sarcoma de Kaposi, candidíase e leucoplasia pilosa.
  - Alterações dermatológicas, eritema gengival linear e sarcoma de Kaposi.
- O cirurgião-dentista que atende o paciente portador de Paralisia Cerebral Espástica, para facilitar a colaboração do paciente, precisa estar atento principalmente a:
  - Paralisia pseudobulbar.
  - Cuidadores.

- C) Distúrbios sistêmicos.
- D) Redução do estresse.

8. Em um paciente portador de Síndrome de Down, o cirurgião-dentista deve ficar atento às manifestações bucais mais comuns, que são:

- A) Macroglossia, língua fissurada, sialorreia, doença periodontal, palato em ogiva, dentes congenitamente ausentes, hipoplasia do esmalte dentário.
- B) Hipotonia muscular, língua fissurada, geminação dentária, elevado índice de cárie, mordida aberta, dentes conoides.
- C) Macroglossia, língua fissurada, língua geográfica, lesões bucais com retenção de líquido, tumores, má oclusão do tipo classe III.
- D) Glossite rombóide mediana, leucoedema, doença periodontal, má oclusão do tipo classe II, mordida cruzada, alterações do desenvolvimento dentário.

9. Com relação à Paralisia Cerebral é **CORRETO** afirmar:

- A) Resulta de uma lesão progressiva no Sistema Nervoso Central, que o atinge quando prematuro, e interfere no desenvolvimento motor normal da criança.
- B) É uma alteração genética que ocorre durante o desenvolvimento intra-uterino e interfere no desenvolvimento motor normal da criança.
- C) Resulta de uma lesão ou mau desenvolvimento do Sistema Nervoso Central, de caráter não progressivo, que atinge o desenvolvimento motor normal da criança;
- D) É uma deficiência motora devido ao excesso de produção de neurotransmissor.

10. O agente etiológico de maior incidência nos casos de endocardite bacteriana, encontrado em grande quantidade na cavidade oral, é:

- A) Streptococcus viridans.
- B) Prevotella Intermedia.
- C) Lactobacilos.
- D) Treponema palidum.

11. Sobre o tratamento odontológico cirúrgico de pacientes com risco de desenvolvimento de Endocardite Infecçiosa, assinale a opção **VERDADEIRA**:

- A) Diante de todos os pacientes com risco de desenvolvimento dessa alteração, deve-se realizar procedimento de profilaxia antibiótica prévia.
- B) Deve-se realizar procedimento de profilaxia antibiótica prévia diante de pacientes com baixo risco de desenvolvimento de endocardite, evitando-se assim qualquer probabilidade de bacteremia.
- C) Deve-se realizar procedimento de profilaxia antibiótica prévia diante de pacientes com alto risco ou de risco significativo de desenvolvimento de Endocardite, diante de procedimentos cruentos com sangramento e bacteremia.
- D) Como medida de prevenção contra a resistência antibiótica, deve-se realizar procedimento de profilaxia antibiótica prévia somente diante de pacientes com alto risco de desenvolvimento de Endocardite.

12. A melhor época para o atendimento odontológico de gestantes é:

- A) Primeiro mês de gestação.
- B) Segundo trimestre de gestação.
- C) Terceiro trimestre de gestação.
- D) Primeiro trimestre de gestação.

13. Sobre angina do peito, marque a alternativa **VERDADEIRA**:

- A) Representa um conjunto de cardiopatias fibrosantes sintomáticas.
- B) Representa um conjunto de cardiopatias isquêmicas sintomáticas.
- C) Não se encontra associada às obstruções ateroscleróticas das artérias coronárias.

D) Quando comparada ao infarto do miocárdio, apresenta sintomatologia dolorosa mais intensa e de característica não-compressiva.

**14.** A síndrome de hipotensão supina pode ocorrer durante o atendimento odontológico e é mais comum em pacientes:

- A) Nefropatas.
- B) Diabéticos.
- C) Hipertensos.
- D) Gestantes.

**15.** Recentemente uma nova complicação bucal associada ao tratamento do câncer foi identificada, a osteonecrose associada a bifosfonatos. Sobre essa classe de medicamentos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) São inibidores da atividade osteoclástica.
- B) São utilizados em uma ampla gama de condições como osteoporose, hipercalcemia em malignidades, Doença de Paget.
- C) Reduzem eventos esqueléticos associados ao mieloma múltiplo e a tumores sólidos metastáticos ósseos.
- D) Acumulam-se na matriz óssea por um tempo relativamente pequeno.

**16.** Sobre a recente classificação da pressão arterial em adultos, podemos afirmar que:

- A) Sua classificação divide-se em Normal, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2.
- B) A hipertensão estágio 1 consiste em uma PA sistólica  $\geq 160$ mmHg ou em uma PA diastólica  $\geq 100$ mmHg.
- C) Classifica-se uma PA como Normal quando apresenta uma PA sistólica  $< 120$ mmHg e uma PA diastólica  $< 80$  mmHg.
- D) O estágio de pré-hipertensão caracteriza-se quando o paciente apresenta histórico de hipertensão na família.

**17.** Condição rara causada por uma alteração genética, caracterizada por uma craniossinostrose, proptose ocular associado ao hipertelorismo e inclinação para baixo das fissuras palpebrais laterais, é sempre observado sindactilia do segundo, terceiro e quarto dedos das mãos e dos pés. Dentre as manifestações orais caracterizam fenda do palato mole, úvula bífida, apinhamento dentário devido à hipoplasia da maxila e tipicamente, má oclusão tipo classe III ocorre e pode estar associada à mordida aberta anterior e à mordida cruzada posterior:

- A) Síndrome de Asperger.
- B) Síndrome de Rett.
- C) Síndrome de Apert.
- D) Síndrome de Pallister–Killian.

**18.** Sobre as Hepatites virais, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- A) O HBV é encontrado no sangue e em outros fluidos corporais como saliva, lágrima, sêmen e secreção vaginal, tendo, portando, diversos meios de transmissão.
- B) O HCV tem pouca implicância na prática odontológica.
- C) O vírus da hepatite A encontra-se erradicado no Brasil.
- D) Paciente com Hepatite B, sem evolução para insuficiência hepática, necessita de profilaxia antibiótica em procedimentos cruentos.

**19.** Sobre a doença de Parkinson, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) É um distúrbio neurodegenerativo progressivo dos neurônios que produzem dopamina.
- B) Afeta principalmente mulheres com pico de idade entre 55 e 66 anos.
- C) Constitui-se em uma doença comum do SNC.

D) Dentre as preocupações odontológicas, a rigidez muscular e movimentos musculares repetitivos podem dificultar o atendimento odontológico.

**20.** Sobre o tratamento odontológico em um paciente com câncer de boca em região de assoalho de boca que irá se submeter a tratamento cirúrgico e radioterápico, marque a afirmativa **INCORRETA**:

A) O cirurgião-dentista deve realizar uma avaliação bucal pré-tratamento em todos os pacientes que irão iniciar a terapia radioterápica.

B) Dentre os cuidados pré-tratamento deve-se incluir instruções de higiene oral e fluoroterapia.

C) Pacientes submetidos a radioterapia em região de cabeça e pescoço podem realizar qualquer tipo de procedimento odontológico em um período posterior a 5 anos da terapia sem risco de osteoradionecrose.

D) Dentre os achados bucais após período de radioterapia podemos observar múltiplas mucosites, xerostomia e cáries de radiação.