



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

REF. EDITAL N° 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO

ODONTÓLOGO

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Informática
21 a 50	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

Com a palavra o cão

Edson Franco

"Diferentemente da audição e da visão, no olfato os cães têm mais de um sistema sensorial dedicado a esmiuçar sensações", diz Ádám Miklósi, líder do maior grupo de estudo canino do mundo, baseado na Universidade Eötvös, em Budapeste, na Hungria. Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o mundo. E é essa a principal ferramenta para ele nos entender, conviver com seus semelhantes, diagnosticar doenças e até montar a sua complexa e engenhosa contagem do tempo.

Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho, o cão acompanha o decorrer do tempo e data as coisas. Com nossos limitados receptores olfativos, temos dificuldade até para diagnosticar se um café foi adoçado com uma colher de chá de açúcar. Os cães são capazes de identificar a mesma colher de açúcar diluída em duas piscinas olímpicas. Essa habilidade torna fácil para eles sentir o cheiro de uma gota de orvalho se instalando e evaporando das pétalas de uma flor, por exemplo. E esse é um tipo de informação valiosa para que eles saibam se um evento é recente ou se um objeto é novo ou velho.

Ou seja, o olfato é a visão dos cães. Assim, são compreensíveis aqueles momentos em que eles recepcionam pessoas enfiando bravemente o focinho entre as coxas do visitante. Assim como as axilas e os pés - descalços, claro -, a genitália carrega odores que liberam muitos dados a respeito do recém-chegado. Privar os cães desse tipo de informação equivaleria a vendar os nossos olhos antes de abrir a porta de casa.

Todo dono que se julga um especialista no comportamento canino - a maioria - é capaz de jurar que seu bicho associa uma bronca à "arte" que acabou de aprontar. Estão equivocados. Junto com focinhos que conseguem identificar se a gente fumou no dia anterior, se transou ou se comeu salmão no almoço, os cães têm um espectro auditivo muito maior do que aquele que o ser humano consegue captar. Além disso, para identificar a origem do som, suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos, o triplo que as nossas têm. Isso permite que eles virem, ajustem, foquem e direcionem os órgãos. Apesar de tamanha precisão auditiva, os cães não processam palavras, como muitos defensores dos antropomorfismos adorariam.

O que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação e a ira exalando pelos poros do dono, mas não associam isso com o xixi no tapete ou o rasgo no sofá. "Eles entendem o tom da voz, o som geral da frase e, em alguns casos, as palavras que usamos. Além disso, o período do dia e os hábitos pessoais do dono podem ajudar a dar um sentido para aquilo que o cão está ouvindo. Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance de você dizer 'hora de ir pra cama' do que 'o que você quer de café?'.

Há um componente entre as habilidades caninas que intriga os cientistas e vem derrubando e construindo certezas. Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie capaz de entender o que significa um dedo apontado em determinada

direção. Nem os primatas, nossos parentes mais próximos, têm esse talento. Os pesquisadores acreditam que isso evoluiu devido a dois fatores: os cães nos encaram destemidamente - em outras espécies o contato olho no olho é visto como uma ameaça - e eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que fazemos com os nossos gestos e olhares. Assim, mesmo sem auxílio do faro, eles sabem onde guardamos objetos que para eles são relevantes.

Alguns cientistas defendem que essa dedicação para acompanhar todos os nossos movimentos vai muito além da mera curiosidade. Publicado em setembro passado, um estudo liderado por Josef Topál, cientista cognitivo do Instituto de Psicologia da Hungria, mostrou que essa atenção que os cães nos direcionam é um dos traços que mais nos aproximam. Na frente de bebês de dez meses, os pesquisadores esconderam brinquedos sob copos. Eles apontavam para aquele sob o qual estava o brinquedo, e os bebês indicavam o mesmo e acertavam. Fácil demais, até porque eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo. Depois, os cientistas passaram a apontar para o copo errado, e as crianças erraram junto. Por fim, retiraram-se da sala e passaram a manusear os copos por fios no teto. E os bebês acertaram todas as vezes. O teste foi repetido em cães, e os resultados foram exatamente os mesmos.

Como os bebês, os cães deixam de lado as suas próprias impressões, certezas e ideias e seguem as nossas. Sem pensar, sem questionar, sem reclamar caso algo tenha dado errado. Essa é mais uma das ferramentas de sedução que nossos amigos de quatro patas vêm desenvolvendo e usando com eficiência exemplar ao longo dos últimos 15 milênios. Até o dia em que os cientistas apareçam com novas conclusões surpreendentes a respeito do comportamento canino, tudo bem a gente continuar chamando isso de amor.

Revista Galileu. Novembro de 2009, n. 220. p.46-51. (adaptado)

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa cujo elemento destacado funciona como artigo.

- (A) "Que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação..."
- (B) "...eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que fazemos."
- (C) "...os cães são a única espécie capaz de entender o que significa um dedo apontado..."
- (D) "...com o que é captado por seu focinho, o cão acompanha o decorrer do tempo..."
- (E) "...os bebês indicavam o mesmo e acertavam."

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja sequência de verbos constitui um tempo composto.

- (A) "...tudo bem a gente continuar chamando isso de amor."
- (B) "...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo."
- (C) "Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho..."
- (D) "...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo..."
- (E) "Junto com focinhos que conseguem identificar se a gente fumou..."

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** está na voz passiva.

- (A) "Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho..."
- (B) "...um café foi adoçado com uma colher de chá de açúcar."
- (C) "O teste foi repetido em cães..."
- (D) "...sem reclamar caso algo tenha dado errado."
- (E) "...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos..."

QUESTÃO 04

"O teste foi repetido em cães, e os resultados foram exatamente os mesmos."

A expressão destacada constitui um exemplo de

- (A) pronome demonstrativo.
- (B) pronome relativo.
- (C) advérbio.
- (D) pronome indefinido.
- (E) pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) correta(s).

- I. Essa atenção que os cães direcionam-nos é um dos traços...
- II. Todo dono que julga-se um especialista no comportamento canino...
- III. ...os cães encaram-nos destemidamente...
- IV. Por fim, se retiraram da sala e passaram a manusear os copos

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas III.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas II e III.
- (E) apenas I, II e IV.

QUESTÃO 06

"O que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação e a ira exalando pelos poros do dono, mas não associam isso com o xixi no tapete ou o rasgo no sofá."

A forma verbal destacada remete

- (A) às expressões a entonação e a ira.
- (B) à expressão a entonação.
- (C) à expressão a ira.
- (D) à expressão os cães.
- (E) à expressão poros do dono.

QUESTÃO 07

Só serão mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical se for

- (A) substituída a expressão as vezes pela expressão às vezes, em "os bebês acertaram todas as vezes".
- (B) substituída a expressão à arte pela expressão a arte, em "associa uma bronca à 'arte'".
- (C) substituída a expressão para que eles saibam pela expressão para eles saberem, em "valiosa para que eles saibam".
- (D) substituída a forma verbal têm pela forma verbal tem, em "os cães têm mais de um sistema sensorial".
- (E) substituída a forma verbal identificar pela forma identificarem, em "Junto com focinhos que conseguem identificar."

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** constitui uma locução adverbial.

- (A) "Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o mundo."
- (B) "Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie..."
- (C) "Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance..."
- (D) "...vêm desenvolvendo e usando com eficiência..."
- (E) "Por fim, retiraram-se da sala e passaram a manusear..."

QUESTÃO 09

Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) das sequências destacadas.

- I. "Assim como as axilas e os pés - descalços, claro..." (dígrafo consonantal)
- II. "...identificar a mesma colher de açúcar diluída em duas piscinas olímpicas." (dígrafo consonantal)
- III. "...os pesquisadores esconderam brinquedos sob copos." (encontro consonantal)
- IV. "...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos..." (encontro consonantal)

Está(ão) correta(s)

- (A) I, II, III e IV.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas II e IV.
- (D) apenas II, III e IV.
- (E) apenas III.

QUESTÃO 10

"Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie capaz de entender..."

A expressão destacada constitui um complemento da expressão

- (A) espécie.
- (B) lado.
- (C) cães.
- (D) humanos.
- (E) capaz.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Entre os componentes centrais do sistema operacional está o escalonador de processos.
- II. Gerenciador de memória é um componente do sistema operacional que determina quando e como a memória é alocada aos processos e o que fazer quando a memória principal estiver cheia.
- III. O sistema operacional gerencia a maioria dos hardwares e softwares do computador, porém não é sua função gerenciar os dispositivos de entrada e saída de dados.
- IV. Sistemas operacionais podem ser de 32 ou 64 bits.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta apenas sistemas de arquivos reconhecidos pelo Windows.

- (A) Ext3, NTFS, JFS
(B) FAT32, NTFS, FAT16
(C) Ext3, Ext4, JFS
(D) Win32, Win16, NTFS
(E) FAT32, JFS, Win32

QUESTÃO 13

Utilizando o sistema operacional Windows XP profissional instalação padrão português Brasil, é possível que o usuário tenha acesso a diversas funções do sistema utilizando comandos no menu executar. Quanto ao tema, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () control admintools
() cmd
() diskpart
() regedit

1. Editor de registros
2. Ferramentas administrativas
3. Janela de comandos DOS
4. Gerenciamento de partição de Discos

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
(B) 3 – 1 – 4 – 2.
(C) 2 – 3 – 4 – 1.
(D) 4 – 3 – 2 – 1.
(E) 2 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 14

Com relação as funções do Microsoft Excel 2003 instalado em um sistema operacional Windows XP instalação padrão português Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A função SE é uma função estatística que verifica se os cálculos estatísticos estão corretos e retorna o valor VERDADEIRO ou FALSO.
- II. A função MOD é uma função matemática que retorna o resto de uma divisão após um número ter sido dividido por um divisor.
- III. A função AGORA retorna data e hora atual formatada como data e hora.
- IV. ABS, MULT, PAR são funções da categoria matemáticas e trigonométricas.
- V. A função MED retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes.

- (A) Apenas I, IV e V.
(B) Apenas III, IV e V.
(C) Apenas I, III e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 15

Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no sistema operacional Windows XP profissional instalação padrão português Brasil, qual das alternativas abaixo apresentam apenas funções estatísticas?

- (A) SE, ABS, UPPER
(B) CONT.NUM, CONT.SE, CONT.VALORES
(C) VERDADEIRO, SOMA, MEDIA
(D) MEDIA, DIVIDE, SOMA
(E) SE, OU, VERDADEIRO

QUESTÃO 16

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Ao adicionar uma nova conta no Microsoft Outlook o usuário deve configurar o servidor de entrada de emails que pode ser _____, _____.

- (A) POP / IMAP
(B) FTP / POP
(C) SMTP / FTP
(D) DNS / POP
(E) FTP / IMAP

QUESTÃO 17

Qual das alternativas abaixo apresenta apenas players de vídeo?

- (A) Ares, Movie Maker, Wine
(B) Imash, Power DVD, Skype
(C) Realplayer, BS Player, QuickTime
(D) Spark, Windows Media Player, Spybot
(E) LimeWire, Avast, AVG

QUESTÃO 18

Qual das alternativas abaixo NÃO é um protocolo de rede?

- (A) HTTP
(B) FTP
(C) IMAP
(D) XML
(E) SMTP

QUESTÃO 19

Com relação a vírus de computador e formas de proteção assinale a alternativa correta.

- (A) Um computador só pode ser infectado por um vírus se o mesmo estiver conectado a internet.
- (B) Vírus é um programa de computador que normalmente interfere no funcionamento do computador.
- (C) Um computador com antivírus está totalmente livre de ser contaminado por um vírus.
- (D) Vírus de computador afeta somente o hardware.
- (E) Todos os vírus de computador tem exclusiva função de apagar arquivos do computador infectado.

QUESTÃO 20

De acordo com a volatilidade das memórias, preencha (V) para memórias voláteis e (N) para memórias não voláteis, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Cache
- () SDRAM
- () EPROM
- () RAM
- () Flash

- (A) N – N – V – V – N.
- (B) V – N – V – V – N.
- (C) N – V – N – N – V.
- (D) V – V – N – V – N.
- (E) V – V – N – V – V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

“As hepatites virais estão incluídas na lista de doenças de notificação compulsória e, portanto, os profissionais de saúde têm papel relevante na notificação e no acompanhamento das pessoas portadoras, sintomáticas ou não. Para que possam exercer tal papel, é necessário que esses profissionais estejam aptos a identificar casos suspeitos, solicitar exames laboratoriais adequados e realizar o encaminhamento dos casos indicados a serviços de referência.” (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. *ABCDE do diagnóstico para as hepatites virais I* Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Brasília : Ministério da Saúde, 2009.)

Sobre as hepatites virais assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A hepatite A é uma doença aguda causada pela infecção com o vírus da hepatite A. As formas clínicas existentes são hepatite A aguda e fulminante. A hepatite A não cronifica.
- () A principal via de transmissão da hepatite B é a sexual, seguida pela vertical.
- () O principal determinante da cronificação da hepatite B é a idade na qual ocorre a infecção pelo vírus: é mais frequente a cronificação em adultos do que em crianças.
- () O anti-HBs o único anticorpo que confere imunidade contra o VHB. Sua presença indica imunidade ativa (contato prévio com o vírus ou resposta vacinal).

() Para adquirir a hepatite D, necessariamente o indivíduo precisa ter tido a hepatite B.

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – F – F.
- (C) V – V – F – V – V.
- (D) F – F – F – V – F.
- (E) V – F – F – V – F.

QUESTÃO 22

“O maior objetivo do Ministério da Saúde no controle das hepatites virais é prevenir novas infecções e melhorar a qualidade de vida dos portadores das hepatites B, C e D. Conhecer o comportamento epidemiológico das hepatites virais quanto ao agente etiológico, pessoa, tempo e lugar; identificar os principais fatores de risco; ampliar estratégias de imunização da hepatite B; detectar, prevenir e controlar os surtos oportunamente; reduzir a prevalência de infecções e avaliar o impacto das medidas de controle são fatores fundamentais nessa resposta.” (BRASIL. Ministério da Saúde. *Hepatites Virais: desafios para o período de 2011 a 2012*, p.9). Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que se afirma a respeito das vacinas contra o vírus da hepatite B, a de maior risco de transmissão durante o atendimento odontológico.

- (A) A vacina contra a hepatite B está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais para pessoas de todas as idades, desde que se enquadrem em alguma das situações descritas pelo Ministério da Saúde como de risco para adquirir a hepatite B, entre elas: pacientes doadores de sangue, doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea, população indígena em geral, usuários de drogas injetáveis e inaláveis e profissionais do sexo.
- (B) A imunização da hepatite B é feita em três doses, sendo que, após a administração do esquema completo, induz imunidade em 90 a 95% dos casos.
- (C) Imunocomprometidos, portadores de insuficiência renal em programas de hemodiálise e alguns bebês prematuros devem fazer uso de esquemas especiais para a vacinação contra o HBV.
- (D) A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada no músculo deltoide. A aplicação da vacina na região glútea resulta em menor imunogenicidade.
- (E) Profissionais de odontologia com vacinação incompleta que sofram exposição ocupacional a material biológico de paciente portador com HBsAg positivo devem completar a vacinação apenas.

QUESTÃO 23

A Organização Mundial da Saúde informa em seu Relatório sobre Saúde Mundial (2002), que dos 35 milhões de trabalhadores da saúde, dois milhões passam por experiência de exposição percutânea a doenças infecciosas a cada ano. Além disso, relata que 37,6% dos trabalhadores adquiriram hepatite B, 39% adquiriram hepatite C e 4,4% HIV/Aids devido a injúrias causadas por perfuro-cortantes.



BRASIL. Ministério da Saúde. 1º Festival de Humor: DST e AIDS/Ministério da Saúde. 2ª. ed. revista. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

Em 1985, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) chamou a atenção para a possibilidade teórica da transmissão do HIV a partir de um profissional infectado. Em julho de 1991, o CDC reviu as recomendações para prevenção da transmissão do VHB e do HIV em procedimentos invasivos sujeitos a contaminação. Em março de 2010, a Sociedade de Epidemiologia da Área da Saúde da América (Society for Healthcare Epidemiology of America - SHEA) publicou um Guia para trabalhadores da saúde infectados pelo HIV, HBV e/ou HCV. De acordo com este guia, profissionais da saúde nestas condições

- (A) não devem mais realizar atendimento clínico.
- (B) devem monitorar sua carga viral e, dependendo dela, podem realizar inclusive pequenas cirurgias odontológicas.
- (C) devem monitorar sua carga viral, mas independente dela, não devem realizar nenhum tipo de cirurgia odontológica.
- (D) devem monitorar sua carga viral, mas independente dela, não devem fazer o atendimento de pacientes de difícil contenção ou que possam ter ataques epiléticos durante o atendimento odontológico.
- (E) podem realizar procedimentos simples, como profilaxia e aplicação de selantes, independente da carga viral.

QUESTÃO 24

“Em virtude do uso frequente, o veículo ideal para a administração de agentes controladores de placa é a pasta de dente. Muitos ingredientes são usados na pasta de dente, e cada um tem um papel que influencia a consistência e estabilidade do produto ou de sua função” (LINDHE; KARRINGE; LANG. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p.455). Como ingredientes de uma pasta dental encontrada no mercado nacional são citados: o carbonato de cálcio, água, sorbitol, arginina, monofluorofosfato de sódio, lauril sulfato de sódio, silicato de sódio, entre outros. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que se afirma a respeito da composição desta pasta de dente.

- (A) Com esta formulação, o fluoreto presente combina-se com o cálcio, o que impede sua ação preventiva.
- (B) O lauril sulfato de sódio tem propriedades antimicrobianas e inibidoras de placa.
- (C) O sorbitol é um umectante, utilizado para prevenir o ressecamento da pasta uma vez aberta.
- (D) A arginina ajuda na dessensibilização dentinária.
- (E) O silicato de sódio é utilizado como um espessante.

QUESTÃO 25

Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Sobre os EPI de uso na assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A máscara cirúrgica tripla é um EPI de uso obrigatório em Odontologia.
- (B) O jaleco utilizado no atendimento odontológico deverá ser lavado pelo próprio trabalhador.
- (C) Protetores faciais atuam como coadjuvantes na proteção respiratória contra gases emanados de produtos químicos, vapores orgânicos ou gases ácidos no ambiente e contra aerossóis.
- (D) O gorro utilizado na assistência odontológica é um EPI que deve ser trocado diariamente.
- (E) Luvas de látex de procedimento são EPI para atividades clínicas e para a limpeza e desinfecção de artigos odontológicos.

QUESTÃO 26

Paciente com deficiência mental é trazido à clínica odontológica para atendimento de urgência. Apresenta edema que se estende do espaço submandibular à ponta do mento. Ao exame físico percebem-se vários dentes com grandes lesões cáries, entre eles o primeiro pré-molar inferior direito, o canino inferior direito e o incisivo lateral inferior direito. Os linfonodos submentonianos do lado afetado aumentados. Com estas informações, pode-se concluir que

- (A) o dente que originou o edema é o incisivo lateral inferior direito.
- (B) o dente que originou o edema é o canino inferior direito.
- (C) o dente que originou o edema é o pré-molar inferior direito.
- (D) tanto o primeiro pré-molar inferior direito quanto o canino inferior direito podem ser os causadores do edema.
- (E) tanto o incisivo lateral inferior direito quanto o canino inferior direito podem ser os causadores do edema.

QUESTÃO 27

O atendimento odontológico a bebês visa à promoção da saúde bucal. Para tanto, deve-se abordar questões como o aleitamento materno e artificial, a cárie de aparecimento precoce, a higiene da boca e dos dentes, alterações de desenvolvimento, hábitos nocivos como o uso de chupetas e mamadeiras, uso de fluoretos, entre outros. Sobre o aleitamento materno (A.M.), relacione as duas colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- I. A.M. contra-indicado.
 II. A.M. contra-indicado temporariamente.
 III. A.M. não é contra-indicado.
- () Mãe portadora do HIV.
 () Mãe doente de aids.
 () Mãe infectada pelo HTLV.
 () Mãe infectada pelo *Tripamosoma cruzi*.
 () Mãe com tuberculose pulmonar em tratamento há 4 semanas.

- (A) II – I – III – II – III.
 (B) III – II – II – III – II.
 (C) I – I – II – III – III.
 (D) I – I – I – II – III.
 (E) II – I – II – III – II.

QUESTÃO 28

“Entre os vários caminhos da prevenção, o uso de soluções fluoretadas aplicadas topicamente é um método muito conhecido e eficaz (...)” (GUEDES-PINTO, 2010, p.471). Assinale a alternativa correta quanto à utilização de fluoretos em Odontologia.

- (A) Em cidades com fluoretação na água de abastecimento público, o pH considerado crítico para o esmalte dentário é de 5,5.
 (B) Quanto mais jovem o dente, menor é a sua capacidade de absorver flúor, o que justifica uma alta frequência de aplicação tópica de flúor.
 (C) O mineral fluorapatita (FA) é menos solúvel do que a hidroxiapatita (HA), assim, uma vez incorporada à estrutura dentária, a FA torna o dente menos solúvel aos ácidos produzidos no biofilme (placa) dental.
 (D) A recomendação de não beber água ou comer por até 30 minutos após a aplicação de flúor gel tem sido seguida, embora não haja evidência da sua relevância anticárie.
 (E) Não deve ser utilizado o NaF a 2,26% (23.000 ppm F) em verniz de colofônio em meio alcoólico em crianças em idade pré-escolar pelo alto risco de ocorrência de fluorose.

QUESTÃO 29

Em relação à utilização de selantes de fósulas e fissuras, assinale a alternativa correta.

- (A) Há evidências de que os cimentos de ionômero de vidro (CIV) convencionais utilizados como selantes de sulcos e fissuras previnem não só a iniciação como progressão de cárie, mas isto não acontece com os CIV modificados por resina.
 (B) A retenção dos selantes resinosos é menor do que a dos selantes ionoméricos.
 (C) Os selantes ionoméricos modificados por resina necessitam de proteção superficial contra a sinérese e a embebição.

- (D) Para a aplicação de selantes resinosos em dentes decíduos recomenda-se o condicionamento ácido do esmalte por 60 segundos com ácido fosfórico a 37%.
 (E) Dentes em processo eruptivo devem ser selados preferencialmente com selantes ionoméricos, pois estes são menos sensíveis à contaminação por saliva.

QUESTÃO 30

“Pulpotomia é um procedimento que se caracteriza pela remoção da polpa coronária e subsequente uso de medicamentos que procuram manter a polpa radicular em condições de saúde, permitindo que o ciclo biológico de reabsorção radicular se processe naturalmente” (GUEDES-PINTO, 2010, p.602). Assinale a alternativa que representa uma indicação para a realização desta técnica.

- (A) Crianças com baixa resistência e saúde geral precária, nas quais é frequente o aparecimento de tonsilite, gripes e outras doenças comuns na infância.
 (B) Dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não possuam mais de dois terços de reabsorção radicular.
 (C) Dentes decíduos com lesão na bi ou trifurcação das raízes, mas sem relatos de dor.
 (D) Dentes decíduos com histórico de dor espontânea.
 (E) Dentes decíduos que, apesar de apresentar dois terços de reabsorção radicular, não têm histórico de dor.

QUESTÃO 31

“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” (Política Nacional de Atenção Básica, 2006). Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso sobre o que se afirma sobre a Atenção Básica e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle da diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde.
 () A Atenção Básica deve permitir o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito, com planejamento local e programação municipal, em consonância com o princípio da equidade.
 () Cabe à Secretaria Municipal de Saúde organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.
 () A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como um de seus princípios gerais, o caráter complementar em relação à rede de Atenção Básica tradicional.

- (A) V – F – V – F.
 (B) V – V – F – F.
 (C) F – V – F – V.
 (D) F – F – V – V.
 (E) F – F – V – F.

QUESTÃO 32

Dentre as atribuições comuns a todos os profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF), de Saúde Bucal (ESB) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) está

- (A) estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.
- (B) realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo.
- (C) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- (D) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
- (E) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.

QUESTÃO 33

Dentre as atribuições específicas do Cirurgião-dentista, do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal estão, respectivamente,

- (A) realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; proceder à desinfecção e à esterilização de materiais necessários.
- (B) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; preparar e organizar instrumental e materiais necessários.
- (C) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- (D) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multi-disciplinar.
- (E) contribuir e participar das atividades de educação permanente do TSB, ASB e ESF; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.

QUESTÃO 34

A lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso sobre o que se afirma sobre esta lei e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () O Estatuto do Idoso prevê a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência.
- () Esta lei assegura ao idoso atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
- () Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso contínuo, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- () Esta lei prevê a preferência para os idosos na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas embora não preveja uma destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – V – V.

QUESTÃO 35

Sobre a rizólise de dentes decíduos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A rizólise é um fenômeno que ocorre de forma intermitente, ou seja, tem um período de reabsorção das estruturas mineralizadas e outro de reorganização do periodonto e cimento.
- (B) A presença do sucessor permanente é um fator importante no processo da rizólise. Na maioria dos casos, na ausência deste, a reabsorção é retardada.
- (C) A presença de lesões de cárie profundas não influencia o processo de rizólise.
- (D) Os dentes decíduos unirradiculares iniciam sua reabsorção por lingual, enquanto que o dentes multirradiculares a reabsorção tem início na superfície multirradicular.
- (E) Traumatismos, infecções ou distúrbios metabólicos são agentes etiológicos da reabsorção radicular.

QUESTÃO 36

“A principal função do rim é manter a constância do ‘ambiente interno’, eliminando produtos inservíveis e regulando o volume, o conteúdo de eletrólitos e o pH do líquido extracelular em face da ingesta variável na dieta e das demandas ambientais variáveis (p.ex., climáticas)” (RANG *et al.* Farmacologia, 2008, p.368). Uma vez que tenha sido estabelecido que o paciente tem uma infecção que necessita de antibioticoterapia e o tipo de antibiótico tenha sido escolhido, ele deve ser administrado de forma correta. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em pacientes renais crônicos a utilização de amoxicilina não necessita de ajustes já que a eliminação da maior parte do fármaco é hepática.
- (B) Pacientes com uma doença renal preexistente e conseqüentemente uma eliminação reduzida pode necessitar de intervalos maiores entre as doses, a fim de se evitar overdose pois se a dosagem usual for mantida, níveis plasmáticos excessivos e um aumento de toxicidade podem ocorrer.
- (C) O intervalo de dosagem usual para uso terapêutico de antibióticos é 3 vezes a $t_{1/2}$.
- (D) Pacientes com insuficiência renal com para pacientes com TFG < 30 ml/minuto não há necessidade de ajuste nas doses de amoxicilina.
- (E) A ingestão de alimentos interfere na absorção da amoxicilina, devendo ser tomada 30 minutos antes ou 2 horas depois da refeição.

QUESTÃO 37

Uma vez que a administração do antibiótico tenha sido iniciada, a resposta do paciente deve ser cuidadosamente observada. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

- () A resposta do paciente à terapia antibiótica está na dependência do equilíbrio hídrico e de um adequado suporte nutricional.
- () Se nenhuma melhora é notada no primeiro dia de medicação, o antibiótico deverá ser trocado.
- () O sinal mais comum de uma hipersensibilidade retardada (tipo IV) é um persistente baixo grau de febre. Numa situação típica, o paciente não mais apresenta edema, dor, trismo ou drenagem, mas continua a apresentar uma leve elevação de temperatura, apesar do pulso normal.
- () A maioria dos antibióticos deve ser tomada em jejum (30 minutos antes ou 2 horas depois da refeição).

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) F – V – F – V.

QUESTÃO 38

Uma reação tóxica que pode ocorrer pelo uso de antibióticos é a colite associada ao antibiótico (CAA). Assinale a alternativa correta sobre a CAA.

- (A) A CAA, antes denominada colite pseudomembranosa, está associada exclusivamente ao tratamento com clindamicina.
- (B) Considera-se, atualmente, que a CAA seja causada por quase todos os antibióticos, mas especialmente pelos aminoglicosídeos.
- (C) A CAA afeta os pacientes de forma geral, não havendo diferenciação entre pacientes com imunocomprometimento.
- (D) O tratamento da CAA envolve a descontinuação do antibiótico causador, restaurar o equilíbrio dos fluidos e eletrólitos, e a administração de antibióticos anticlostridia. A escolha usual são as cefalosporinas de quarta geração.
- (E) As características clínicas da CAA são profusa diarreia líquida, que pode ser sanguinolenta, dor abdominal com mioespaço, febre e leucocitose.

QUESTÃO 39

Algumas funções dos biofilmes são dependentes da habilidade das bactérias e microcolônias dentro do biofilme de se comunicar umas com as outras. O processo de comunicação intra e interespecies microbianas, que permite aos microrganismos apresentarem alterações fenotípicas marcantes quando estes se encontram em altas densidades populacionais, ao mesmo tempo em que, embora geneticamente e estruturalmente mais simples, permite que os microrganismos se comportem como organismos complexos, capazes de se comunicar e agir coordenadamente, respondendo a diferentes estímulos de modo unificado, é denominado de

- (A) glicocálix.
- (B) fímbrias.
- (C) esqueleto hidrodinâmico interno.
- (D) *quorum sensing*.
- (E) bomba de fluxo iônica.

QUESTÃO 40

Embora muito se fale a respeito das ações dos microrganismos no periodonto, o ambiente bucal exerce um efeito maior sobre a composição, as atividades metabólicas e as propriedades de virulência dos microrganismos colonizadores. A respeito dos fatores que afetam a composição de biofilmes subgengivais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A prevalência e o nível das espécies subgengivais podem ser diferentes em sítios com profundidade de bolsa diferentes.
- (B) A composição bacteriana é dependente não só do estado de doença periodontal em um indivíduo, mas ao estado da doença em cada sítio doente.
- (C) As espécies subgengivais causadoras da doença periodontal não são comumente encontradas no ambiente ou mesmo na microbiota subgengival de outras espécies animais.
- (D) O biofilme supragengival é aderido à superfície dentária e predomina a espécie *Actinomyces* na maioria dos casos, tanto em indivíduos com saúde periodontal quanto naqueles com periodontite.
- (E) No biofilme subgengival há predomínio de outras espécies bacterianas como o *B. forsythus* e *P. gingivalis*, com presença discreta de *Actinomyces*.

QUESTÃO 41

“Trauma de oclusão é o termo usado para descrever as alterações patológicas ou mudanças adaptativas que ocorrem no periodonto em consequência de forças excessivas produzidas pelos músculos da mastigação” (LINDHE; KARRINGE; LANG. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p.342). Assinale a alternativa correta sobre a associação trauma oclusal / doença periodontal.

- (A) O trauma de oclusão pode ser considerado um fator primário no processo destrutivo do periodonto.
- (B) Um tratamento direcionado exclusivamente ao trauma periodontal, sem tratar a doença periodontal, pode ser suficiente para diminuir a mobilidade do dente traumatizado e resultar em algum reparo ósseo.
- (C) O trauma de oclusão, isolado da doença periodontal, não causa perda óssea significativa.
- (D) As forças unilaterais, mas não as alternadas, aplicadas em um periodonto sadio resultam em formação de bolsa ou na perda da inserção do tecido conjuntivo.
- (E) O trauma de oclusão, independente da presença de biofilme, pode induzir a destruição do tecido periodontal.

QUESTÃO 42

Em relação à influência da doença periodontal em algumas situações sistêmicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Os dados que relacionam a periodontite com o risco de nascimento de bebês prematuros de baixo peso, diabetes e outras condições sistêmicas sugerem que a periodontite não se enquadra nos critérios de especificidade.
- (B) As infecções periodontais podem contribuir diretamente na patogenia da aterosclerose e eventos tromboembólicos promovendo acometimentos sistêmicos repetidos com LPS (presentes na membrana externa das bactérias Gram positivas) e citocinas inflamatórias.
- (C) Embora as bactérias cariogênicas tenham sido isoladas em válvulas cardíacas, não há evidência de que as bactérias periodontais possam ser encontradas nas placas ateroscleróticas.
- (D) A doença periodontal é um risco bem estabelecido para o nascimento de bebês prematuros de baixo peso. No entanto, a presença de doença periodontal apenas no início da gestação não é considerada um fator de risco.
- (E) Não foram encontradas, até o momento, evidências de associação entre a doença periodontal e condições pulmonares como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica.

QUESTÃO 43

Em relação ao Sarcoma de Kaposi, assinale a alternativa correta.

- (A) O Sarcoma de Kaposi é um tumor maligno que ocorre principalmente na infância, ocorrendo na vida adulta somente em pacientes imunocomprometidos.
- (B) O Sarcoma de Kaposi possui três estágios de desenvolvimento: mancha, de placa e nodular.
- (C) O Sarcoma de Kaposi tem seu crescimento auto-limitado, ficando as lesões com um tamanho médio de 1 a 2 cm.
- (D) As lesões orais do Sarcoma de Kaposi são frequentes e envolvem com mais frequência o rebordo alveolar superior e inferior.
- (E) O aparecimento de infecções oportunistas e de neoplasias, como o Sarcoma de Kaposi, é considerado como um preditor de evolução da Aids.

QUESTÃO 44

Há uma crescente preocupação com o controle e prevenção de infecção cirúrgica. Assinale a alternativa correta sobre este tipo de infecção.

- (A) Caso ocorram perfurações nas luvas, quase 19.000 bactérias podem penetrar por um único furo em 20 minutos. Assim, recomenda-se que as luvas sejam trocadas quando forem observadas perfurações, após um uso prolongado (duas horas) e durante procedimentos prováveis de causar perfurações. Também é recomendado o uso de dois pares de luvas quando o paciente é sabidamente portador do HIV, HBV ou HCV.
- (B) A presença de coágulos sanguíneos grandes dentro da ferida cirúrgica promove um melhor reparo e cicatrização por dificultar o crescimento bacteriano dentro de um espaço vazio.
- (C) A duração da cirurgia como um fator em infecção nosocomial tem sido bem estudado. Cirurgias com até duas horas de duração tem aproximadamente o dobro de risco de ocorrência de infecções do que cirurgias com menos do que uma hora de duração.
- (D) Bactérias Gram positivas e Gram negativas multirresistentes a antibióticos são também resistentes aos antissépticos utilizados na higienização das mãos.
- (E) Os alcoóis são menos efetivos em prevenir a transferência de patógenos hospitalares do que a higienização das mãos com água e sabonete.

QUESTÃO 45

Complete as lacunas da assertiva abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

Aplicar pequenos volumes de álcool (0,2 a 0,5 mL) nas mãos _____ efetivo do que lavar as mãos com água e sabonete comum. Sabe-se também que após a _____ aplicação consecutiva de preparações alcoólicas estas podem perder sua eficácia.

- (A) é mais / terceira
- (B) é mais / quinta
- (C) é mais / décima
- (D) não é mais / quinta
- (E) não é mais / décima

QUESTÃO 46

São descritas abaixo algumas situações clínicas. Leia-as atentamente e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I. Criança de dois anos de idade pesando 20 kg, com histórico de tetralogia de Fallot, é trazida à clínica de odontologia para ser submetida à frenectomia lingual e recebe como antibiótico a clindamicina na dose de 1g meia hora antes da cirurgia como profilaxia para a endocardite bacteriana.
- II. Homem de 42 anos com histórico de defeito septal ventricular vem à clínica de Odontologia para realizar profilaxia e raspagem gengival e recebe 1g de amoxicilina uma hora antes do procedimento como profilaxia para a endocardite bacteriana.

- (A) Nas duas situações a conduta foi correta.
 (B) Na primeira situação descrita a conduta foi correta, mas na segunda situação a dose de antibiótico foi inferior à preconizada pela American Heart Association.
 (C) Nas duas situações a conduta foi incorreta – na primeira situação a dose deveria ter sido de 400 mg, meia hora antes do procedimento, e na segunda situação, não havia indicação para a realização da profilaxia antibiótica, além do erro da dose.
 (D) Nas duas situações a conduta foi incorreta – na primeira situação a dose deveria ter sido de 400 mg, meia hora antes do procedimento, e na segunda situação, apesar de haver indicação da profilaxia antibiótica, a dose deveria ter sido de 2 g de amoxicilina de meia a uma hora antes do procedimento.
 (E) Na primeira situação descrita não havia indicação de profilaxia antibiótica, já na segunda situação descrita, a conduta foi correta de acordo com a American Heart Association (2007).

QUESTÃO 47

Paciente de 05 anos de idade, com dentição decídua, apresenta-se para consulta odontológica e, após exame físico, percebe-se que apresenta arco superior e inferior do tipo I de Baume, a análise da relação terminal dos molares apresenta-se com degrau mesial. Por estas descrições, o paciente provavelmente

- (A) não terá espaço suficiente para a erupção dos dentes permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de classe II.
 (B) não terá espaço suficiente para a erupção dos dentes permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de classe III.
 (C) terá espaço suficiente para a erupção dos dentes permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de classe II.
 (D) terá espaço suficiente para a erupção dos dentes permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de classe III.
 (E) terá espaço suficiente para a erupção dos dentes permanentes e tem tendência a desenvolver oclusão de classe I.

QUESTÃO 48

Complete as lacunas da assertiva abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

As discrepâncias dentárias interarcos ou discrepâncias de tamanho dentário, conhecidas como discrepância de _____, é baseada no fato de que a soma dos diâmetros méso-distais dos dentes _____ deve ser de alguma forma menor do que a soma dos diâmetros méso-distais dos dentes _____.

- (A) Carrea / decíduos / permanentes
 (B) Baume / decíduos / permanentes
 (C) Bolton / decíduos / permanentes
 (D) Bolton / inferiores / superiores
 (E) Carrea / inferiores / superiores

QUESTÃO 49

Sobre as infecções dos seios da face, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A sinusite infecciosa não tratada pode levar à osteomielite crônica, que pode posteriormente inocular as coberturas meníngeas do cérebro.
 () Os microrganismos normalmente envolvidos nas sinusites são os aeróbicos mistos e os anaeróbicos.
 () A sinusite causada por processos alérgicos não apresenta nível líquido.
 () Somente as sinusites agudas originadas de processos infecciosos do trato respiratório superior podem evoluir para uma sinusite crônica.

- (A) V – V – V – V.
 (B) F – F – V – V.
 (C) V – V – V – F.
 (D) F – V – F – F.
 (E) F – F – F – F.

QUESTÃO 50

Entre as medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, está a higienização das mãos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a higienização das mãos em serviços de saúde.

- (A) A clorexidina, um antisséptico utilizado para a higienização das mãos, apresenta boa atividade contra bactérias Gram positivas, menor atividade contra bactérias Gram negativas e fungos e mínima atividade contra micobactérias, além de não ser esporocida.
 (B) A clorexidina tem atividade *in vitro* contra vírus envelopados como o herpes simples, o HIV, o citomegalovírus e o vírus da influenza.
 (C) A atividade antimicrobiana da clorexidina é pouco afetada na presença de matéria orgânica, incluindo sangue.
 (D) A clorexidina tem efeito residual importante, em torno de 6 horas. A adição de baixas concentrações deste antisséptico (0,5 a 1%) às preparações alcoólicas resulta em atividade residual dessas formulações proporcionada pela clorexidina.
 (E) Formulações aquosas ou detergentes contendo 0,5%, 0,75% ou 1% de clorexidina são mais efetivas do que sabonetes não associados a antissépticos, mas menos efetivas que soluções detergentes contendo gluconato de clorexidina a 2% que, por sua vez, é menos efetiva que soluções detergentes contendo gluconato de clorexidina a 4%.

