



Concurso Público para Provimento de Vagas em
Cargos Efetivos e de Emprego Público da
Prefeitura Municipal de Assaí

CADERNO DE PROVAS

Cargo

**ENFERMEIRO
(Samu)**



Antes de iniciar a prova, leia as instruções abaixo:

1. Espere a ordem do fiscal para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul.
4. A folha de respostas compõe-se de quadrículas. Para assinalá-las, basta preencher toda a quadrícula da questão escolhida, da seguinte forma: ■
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o Fiscal comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Coloque somente seu número de inscrição; não coloque seu nome, nem na folha de respostas, nem nas provas.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal de corredor.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o verso da ficha de comprovação de inscrição, para copiar o gabarito de sua prova.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão afixados no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Assaí, e divulgados via internet, nos sites concursopublico.uniuv.edu.br e www.pmassai.com.br às 17h do dia 30 de maio de 2011.



-
1. Alguns eventos adversos são observados depois da administração de algumas vacinas. No entanto, as manifestações que ocorrem são geralmente benignas e transitórias. Das reações abaixo, qual contraindica a administração das doses subsequentes da vacina DTP, devido ao componente pertusis?
- (A) Choro persistente incontrolável, durante três horas ou mais, ocorrendo nas primeiras 48 horas após a vacinação DTP.
 - (B) Convulsões nas primeiras 72 horas após a vacinação DTP.
 - (C) Temperatura igual ou superior a 39,5°C, sem outra causa identificável, nas primeiras 48 horas após a vacinação DTP.
 - (D) Encefalopatia, nos primeiros 7 dias após a vacinação DTP.
 - (E) Episódio hipotônico-hiporresponsivo, nas primeiras 48 horas após a aplicação da vacina DTP.
2. A vacina contra a febre amarela deve ser administrada para as pessoas que viajam para as áreas endêmicas. Nesse caso, recomenda-se a vacina pelo menos:
- (A) Sete dias antes da viagem;
 - (B) Dez dias antes da viagem;
 - (C) Doze dias antes da viagem;
 - (D) Quinze dias antes da viagem;
 - (E) Vinte dias antes da viagem.
3. Em programas educativos voltados para mulheres com mais de 45 anos devem constar, entre outros itens, orientações e cuidados para a minimização da síndrome climatérica, tais como:
- I. Usar roupas de tecido de algodão ou fibras naturais que absorvem melhor a sudorese;
 - II. Manter a vida sexual ativa, pois a atividade sexual contribui para a lubrificação vaginal;
 - III. Fazer exercícios físicos, como caminhar, dançar ou nadar 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes por semana.
- Está correto o apresentado em:
- (A) I, II e III;
 - (B) I e III apenas;
 - (C) III apenas;
 - (D) II apenas;
 - (E) I apenas.
4. Sobre as terminologias utilizadas em oncologia, assinale a alternativa correta.
- (A) Carcinogênese – processo de transformar as células anormais em células malignas.
 - (B) Estagiamento – processo de determinar a quantidade e a disseminação, ou metástese, de um tumor.
 - (C) Quimioterapia – medicamentos para matar as células ao interferir em suas funções e reprodução.
 - (D) Metástese – diminuição das células cancerosas, a partir do tumor primário.
 - (E) Neoplasia – crescimento celular controlado, que segue a demanda fisiológica.



5. Elizabeth Kubler Ross descreve os estágios experimentados por alguns pacientes nos momentos que antecedem sua morte. Ao identificar o estágio de negação, no qual a pessoa não acredita que vai morrer, o enfermeiro deve:

- () Contradizer diretamente o paciente.
- () Manter uma comunicação franca com ele.
- () Orientar o paciente de que tudo acabará sem sofrimento.
- () Ouvir com atenção o desabafo realístico sobre a doença.

Marque F (falso) e V (verdadeiro) e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, V e F;
- (B) F, F, V e V;
- (C) V, V, F e F;
- (D) V, F, V e F;
- (E) F, V, F e V.

6. Durante a fase de avaliação no processo de enfermagem, o enfermeiro visa:

- (A) À coleta e análise de dados;
- (B) À seleção de ações de enfermagem;
- (C) À avaliação do plano de assistência;
- (D) À conferência sobre assistência ao paciente;
- (E) À conferência da história clínica obtida pelo médico.

7. Com o intuito de beneficiar os idosos, foi instituída a vacinação contra influenza, para proteção de grupos vulneráveis. O esquema de administração é normalmente realizado uma vez ao ano. Os efeitos adversos mais comuns são, EXCETO:

- (A) Dor local;
- (B) Febre;
- (C) Mal-estar;
- (D) Mialgia;
- (E) Reação anafilática.

8. A CK – MB é liberada quando há:

- (A) Anormalidade lipoproteica miocárdica;
- (B) Processo inflamatório cardíaco;
- (C) Pressão arterial sistólica aumentada;
- (D) Pressão sistólica diminuída;
- (E) Lesão nas células miocárdicas.

9. Na assistência ao recém-nascido, na sala de parto, devemos mantê-la com equipamentos e materiais essenciais para eventuais intercorrências. São exemplos desses equipamentos e materiais, EXCETO:

- (A) Laringoscópio com lâminas retas (0 e 1);



-
- (B) Fonte de oxigênio umidificado e aquecido com fluxômetro;
(C) Fonte de óxido nítrico;
(D) Material para cateterização de vasos umbilicais;
(E) Ambu com máscaras faciais.
10. Lóquios são a eliminação de exsudatos e transudatos, misturados com elementos celulares descamados e sangue. A sequência correta de lóquios, no decorrer dos dias de puerpério, é:
- (A) Lóquios rubro, fusca e flava;
(B) Lóquios fusca, rubro e flava;
(C) Lóquios rubro, flava e fusca;
(D) Lóquios fusca, flava e rubro;
(E) Lóquios flava, rubro e fusca.
11. A vacina contra a rubéola também é indicada para controlar e eliminar a Síndrome da Rubéola congênita (SRC), (proteger a mulher em idade fértil). Se aplicada monovalente em mulheres pós-puberais, o efeito adverso mais comum é:
- (A) Manifestações articular transitória;
(B) Doença febril aguda;
(C) Enduração local crônica;
(D) Manifestações purpúricas;
(E) Paralisias faciais.
12. A síndrome Hellp é uma complicação obstétrica grave, que requer intervenções emergenciais. Qual o quadro clínico e achados laboratoriais correspondentes?
- (A) Hipertensão arterial, hiponatremia, cianose, náuseas e / ou vômito e bilirrubina total $< 1,2$ mg /dl.
(B) Hipertensão arterial, taquicardia, cianose, náuseas e/ ou vômito, hipoglicemia e plaquetas $> 100.000 / \text{mm}^3$.
(C) Hipertensão arterial, náuseas, e / ou vômito, gengivorragia, icterícia, petéquias e plaquetas $< 100.000 / \text{mm}^3$.
(D) Hipertensão arterial, edema, náusea e / ou vômito, hiponatremia e TGO < 70 U/L.
(E) Hipertensão arterial, edema generalizado, hiperglicemia, náuseas e ou vômitos.
13. Assinale a opção que apresenta o mecanismo de controle social no Sistema Único de Saúde:
- (A) As CIB;
(B) As CIT;
(C) Os CMS;
(D) CONASS;
(E) A Vigilância Sanitária.
14. Várias técnicas, isoladas ou combinadas, são utilizadas para garantir a eficácia dos processos de preparo, acondicionamento e esterilização de materiais. Sobre esses processos, é correto afirmar que:



-
- (A) Os invólucros preferencialmente utilizados para acondicionamento de artigos hospitalares são os que contêm, na sua composição, amido, celulose ou outro nutriente microbiano.
- (B) O enxágue cuidadoso é dispensável para artigos esterilizados a vapor sob pressão, considerando-se que, durante o processo, eles serão novamente umedecidos.
- (C) A estocagem do material esterilizado deve ser em estante aberta ou fechada, para permanecer estéril.
- (D) O empilhamento horizontal dos pacotes a serem esterilizados em autoclave é o mais indicado, porque dispensa a penetração do vapor e dispersa o calor por contiguidade.
- (E) Um artigo é considerado estéril, quando a possibilidade de sobrevivência de um agente contaminante é menor que 1: 1.000.000.

15. A pena de suspensão do exercício profissional ou ocupacional NÃO poderá exceder:

- (A) 10 dias;
- (B) 20 dias;
- (C) 30 dias;
- (D) 40 dias;
- (E) 50 dias.

16. Os principais aspectos clínicos da ceto-acidose diabética são:

- (A) Hipoglicemia, desidratação, perda eletrolítica e acidose;
- (B) Hiperglicemia, desidratação, perda eletrolítica e acidose;
- (C) Hipoglicemia, convulsões e dificuldade em acordar;
- (D) Hipoglicemia, acidose e dificuldade em acordar;
- (E) Hiperglicemia, perda da consciência e acidose.

17. As lesões por esmagamento acontecem quando uma pessoa fica presa entre dois objetos, quando um veículo em movimento passa por cima dela ou quando ela é comprimida por máquinas. Nesses casos, além de manter a via aérea permeável e a circulação, o paciente deve ser observado para sinais e sintomas de:

- (A) Tétano;
- (B) Insuficiência renal aguda;
- (C) Infarto agudo do miocárdio;
- (D) Retardo mental;
- (E) Edema agudo de pulmão.

18. O trauma em idosos corresponde à sexta causa de morte nessa faixa etária. As causas mais frequentes de trauma nessa faixa etária são:

- (A) Maus tratos;
- (B) Acidentes com arma branca;
- (C) Quedas;
- (D) Acidentes com objetos cortantes;
- (E) Acidentes com arma de fogo.



19. A Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, sendo conhecida como Lei Orgânica do SUS (Sistema Único de Saúde). Em relação a essa Lei, considere as seguintes afirmativas:

- 1) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- 2) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- 3) O dever do Estado exclui o das pessoas da família, das empresas e da sociedade.
- 4) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outras, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.

Estão contemplados no texto da Lei 8080 os itens:

- (A) 1 e 2 apenas;
- (B) 1, 2 e 3 apenas;
- (C) 2, 3 e 4 apenas;
- (D) 3 e 4 apenas;
- (E) 1, 2 e 4 apenas.

20. Lei que regulamenta o exercício da enfermagem:

- (A) Lei nº 8.080;
- (B) Lei nº 8.142;
- (C) Lei nº 8.078;
- (D) Lei nº 7.498;
- (E) Lei nº 5.905.

21. O mecanismo do trabalho de parto é definido como a sequência de movimentos passivos da parte que se apresenta, que permitem a passagem por meio do canal de parto. Esses movimentos são por ordem de ocorrência:

- (A) Situação, descida, extensão, rotação interna, flexão e rotação externa;
- (B) Apresentação, descida, flexão, rotação interna, rotação externa e extensão;
- (C) Insinuação, descida, flexão, rotação interna, extensão e rotação externa;
- (D) descida, flexão, rotação interna, extensão e rotação externa;
- (E) Encaixe, descida, extensão, rotação interna, flexão e rotação externa.

22. O ato de friccionar o algodão com álcool a 70% na pele, antes de realizar uma punção venosa, é conhecida por:

- (A) Assepsia;
- (B) Anticontaminação;



-
- (C) Esterilização;
(D) Antissepsia;
(E) Desinfecção.
23. No que diz respeito à composição da comissão de ética de enfermagem, é correto afirmar que deverá ser composta por:
- (A) Enfermeiros somente;
(B) Enfermeiros e técnicos somente;
(C) Enfermeiros que sejam membros da diretoria nos órgãos de classe;
(D) Somente enfermeiros que exerçam cargos de direção, chefia e gerência de enfermagem;
(E) Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, prepostos do estabelecimento em que atuam profissionalmente.
24. Quando o paciente chega apresentando tosse produtiva e persistente, por mais de 3 semanas, fadiga, perda de peso e hemoptise, sugere:
- (A) Hanseníase;
(B) Hantavirose;
(C) Tuberculose;
(D) AIDS;
(E) Câncer.
25. O Programa Nacional de Imunização recomenda:
- (A) Gestantes com três doses de dT, e última dose aplicada há menos de cinco anos, será considerada imunizada e não será necessário dose de reforço.
(B) Gestante com esquema de vacinação antitetânica completo e última dose há mais de cinco anos deve reiniciar o esquema.
(C) Ao nascer, o RN deve ser vacinado apenas com a vacina BCG.
(D) Vacinar crianças a partir dos 2 meses com DPT, que imuniza contra Difteria, Pneumonia e Tétano.
(E) A vacina contra Hepatite B deve ser administrada em dose única aos seis meses.
26. Que cuidados de enfermagem devem ser dispensados à criança internada na unidade de emergência pediátrica com problemas respiratórios?
- (A) Manter cabeceira elevada, jejum nas primeiras 24 horas, controle rigoroso da frequência respiratória.
(B) Manter em decúbito ventral, jejum por 12 horas, controle de pressão arterial.
(C) Manter cabeceira elevada, alimentação pastosa, controle rigoroso da frequência respiratória.
(D) Manter cabeceira elevada em 45° graus, dieta livre para idade, controle rigoroso da frequência respiratória.
(E) Manter cabeceira em 45° graus, dieta líquida, controle rigoroso da frequência respiratória.
27. O Teste do Pezinho tem como finalidade a detecção de doenças que podem deixar sequelas graves, caso não sejam diagnosticadas e tratadas precocemente. Para atingir esse objetivo, a coleta de sangue deve ser realizada:



- (A) No momento do parto, por ordenha do cordão umbilical;
- (B) Antes de a criança ser amamentada pela primeira vez;
- (C) Somente após a criança completar 48 horas de vida;
- (D) Em veia periférica, utilizando-se seringa e agulha, se a criança pesar menos de 2.500 g;
- (E) Nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido.

28. Em relação às Doenças Sexualmente transmissíveis (DST), considere as seguintes afirmativas:

- 1) A tricomoníase é uma infecção causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis* e não pode ser classificada como uma DST, mas, como uma vulvovaginite.
- 2) O linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, caracterizada pela presença do bubão inguinal.
- 3) Das mulheres com infecção por gonorreia e ou clamídia não tratadas, 10 a 40% desenvolvem doença inflamatória pélvica (DIP).
- 4) A sífilis é uma DST, não transmissível por via transplacentária, por ser causada pelo vírus *Treponema Pallidum*.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente 1, 2 e 4 são verdadeiras;
- (B) Somente 2 e 3 são verdadeiras;
- (C) Somente 2, 3 e 4 são verdadeiras;
- (D) Somente 1 e 3 são verdadeiras;
- (E) Somente 1 e 4 são verdadeiras.

29. Segundo estudos e observações, a idade mais precoce com que o bebê pode começar a andar é a partir dos:

- (A) 9 meses;
- (B) 10 meses;
- (C) 11 meses;
- (D) 12 meses;
- (E) 15 meses.

30. Assinale a alternativa que corresponde aos materiais de densidade:

- (A) Bandejas e cubas;
- (B) Gazes, compressas e campos;
- (C) Agulhas e compressas;
- (D) Agulhas, compressas e gazes;
- (E) Caixas cirúrgicas e cubas.

31. Hipercalemia significa que, no sangue, há:

- (A) Excesso de potássio;
- (B) Insuficiência de cálcio;
- (C) Excesso de sódio;
- (D) Insuficiência de cloro;
- (E) Excesso de bicarbonato de sódio.



32. Retirar toda a roupa da criança, exceto a fralda, para proteção das gônadas, é procedimento usado durante a:

- (A) Ventilação assistida;
- (B) Quimioterapia;
- (C) Fototerapia;
- (D) Umidificação;
- (E) Nebulização.

33. Na administração de medicação intramuscular em recém-natos (RN), o local mais apropriado é a região da face ântero-lateral da coxa. Qual o volume máximo recomendado para essa via, em RN com peso maior de 1.000 g?

- (A) 1,0 ml;
- (B) 0,85 ml;
- (C) 0,5 ml;
- (D) 0,25 ml;
- (E) 1,5 ml.

34. Numere a coluna da direita com base na coluna da esquerda.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Ocorre quando a pessoa realiza exercícios excessivos em ambiente aquecido. | () queimadura térmica. |
| 2. Causada por fogo, vapores quentes e objetos quentes. | () queimadura química. |
| 3. Causada por vários cáusticos, substâncias ácidas e álcalis. | () queimadura de segundo grau. |
| 4. Atinge a epiderme e caracteriza-se por dor local e vermelhidão na área atingida. | () intermação. |
| 5. Atinge a epiderme e a derme, caracterizando-se por dor, vermelhidão e formação de bolhas. | () queimadura de primeiro grau. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita de cima para baixo.

- (A) 2 – 3 – 5 – 1 – 4;
- (B) 2 – 4 – 5 – 1 – 3;
- (C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5;
- (D) 3 – 5 – 2 – 1 – 4;
- (E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

35. Artigos críticos apresentam alto risco de transmissão de infecção, se estiver contaminado com qualquer micro-organismo. Um exemplo de artigo crítico é:

- (A) Laringoscópio;
- (B) Cateter cardíaco;
- (C) Esfigmomanômetro;
- (D) Endoscopia flexível;
- (E) Máscara de Venturi.



36. J. A. C. deu entrada em uma maternidade, no dia 28-05-2003, com sinais e sintomas de trabalho de parto ativo. Ao ser interrogada pelo plantão médico, informou que a data de sua menstruação (DUM) foi 15-08-2002. Nesse caso, a idade gestacional é:
- (A) 40 semanas;
 - (B) 41 semanas;
 - (C) 39 semanas e dois dias;
 - (D) 40 semanas e seis dias;
 - (E) 38 semanas.
37. A hemorragia puerperal é uma complicação de alta incidência de mortalidade materna nas primeiras horas após o parto. A alternativa que apresenta sinais dessa complicação é:
- (A) Hipertensão arterial;
 - (B) Útero macio e acima do umbigo;
 - (C) Lóquios em quantidade diminuída;
 - (D) Lóquios sanguinolentos vermelho-escuros;
 - (E) Diminuição das frequências cardíaca e respiratória.
38. Devemos manter o paciente na posição dorsal, sem travesseiro, para prevenir cefaleia pós-operatório imediato, quando ele recebeu anestesia do tipo:
- (A) Geral;
 - (B) Raquidiana;
 - (C) Peridural;
 - (D) Local;
 - (E) Inalação.
39. Quanto à raiva humana, é correto afirmar:
- (A) A raiva humana se manifesta imediatamente após a mordida por animais infectados.
 - (B) A possibilidade de cura da raiva humana ocorre quando a internação é feita.
 - (C) A bactéria de transmissão é *Lissabacterium* e está presente na saliva do animal infectado.
 - (D) A raiva humana é sempre letal. O vírus invade as terminações nervosas locais e o sistema nervoso central.
 - (E) Vacina com vírus ativado é feita 0,5 ml intramuscular e não aplicada na região glútea.
40. São sinais de flebite:
- (A) Edema, febre e rubor;
 - (B) Calor, dor e hipotensão;
 - (C) Edema, calor e rubor;
 - (D) Rubor, febre e dor;
 - (E) Dor, edema e hipotensão.



FOLHA DE RESPOSTAS

EMPREGO PÚBLICO	Nº. DE INSCRIÇÃO
Enfermeiro	<hr/>

Preencha toda a quadrícula correspondente à resposta certa. Mais de uma resposta na coluna anulará a questão, mesmo que uma esteja correta.

QUESTÕES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

QUESTÕES																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Nº. DE RESPOSTAS CERTAS	NOTA	RUBRICA DO AVALIADOR