

1. É função do técnico de enfermagem no centro cirúrgico:
 - a) Auxiliar o enfermeiro, conferir salas, recepcionar o paciente e peças quando retiradas, acompanhar e assistir o paciente na RPA. E demais atribuições delegadas pelo enfermeiro do setor.
 - b) Circular a sala e assegurar a qualidade do serviço provendo recursos materiais. E demais orientações delegadas pelo enfermeiro.
 - c) Auxiliar o enfermeiro, quando necessário, verificar materiais, validades, conferir e receber peças e encaminha-las de forma corretas e demais funções delegadas pelo médico chefe da equipe.
 - d) Executar limpeza e zelar pela manutenção da ordem da unidade. Fazer suturas e curativos pós-cirurgia.

2. No procedimento de SVD, sondagem vesical de demora, há diferença na técnica de sondagem de acordo com gênero do paciente, masculino e feminino?
 - a) Não há diferença o procedimento é exatamente igual independente do sexo.
 - b) Há diferença tanto no procedimento de passagem da sonda quando ta na fixação. No homem é possível injetar lidocaína com uma seringa no meato urinário e a fixação é feita entre a cicatriz umbilical e a virilha, na mulher apenas aplica a lidocaína na sonda e introduz fixando na coxa.
 - c) Há diferença esta no calibre da sonda que vai variar de acordo com a idade do paciente. Variando o calibre diferenciando apenas crianças e adultos.
 - d) Há diferença esta justamente no gênero nos homens usamos uripen e na mulher apenas sondagem.

3. Nos cuidados de enfermagem com dreno de tórax é incorreto afirmar que:
 - a) O dreno deve permanecer sempre abaixo da linha do tórax.
 - b) O dreno deve estar sempre oscilando.
 - c) Não se deve esquecer nunca o selo d'água no frasco do dreno.
 - d) O paciente não deve fazer mudança de decúbito e manter se em decúbito dorsal com repouso absoluto devido a dor no local do dreno.

4. Cerca de 5,2 milhões de pessoas soropositivas recebiam tratamento contra o VIH até o final de 2009, segundo os últimos dados, pela OMS (Organização Mundial da Saúde) durante a 18ª Conferência Internacional sobre a SIDA. Podemos afirmar que:
 - a) O tratamento hoje é acessível de certa forma a grande parte da população seja de maior ou menor poder aquisitivo. E acaba vez fica mais proximo de todos o tratamento.
 - b) Disponível quanto a informação de como se pode prevenir a infecção pelo HIV.
 - c) Que vem aumentando o número de portadores da SIDA em nosso meio. Devido a ineficácia do tratamento, pois não cura todos os portadores.
 - d) A prevenção pode ser feita através de vacina e escolha do parceiro sexual examinando atentamente antes de manter relações mais intimas.

5. Faz parte das doenças de notificação compulsória segundo o Centro de CVE:
 - a) Infarto Agudo do Miocárdio.
 - b) Botulismo, coqueluche e dengue entre malária entre outras.
 - c) Botulismo, coqueluche, dengue, SIDA, hepatites medicamentosa.
 - d) Neuropatia diabética, AVC, IAM, Influenza.

6. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o diabetes acomete mais de 250 milhões de pessoas no mundo e, se nenhuma providência for tomada, calcula-se que esse número alcance os 380 milhões até 2025. No Brasil, em 2006, já tínhamos mais de 10 milhões de pessoas com diabetes, sendo mais de 8 milhões com idade entre 30-69 anos e 1,5 milhão acima de 69 anos. Atualmente, estima-se que cerca da metade deles ainda desconhece o próprio problema. Considera se diabético o individuo que:
 - a) Tem exame sérico de *glicemia com valor entre 70 a 110 mg/dℓ*.
 - b) Tem como resultado de exame sérico ou valor maior ou igual a 120mg/dℓ.
 - c) Tem exame sérico de *glicemia com valor entre 55 a 100 mg/dℓ*.
 - d) Tem como resultado um teste rápido de glicemia capilar sem jejum com resultado de 139mg dℓ.

7. Segundo o código de ética de enfermagem Art.7º o técnico de enfermagem pode:
 - a) Recusar-se de atender a pacientes que não sejam de seu mesmo credo religioso ou que ferem seus preceitos humanos. Exemplo: suicidas e praticantes de aborto.
 - b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - c) Recusar- se de executar suas atividades quando acabar o expediente interrompendo assim a assistência.
 - d) Recusar-se de passar o plantão quando o plantonista seguinte tiver atraso maior ou igual a 30 minutos.

8. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2009) indicam que mais de um milhão de recém-nascidos morrem por ano nas primeiras 24 horas de vida, por falta de assistência qualificada. Dessa forma, há uma necessidade de uma assistência eficaz, exigindo do enfermeiro e sua equipe um conhecimento e habilidades técnico-científicas. Faz parte dos cuidados imediatos:
 - a) Aquecer imediatamente, pois o RN pode morrer com a perda de calor, aspirar vias áreas ou virar o RN de cabeça para baixo segurando pelas pernas.
 - b) Aquecer imediatamente, observar se respira, e a qualidade desta respiração, profilaxia de oftalmia gonocócica avaliar conforme a escala de Apgar.
 - c) Aspirar imediatamente o RN afinal deve haver água em seus pulmões, depois limpar com uma compressa todo vernix caseoso, para evitar infecção.
 - d) Amamentar o RN com leite materno afinal ele passou nove meses sem o mesmo depois aspirar, aquecer junto a mãe fazendo assim um cuidado humanizado.

9. Na assistência de enfermagem em UTI um dos parâmetros específicos na assistência ao paciente grave é o PVC que seu valor normal entre:
 - a) Pressão Venosa Central, com valor de 0 a 8 mmhg, quando medida na linha axilar média. Uma medida isolada pode não ser significativa, sendo importante monitorar.
 - b) Pressão Venosa Circulatória, com seu valor maior que a pressão diastólica do paciente.
 - c) Posição Venral Central, afinal é a mais confortável para o paciente em Unidade de Terapia Intensiva.
 - d) Pressão Venosa Central, com valor de 8 a 40 mmhg, quando medida na linha axilar média.

- 10.** Paciente internado na enfermaria de um hospital com prescrição médica de 1.500 mL de soro glicosado a 5% em 24h. Sabendo-se que 20 gotas equivalem a 1 mL, o fluxo, em gotas por minuto, deve corresponder em:
- 15.
 - 20.
 - 30.
 - 45.
-
- 11.** São fatores que contribuem para alteração da pressão arterial:
- Antes da menopausa, as mulheres apresentam pressão maior do que os homens de idade similar.**
 - A angústia e o frio diminui a pressão.**
 - Indivíduos obesos tendem a ser hipotensos.**
- Essas opções estão:
- Todas incorretas.
 - Todas corretas.
 - Somente uma delas está correta.
 - Duas delas estão corretas.
-
- 12.** Sobre a transmissão vertical do HIV, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta.
- A transmissão do HIV e Sífilis acontece somente na hora do parto.
 - A transmissão vertical é situação em que a criança é infectada durante a gestação, no parto ou por meio da amamentação.
 - A cesariana eletiva constitui o único fator de proteção contra a transmissão do HIV.
 - Os antirretrovirais não devem ser utilizados durante a gravidez, pois atrapalham o desenvolvimento da criança.
-
- 13.** Reconhecemos que a ocorrência da sífilis durante a gravidez é extremamente grave para o feto. Assinale o antibiótico recomendado para esse tratamento.
- Sulfadiazina.
 - Azitromicina.
 - Penicilina benzatina.
 - Cefalexina.
-
- 14.** O pós-operatório imediato consiste, entre outros cuidados de enfermagem, na verificação dos sinais vitais na seguinte frequência:
- De hora em hora nas primeiras 24 horas.
 - 15 em 15 minutos nas primeiras 12 horas.
 - 15 em 15 minutos na primeira hora.
 - 15 em 15 minutos nas primeiras 24 horas.
-
- 15.** A escala de coma de Glasgow é clássica e é a forma mais objetiva de avaliar nível de consciência do paciente, permitindo comparações seriadas e dando uma boa ideia ao médico e a equipe de enfermagem da evolução do estado do paciente grave, esta escala avalia três parâmetros de resposta a estímulos que são:
- Abertura ocular melhor resposta verbal, melhor resposta motora.
 - Resposta verbal e resposta motora.
 - Pupilas e déficit visual.
 - Tom de voz, tipo de linguagem e pressão arterial.
-
- 16.** Em ordem de prioridades nos cuidados de emergência a serem prestados pela equipe de enfermagem ao paciente que chega ao Pronto-Socorro apresentando quadro de hematêmese, dispneia e hipotensão são:
- Passar sonda nasogástrica, monitorar sinais vitais e instalar oxigênio.
 - Fazer lavagem gástrica e chamar o médico.
 - Puncionar veia calibrosa, instalando soro fisiológico, instalar oxigênio e monitorar sinais vitais.
 - Chamar o médico de plantão, monitorar sinais vitais e puncionar veia calibrosa e passar sonda nasogástrica.
-
- 17.** Um paciente com confirmação do diagnóstico de meningite meningocócica deve permanecer até 24h após o início do tratamento com antibióticos, qual o tipo de isolamento para esse paciente?
- Total.
 - Entérico.
 - De contato.
 - Respiratório.
-
- 18.** Paciente deu entrada no Pronto-Socorro com quadro clínico de prurido generalizado, Hipotensão, tonturas, Náuseas e vômitos. Este quadro é sugestivo de choque:
- Hipovolêmico.
 - Cardiogênico.
 - Anafilático.
 - Térmico.
-
- 19.** Dentre os sinais da hipoglicemia de rebote os mais específicos deste evento são:
- Desorientação, hipotermia, hemorragia e diminuição da frequência cardíaca.
 - Fraqueza, sudorese, tremores e aumento da frequência cardíaca.
 - Dor abdominal, desidratação, hipertermia e convulsão.
 - Dispneia, hemorragia, edema e letargia.
-
- 20.** Assinale a única alternativa que descreve princípios norteadores das condutas humanas que fundamentam a ética e a bioética:
- Concordância, veracidade, valor ético, bem-estar e consideração.
 - Autonomia, justiça, equidade, veracidade, e confiabilidade.
 - Confiança, autonomia, equidade, justiça e moralidade.
 - Harmonia, pluralidade de valores, justiça, moralidade e confiança.
-
- 21.** A Lei de regulamentação do Exercício da Enfermagem está contida no (na):
- Lei nº 5.905, de 12 de junho de 1973.
 - Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987.
 - Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986.
 - Lei nº 9.478, de 25 de junho de 1986.
-
- 22.** Como medidas para a prevenção do câncer uterino e de mamas, em mulheres com menos de 40 anos de idade respectivamente são:
- Consulta Ginecológica periódica e mamografia.
 - Ultrassonografia abdominal e mamografia.
 - Exame de esfregaço cérvico-vaginal e exame das mamas.
 - Ultrassonografia pélvica e autoexame das mamas.

23. Analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.
- (...) **A decisão de abertura ou não de sindicância ética é de incumbência da chefia de enfermagem, gerência ou supervisão.**
- (...) **Se, realmente, for constatada infração ética, o conselho instaura o processo ético que culminará com absolvição ou condenação do denunciado e aplicação de penalidade.**
- (...) **Geralmente, a comissão deve realizar sindicância frente a qualquer denúncia de infração ética, em que são ouvidas as pessoas envolvidas e o caso é analisado.**
- (...) **As Comissões de Ética na Enfermagem têm como finalidade, segundo a Resolução n. 172/COFEN: Garantir a conduta ética dos profissionais de Enfermagem na instituição; zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem na instituição, combatendo o exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e divulgando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e notificar irregularidades, reivindicações, sugestões e as infrações éticas ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.**
- a) F, V, F, V.
b) F, V, V, V.
c) V, V, F, F.
d) V, V, V, F.
-
24. O Brasil, país com grande abrangência populacional, procura cada vez mais melhorar o atendimento de saúde da população e as ações de saúde são consideradas de relevância pública e devem ser organizados de acordo com as seguintes diretrizes:
- a) Prevenção, assistência e reabilitação.
b) Universalidade, equidade e integralidade.
c) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
d) Universalidade, gratuidade e integralidade.
-
25. Reconhecer os sinais e sintomas de uma parada cardiorrespiratória é fundamental para o sucesso das manobras de reanimação cardiopulmonar cerebral (RCPC), procurando minimizar os danos cerebrais que ocorrem de forma mais grave após 4 a 6 minutos. Os sinais sugestivos da evolução do paciente para esse colapso são:
- a) Diminuição do nível de consciência, baixa responsividade aos estímulos dolorosos, ausência de resposta verbal, hipotensão, cianose e respiração agônica.
b) Hipotensão, cianose e respiração agônica, cefaléia halo craniana, agressividade, respiração agônica.
c) Diminuição do nível de consciência, agitação psicomotora, hemorragia, bradipneia.
d) Bradipneia, hipotensão, fala pastosa e desconexa, baixa responsividade aos estímulos dolorosos.
-
26. A complicação pós-operatória que pode ocorrer a ferida cirúrgica de paciente portador de Diabetes está representada por:
- a) Deiscência.
b) Hematoma.
c) Ingurgitamento.
d) Evisceração.
-
27. O problema de incompatibilidade Rh ocorre quando uma mulher Rh(-) engravida de um homem Rh(+) e gesta um feto Rh(+). Essa gestação pode levar o recém-nascido a desenvolver:
- a) Retardo do desenvolvimento.
b) Doença de Paget.
c) Turgor mamário.
d) Eritroblastose fetal.
-
28. É possível classificar as queimaduras conforme a área de superfície corporal queimada, pois são avaliadas pela extensão e profundidade. Pode-se classificar como queimadura de 2º grau aquela que apresenta:
- a) Hiperemia dor local, formação de bolhas e é necessário o controle da dor e do risco de infecção, pois chega a atingir a derme e epiderme.
b) Hiperemia dor local melhoram em até uma semana e é necessário controle de dor e do risco de infecção.
c) Lesões secas e esbranquiçadas, dor local, atinge apenas a epiderme.
d) Atinge epiderme, músculos, apresentam bolhas, o risco de infecção é muito alto e pode ser necessário desbridamento.
-
29. A síndrome da angustia respiratória aguda (SARA) é considerada uma afecção respiratória grave, com alto índice de mortalidade e que necessita de internação em UTI para suporte ventilatório invasivo, pois essa patologia afeta diretamente os pulmões, alguns cuidados principais de enfermagem são:
- a) Monitorar pressão venosa central, e colocar na posição Trendelemburg, para melhorar a expansibilidade pulmonar.
b) Mudança de decúbito incluindo a posição PRONA para favorecer a expansibilidade pulmonar e decúbito elevado para diminuir edema facial.
c) Manter o paciente em posição de Tremdelemburd para diminuir edema facial e membros inferiores pendentes no leito.
d) Manter o paciente em posição de litotimia, para melhorar e expansibilidade pulmonar.
-
30. Senhora M.S. levou seu filho até a Unidade Básica Saúde. Na carteirinha constava que acriança tinha recebido a vacina contra tuberculose (BCG) com 1 mês de idade, conforme comprovação pela carteira de vacina. Agora a criança está com 4 meses e 15 dias de idade, não foi observada a presença de cicatriz dessa vacina. Nesse caso, deve-se.
- a) Aguardar a criança completar 10 anos de idade para aplicar nova dose da vacina BCG.
b) Aguardar a criança completar seis meses de idade para reavaliação da presença de cicatriz vacinal e na ausência desta cicatriz, recomenda-se a revacinação contra a tuberculose (BCG), sem a realização prévia do teste tuberculínico (PPD).
c) Aguardar a criança completar seis meses de idade e se a cicatriz estiver ausente até este período, revacinar a criança.
d) Aplicar nova dose da vacina contra BCG independente da idade da criança.
-
31. Aponte a alternativa em que a crase foi utilizada incorretamente:
- a) Fomos à cidade de Pedro de Toledo.
b) Amanhã vamos à casa da vovó.
c) Preciso daquela revista que está sobre à mesa.
d) A festa ficou às moscas.
-
32. Assinale a alternativa em que a estrutura verbal está na voz passiva:
- a) Os funcionários da repartição enviaram as cartas para os réus.
b) Os funcionários da repartição teriam enviado as cartas para os réus.
c) As cartas para os réus haviam sido enviadas pelos funcionários da repartição.
d) Enviaram as cartas para os réus, os funcionários da repartição.

33. A conjunção subordinativa abaixo traz a frase o sentido de:
Fiquei constrangido porque quebrei o copo de cristal da avó dela.
- Comparação.
 - Concessão.
 - Proporção.
 - Causa.
-
34. Aponte a alternativa em que há erro quanto ao gênero do substantivo:
- Vou comprar trezentas gramas de presunto.
 - A pane no sistema não foi solucionada.
 - Fizemos um suco muito refrescante com aquele guaraná.
 - O mármore foi colocado em todo o chão da cozinha.
-
35. Aponte a alternativa em que há erro de regência:
- Eu confio em você em qualquer situação.
 - Nós somos versados em música clássica.
 - Você foi cruel para com ele.
 - Ela parou rente a calçada.
-
36. Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância nominal:
- A sua presença aqui é necessária.
 - Não havia roupas bastantes para colocar nos armários.
 - Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento.
 - Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva.
-
37. Acerca da concordância verbal, analise as afirmativas abaixo:
- Pedro de Toledo tem um belo jardim central.**
 - Comprou-se dois terrenos exorbitantes no centro da cidade.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
-
38. **Pedro de Toledo, cidade do Estado de São Paulo, possui ruas arborizadas.** O termo em destaque se classifica sintaticamente como:
- Aposto.
 - Vocativo.
 - Adjunto adnominal.
 - Adjunto adverbial.
-
39. Sobre a colocação pronominal, analise as assertivas abaixo:
- Eles me deram o comprovante para eu analisar.**
 - Eu quero muito viajar contigo no final de semana.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
-
40. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado de forma incorreta:
- Você precisa perder essa mania de ficar contando seus passos.
 - O prazo para atualizar aquele serviço expirou.
 - A cena foi perfeitamente descrita pela jornalista.
 - A sua atitude não sortiu efeito.
-
41. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras, e aponte a alternativa correta:
Houve um _____ na comunidade sobre os _____ daquela mulher.
- Borburinho – privilégios.
 - Burburinho – privilégios.
 - Borborinho – privilégios.
 - Burburinho – privilégios.
-
42. No primeiro ano do século XXI, ocorreram atentados terroristas contra os Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo norte-americano culpou o grupo terrorista Al-Qaeda por esses atos. A principal base e campos de treinamento desse grupo terrorista localizavam-se:
- No Iraque.
 - No Afeganistão.
 - No Irã.
 - Na Líbia.
-
43. Em março de 2011 um terremoto, seguido de um tsunami e um acidente nuclear devastou algumas cidades do nordeste do Japão, deixando toda a população japonesa aflita. Assim, acerca dos seus conhecimentos, assinale a alternativa em que as cidades foram diretamente atingidas pela catástrofe:
- Sendai e Osaka.
 - Osaka e Fukushima.
 - Tóquio e Osaka.
 - Sendai e Fukushima.
-
44. Qual é o capital que quando aplicado a 2% ao mês por 3 meses, gera a mesma quantia de juros que rende esse mesmo capital se aplicado a 1,5% ao ano durante 4 anos, sabendo que o juro obtido nas duas aplicações a juros simples é R\$ 5.400,00?
- R\$ 60.000,00.
 - R\$ 21.000,00.
 - R\$ 38.000,00.
 - R\$ 90.000,00.
-
45. Qual é o valor numérico da expressão $-5a^3b + 2a^4bc - 5ab^2c - a^2b^3c^2$, sendo que $a = -1$, $b = -2$ e $c = -3$?
- 110.
 - 14.
 - 130.
 - 82.
-
46. Qual é o perímetro de um triângulo cujo lado menor mede 30 cm, sabendo que ele é semelhante a outro triângulo cujos lados medem 12 cm, 20 cm e 42 cm?
- 96 cm.
 - 128 cm.
 - 185 cm.
 - 152 cm.
-
47. Qual o monômio que se deve adicionar a $42a^2b^3c + 9b^4$ para que se torne um trinômio quadrado perfeito?
- $21a^2bc$.
 - $7a^2bc$.
 - $7a^2c$.
 - $49a^4b^2c^2$.

48. Qual é outra forma correta de se escrever $\frac{1}{81}$?

- a) 3^4 .
- b) $(-9)^3$.
- c) $(-3)^4$.
- d) 3^{-4} .

49. Quantos dias 16 máquinas demorarão a embalar 57.600 ovos de Páscoa, sabendo que 5.000 ovos iguais aos primeiros foram embalados por 20 máquinas em 5 dias?

- a) 68 dias.
- b) 36 dias.
- c) 72 dias.
- d) 48 dias.

50. Para ladrilhar um salão de festas retangular foram usados 750 ladrilhos quadrados. Sabendo que o salão tem 7,5 m de comprimento por 4 m de largura, quanto mede o lado de cada ladrilho?

- a) 4 cm.
- b) 2 cm.
- c) 40 cm.
- d) 20 cm.