



**OSEP**  
**Processo Seletivo Simplificado 01/2012**



**CARGO:**  
**TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



## Cargo: Técnico em Imobilizações Ortopédicas

### Língua Portuguesa

Leia o texto e responda a questão 01.

Nem tudo é fácil

É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste.  
É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada  
É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para sempre.  
É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver mais um dia.  
É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar os olhos e atravessar a rua.  
É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar que sempre falta algo.  
É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar.  
É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o próprio umbigo.  
Se você errou, peça desculpas...  
É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser perdoado?  
Se alguém errou com você, perdoa-o...  
É difícil perdoar? Mas quem disse que é fácil se arrepender?  
Se você sente algo, diga...  
É difícil se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar?  
Se alguém reclama de você, ouça...  
É difícil ouvir certas coisas? Mas quem disse que é fácil ouvir você?  
Se alguém te ama, ame-o...  
É difícil entregar-se? Mas quem disse que é fácil ser feliz?  
Nem tudo é fácil na vida...Mas, com certeza, nada é impossível  
Precisamos acreditar, ter fé e lutar  
para que não apenas sonhemos, Mas também tornemos todos esses desejos, realidade!!!

Cecília Meireles

01. Assinale a alternativa correta sobre o texto, segundo as figuras de estilo qual se destaca mais.

- a) Anáfora.
- b) Elipse.
- c) Hipérbole.
- d) Metáfora.

02. Assinale a alternativa incorreta quanto às locuções adjetivas.

- a) Comportamento **senil** (relativo a velhice).
- b) Atitude **pueril** (próprio de jovens).
- c) Água **sulfurosa** (relativo a enxofre).
- d) Noite **hibernal** (de inverno).

03. Leia os itens.

I- O problema fundamental é **este**: preciso ler um pouco mais.  
II- **Essa** notícia que acabamos de ouvir é chocante.  
III- **Naquela** época eu ainda jogava bolinha de gude.  
IV- **Esses** anos passados foram nulos em termos de produção musical.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso dos pronomes.

- a) O item I utiliza o pronome que está em destaque para situar o que vai ser expresso.
- b) O item II utiliza o pronome que está em destaque para situar o que ainda não foi expresso anteriormente.
- c) O item III utiliza o pronome que está em destaque indicam tempo muito distante em relação ao falante.
- d) O item IV utiliza o pronome que está em destaque indicam o tempo passado ou futuro pouco distantes em relação à pessoa que fala.

Leia o texto de Maria Luiza Carneiro e responda a questão 04.

Se fizermos um balanço de **algumas** passagens da nossa história, verificaremos que, por tradição, o brasileiro tem uma mentalidade racista. Esse aspecto está oculto na chamada história oficial, em que certos assuntos são evitados para não ferir a memória de **algumas** instituições e personalidades.

04. Assinale a alternativa correta sobre as palavras em destaque no texto acima.

- a) Os pronomes definidos referem-se a terceira pessoa gramatical de maneira indeterminada, vaga.
- b) Os pronomes indefinidos referem-se a terceira pessoa gramatical de maneira indeterminada, vaga.
- c) Os pronomes indefinidos referem-se a primeira pessoa gramatical de maneira indeterminada, vaga.
- d) Os pronomes indefinidos referem-se a terceira pessoa gramatical de maneira determinada, vaga.

05. Leia as orações.

I- Para Caeiro, o importante é ver e sentir o mundo.

II- A família queria noticiar o assalto, mas não tinha dinheiro.

III- Ora cuspiam, ora soltava um palavrão.

IV- Ganhavam pouco, logo não podiam contratar um advogado.

Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações acima.

- a) O item I é oração coordenada aditiva, II é adversativa, III é alternativa e IV é conclusiva.
- b) O item I é oração coordenada aditiva, II é explicativa, III é alternativa e IV é conclusiva.
- c) O item I é oração coordenada aditiva, II é adversativa, III é alternativa e IV é adversativa.
- d) O item I é oração coordenada conclusiva, II é adversativa, III é alternativa e IV é conclusiva.

06. Leia as orações.

I- Decidiram **que você sairia da escola**. Oração subordinada substantiva **objetiva direta**.

II- Precisamos **de que você venha**. Oração subordinada substantiva **objetiva indireta**.

III- Temos necessidade **de que você venha**. Oração subordinada substantiva **completiva nominal**.

IV- Nosso desejo **é que você venha**. Oração subordinada substantiva **predicativa**.

V- Desejamos **que você venha**. Oração subordinada substantiva **objetiva direta**.

Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações acima.

- a) Todas estão incorretas.
- b) Todas estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas III, IV e V estão corretas.

### Conhecimentos Específicos

07. São objetivos da imobilização, exceto:

- a) Propiciar estabilidade das regiões afetadas.
- b) Impedir lesões vasculares.
- c) Impedir lesões de órgãos internos.
- d) Impedir lesões neurológicas.

08. Com relação à imobilização da coluna cervical:

I- A proteção da coluna cervical constitui medida universal do paciente vítima de trauma, devendo ser mantida até a confirmação de que não há lesão neurológica ou óssea.

II- O colar cervical é confeccionado em polietileno, é radio transparente e deve ser mantido durante o RX da coluna cervical até ser afastado a lesão nesta área.

III- Há risco de compressão de vias aéreas e/ou compressão circulatória quando o colar cervical estiver mal posicionado ou muito apertado.

- a) Apenas I está correta
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

**09.** Paciente vítima de acidente moto ciclístico, para realizar a retirada do capacete:

I- Uma pessoa estabiliza a cabeça e o pescoço do doente colocando uma mão de cada lado do capacete com os dedos na mandíbula do doente. Esta posição evita deslizamento caso a presilha esteja solta.

II- A segunda pessoa corta ou solta a presilha do capacete junto às argolas, posiciona, então, uma mão sobre o ângulo da mandíbula, com o polegar de um lado e os dedos de outro. A outra mão é apoiada com firmeza por baixo da cabeça, na região occipital. Esta manobra transfere a responsabilidade de garantir a imobilização da cabeça e o alinhamento do pescoço para esta segunda pessoa.

III- A primeira pessoa abre o capacete lateralmente para que este se distancie das orelhas e retira-o cuidadosamente. Caso o capacete possua uma cobertura de face, este dispositivo deve ser removido em primeiro lugar. Se o capacete cobrir totalmente a face, o nariz do doente irá dificultar a sua retirada.

IV- Para liberar o nariz, o capacete deve ser inclinado para trás e elevado sobre o nariz do doente. Durante este procedimento a segunda pessoa deve manter a imobilização em posição neutra para evitar que a cabeça se mova.

- a) Apenas I está correta
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

**10.** Com relação a imobilização das extremidades:

I- Remover todas as roupas e expor o doente completamente, incluindo as extremidades.

II- Avaliar pulsos e presença de hemorragia externa e cobrir com curativo estéril qualquer lesão aberta.

III- Escolher o tipo e o tamanho apropriado do dispositivo de imobilização para a extremidade lesada, imobilizando duas articulações acima e uma abaixo da lesão.

- a) Apenas I está correta
- b) I e II estão corretas
- c) I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

**11.** Nas imobilizações das extremidades é incorreto afirmar:

- a) Se estiver com alinhamento normal aplicar o dispositivo.
- b) Se estiver desalinhada deve ser realinhada e após imobilizada.
- c) Se houver fratura exposta deve ser realinhada e após imobilizada.
- d) Não forçar o realinhamento, imobilizar na posição em que foi encontrada.

**12.** Com relação a imobilização das extremidades superiores e da mão é incorreto afirmar:

- a) A mão não pode ser imobilizada temporariamente em posição anatômica e funcional com o punho em ligeira flexão dorsal e os dedos gentilmente fletidos em 45º.
- b) Na fratura de antebraço deve-se aplicar tração distal manual segurando o punho enquanto se exerce tração contrária no cotovelo. O dispositivo de imobilização é fixado no antebraço e o membro lesado é elevado.
- c) O punho é imobilizado sobre talas acolchoadas.
- d) Para imobilizar o úmero deve segurar o cotovelo e tracioná-lo em direção distal ao ombro. Aplicar o dispositivo e fixar à parede do tórax com tipóia e atadura.

**13.** Assinale a alternativa incorreta:

- a) Em caso de fratura de fêmur, se a tíbia e a fíbula não estiverem fraturadas, realinhar o fêmur tracionando manualmente o tornozelo. A medida que o espasmo muscular é superado, o membro se alonga e o desvio de rotação pode ser corrigido. Esta manobra pode exigir vários minutos dependendo do porte do paciente.
- b) As lesões do ombro são tratadas com tipóia e faixas ou por um curativo feito à moda de Velpeau.

c) Em fratura de tíbia, desde que o fêmur esteja intacto, aplicar manualmente tração distal no tornozelo e ao mesmo tempo tração contrária logo acima do joelho.

d) Em suspeita de fratura de joelho a perna deve ser imobilizada em extensão completa a fim de diminuir o estiramento das estruturas neurovasculares.

**14.** Assinale a alternativa correta:

- a) Em paciente adulto pode ser usado um coxim sob os ombros para evitar flexão da coluna cervical.
- b) Pode ser necessária a utilização de acolchoado sob a cabeça do paciente pediátrico para evitar a hiperextensão do pescoço e oferecer conforto.
- c) Se o doente for deixado imobilizado na prancha longa por tempo prolongado (aproximadamente 2 horas ) poderá desenvolver escaras na região occipital, escápula, sacro e calcaneares.
- d) O colar cervical não pode ser colocado na vítima de pé ou sentada.

**15.** No caso de fraturas pélvicas, deve-se:

I- Evitar manipulação excessiva e repetida da pelve. Rodar para dentro as pernas, a fim de fechar uma fratura do tipo livro aberto.

II- Acolchoar as proeminências ósseas e amarrar entre si as pernas rodadas. Essa manobra pode reduzir o deslocamento da sínfise e diminuir o volume da pelve.

III- Imobilizar adequadamente a pelve, utilizando um lençol e/ou aplicar uma cinta pélvica.

- a) Apenas I é correta.
- b) I e II são corretas.
- c) I e III são corretas.
- d) Todas são corretas.

**16.** Assinale a alternativa correta:

a) As fraturas de tornozelo podem ser imobilizadas com uso de talas de papelão ou outras, desde que acolchoadas para evitar que seja exercida pressão sobre as proeminências ósseas.

b) A estabilidade da pelve nunca poderá ser determinada através de compressão antero-posterior e latero-medial sobre as espinhas ilíacas antero-superiores.

c) O teste de mobilidade axial realizado pela manobra suave de puxar e empurrar as pernas determinará a estabilidade na direção látero-medial.

d) O doente imobilizado em prancha rígida deverá permanecer sobre ela o tempo que for preciso até ser realizadas radiografias da coluna cervical, do tórax e da pelve quando indicadas.

**17.** Assinale a alternativa incorreta:

a) Ao imobilizar uma fratura seu objetivo é diminuir a dor e o sangramento.

b) Fratura exposta é toda aquela em que ocorre comunicação do seu foco com o meio externo contaminado com germes.

c) A fratura exposta não é necessariamente exposição para o exterior, mas também para cavidades contaminadas, como a boca, o tubo digestivo, vias aéreas, vagina e anus.

d) A fratura exposta não pode ser imobilizada.

**18.** Na imobilização da coluna cervical com a vítima sentada ou de pé:

I- O primeiro socorrista se posiciona atrás da vítima, iniciando a estabilização da coluna cervical apoiando os polegares na região occipital da vítima.

II- A mandíbula é fixada com o restante das mãos, alinhando manualmente a coluna cervical fazendo tração longitudinal leve.

III- O segundo socorrista posiciona o colar cervical por baixo da mandíbula da vítima, apoiando a extremidade inferior do colar no esterno/manúbrio esternal.

- a) Apenas I é correta.
- b) I e II são corretas.
- c) I e III são corretas.
- d) Todas são corretas.

**19.** Assinale a alternativa correta:

- a)** Na imobilização da coluna cervical o socorrista que se posiciona atrás da vítima inicia a estabilização da coluna cervical apoiando os polegares na região occipital da vítima.
- b)** A imobilização da coluna cervical nunca deve ser feita com apenas um socorrista.
- c)** A imobilização da coluna cervical nunca deve ser feita com a vítima sentada ou de pé.
- d)** Sempre é o segundo socorrista que inicia a estabilização da coluna cervical da vítima.

**20.** Na imobilização do paciente em prancha rígida é correto afirmar:

I- Mantém o corpo inteiro do doente em alinhamento neutro.

II- Não impede todos os movimentos indesejáveis da coluna vertebral.

III- Para fixar a cabeça e o pescoço do doente poderão ser utilizadas faixas ou fitas adesivas.

- a)** Apenas I é correta.
- b)** I e II são corretas.
- c)** I e III são corretas.
- d)** Todas são corretas.