

**Cargo: Médico Ortopedista**

**Língua Portuguesa**

Leia atentamente o poema e responda o que se pede.

“Soneto de separação”  
(Vinícius de Moraes)

De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto

De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama

De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente

Fez-se do amigo próximo, distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente.

01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:

- a) versos decassílabos
- b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA
- c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB
- d) as alternativas a e b estão corretas

02. Observe:

- I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.
- II) A linguagem do poema é formal.
- III) O fim do amor é visto como algo irreversível.

- a) I, II e III estão corretas
- b) I, II e III estão incorretas
- c) I e II estão incorretas
- d) III está correta

03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:

- a) Sinônimos
- b) Antônimos
- c) Parônimos
- d) Homônimos

04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:

- a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.
- b) Arrumou as malas e saiu porta a fora.
- c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.
- d) Cheguei, vi e venci.

05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra indicada entre parênteses, a concordância correta é:

“A cidade tem ruas e passeios \_\_\_\_\_.” (tranquilo)

- a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.
- b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.
- c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.
- d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.

06. Observe:

- I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.
- II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.
- III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande.

A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:

- a) Comparação, objeção e compensação.
- b) Compensação, não-compensação e objeção.

- c) Compensação, justificativa e contraste.
- d) Não-compensação, compensação e justificativa.

Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, de Cecília Meireles:

“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!”

07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função sintática de:

- a) Sujeito.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo.

08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos um/uma:

- a) Objeto direto.
- b) Sujeito.
- c) Conjunção subordinativa integrante.
- d) Pronome relativo.

09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância necessária. Marque a alternativa correspondente:

“Não se descobriu a causa do problema.”

- a) Não se descobriu as causas do problema.
- b) Não se descobriu as causas dos problemas.
- c) Não se descobriram a causa do problema.
- d) Não se descobriram as causas do problema.

10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:

“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”

- a) Existir.
- b) Considerar.
- c) Ajustar contas.
- d) Acontecer.

11. A concordância é correta na alternativa:

- a) Seis metros de tecido não eram necessários.
- b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.
- c) Agora é seis da tarde.
- d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.

12. A frase cuja regência encontra-se correta é:

- a) Prefiro o futebol a vôlei.
- b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.
- c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.
- d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.

13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) correta(s):

- I) “Eu não concordo com a sua opinião.”
- II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”
- III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra reeditada.”

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) Somente I está correta.

14. Considerando-se as palavras em destaque:

“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)

O processo usado para a formação de “sambódromo” é:

- a) Derivação.
- b) Híbridismo.
- c) Composição por aglutinação.
- d) Composição por justaposição.

15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o nome de:

- a) Redução.
- b) Sigla.
- c) Onomatopeia.
- d) Aglutinação.

16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:

- a) Improvisar, nitidez, viagem (substantivo).
- b) Rouxinol, vertigem, privilégio.
- c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).
- d) Pusemos, seixo, chiqueiro.

### **Conhecimentos Específicos**

17. A perda permanente da relação articular, caracterizada por edema, dor, deformidade e resistência elástica, com prejuízo da função articular, é a definição de:

- a) Luxação.
- b) Artrodese.
- c) Entorse.
- d) Pseudoartrose.

18. Durante exames admissionais de um homem de 45 anos, foi detectado nível de fosfatase alcalina 5 vezes superior ao limite da normalidade. Os outros testes laboratoriais e o exame físico são normais. O diagnóstico mais provável é:

- a) Cirrose biliar primária.
- b) Hiperparatireoidismo primário.
- c) Doença de Paget.
- d) Câncer de próstata com metástases ósseas.

19. Garoto de 10 anos, portador de deficiência idiopática do hormônio de crescimento (GH) está em uso deste medicamento há 6 meses. Relata dor no joelho esquerdo e claudicação sem febre. Ao exame físico, não há sinais flogísticos articulares, porém há dor à abdução do quadril à esquerda. A hipótese diagnóstica é:

- a) Doença de Legg-Calvé-Perthes.
- b) Doença de Osgood-Schlater.
- c) Sinovite transitória do quadril.
- d) Epifisiólise da cabeça do fêmur.

20. Menina de 13 anos de idade chega ao ambulatório queixando-se de dor no joelho. O exame físico demonstra dor mal localizada na face anterior do joelho direito, sem sinais flogísticos, crepitações ou quaisquer outros sinais. A radiografia não evidenciou anormalidades. Com base na principal hipótese diagnóstica, podemos afirmar que:

- a) A imobilização do joelho para o conforto da paciente é indicada.
- b) A maioria das lesões localiza-se no côndilo femoral medial.
- c) Os exercícios de flexibilidade e a terapêutica com AINE's constituem a conduta adequada.
- d) A artroscopia geralmente é necessária para o diagnóstico definitivo.

21. Um menino de 3 anos com febre há 4 dias acompanhada de coriza amarelada, há 2 dias com irritabilidade e há 1 dia com temperatura de 39° C. Recusa-se a deambular (chora) e ao exame físico apresenta dor à movimentação do quadril esquerdo. Qual o diagnóstico mais provável:

- a) Artrite idiopática juvenil.
- b) Necrose asséptica do quadril.
- c) Artrite séptica.
- d) Febre reumática.

22. Um recém-nascido apresentou ao exame de 6 horas, manobra de Ortolani positivo no quadril direito. A ultrassonografia do quadril direito verificou-se, pelo método de Graaf, ângulo alfa de 50° e ângulo beta de 59°. O tratamento recomendado é:

- a) Cruento, com osteotomia periacetabular.
- b) Cruento, com redução aberta e aparelho gessado.
- c) Incruento com aparelho gessado.
- d) Incruento, com aparelho dinâmico do tipo Pavlik.

23. A conduta recomendada diante de uma criança com artrite séptica do quadril, na fase aguda, consiste de:

- a) Antibioticoterapia e tração.
- b) Punção articular, tração e irrigação contínua.
- c) Drenagem, imobilização e antibioticoterapia.
- d) Punção articular, tração e antibioticoterapia.

24. Qual o músculo que se origina da 2ª a 5ª costelas, próximo da união do osso à cartilagem e insere-se na ponta do processo coracóide da escápula:

- a) Peitoral menor.
- b) Serrátil anterior.
- c) Peitoral maior.
- d) Subescapular.

25. A síndrome do desfiladeiro torácico consiste na compressão:

- a) Dos nervos do plexo braquial inferior por osteófitos.
- b) Dos vasos subclávios e dos nervos do plexo braquial.
- c) Traqueal e esofágica por tumores cervicais e de mediastino posterior.
- d) Ou desvio da traquéia por bócio intratorácico.

26. Assinale a opção correta em relação ao exame físico do joelho:

- a) No estresse em varo do joelho com o joelho fletido em 30°, tanto o ligamento colateral fibular quanto o canto posterolateral são verificados.
- b) No teste pivot-shift, inicia-se com o joelho em extensão, realizando-se força em valgo e rotação medial da perna. A flexão é iniciada, e em torno de 30° a 50°, ocorre a subluxação do joelho, sendo considerado positivo o teste.
- c) O estresse em valgo com o joelho em extensão total analisa o ligamento colateral medial e o canto posteromedial.
- d) O estresse em varo com o joelho em extensão avalia apenas o ligamento colateral lateral.

27. Sobre os testes para o manguito rotador, assinale a alternativa correta:

- a) O teste de Yocum avalia o músculo infraespal.
- b) O teste de Hawkins-Kennedy identifica possível lesão do músculo redondo menor.
- c) O teste de Patte é feito com o membro superior ao lado do tórax e o cotovelo em 90° de flexão.
- d) O teste de Gerber verifica a integridade do músculo subescapular.

28. No tratamento inicial da fratura exposta, a conduta de maior importância é:

- a) Antibioticoterapia.
- b) Desbridamento dos tecidos desvitalizados.
- c) Estabilização da fratura com fixação interna.
- d) Estabilização da fratura com fixação externa.

29. Sobre a escoliose, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Curvas não estruturais são aquelas onde não existem alterações intrínsecas na coluna vertebral.
- b) Na curva não estrutural, o tratamento será direcionado para a sua causa, que não está localizada na própria coluna.
- c) A escoliose idiopática é a menos comum.
- d) É uma curvatura lateral da coluna vertebral.

30. Um adolescente apresenta dor no membro inferior direito, febre e emagrecimento. A radiografia simples demonstra imagens parecidas com casca de cebola. A ressonância magnética evidencia acometimento também de partes moles. O quadro descrito é sugestivo de:

- a) Osteossarcoma.

- b) Linfoma.
- c) Osteomielite.
- d) Sarcoma de Ewing.

31. Em relação às fraturas do antebraço, a lesão de Monteggia consiste em fratura:

- a) Da ulna, com luxação da articulação radioumeral.
- b) Da cabeça do rádio com lesão da articulação radioulnar distal.
- c) Do terço distal do rádio com lesão radioulnar distal.
- d) Diafisária do rádio e ulna com ausência de luxação.

32. São indicações de tratamento cirúrgico das fraturas diafisárias do úmero, exceto:

- a) Fraturas expostas.
- b) Fraturas associadas do antebraço.
- c) Paralisia do nervo radial.
- d) Fraturas associadas a lesão vascular do braço.

33. Na classificação de Salter-Harris para as lesões que envolvem a fise, a combinação entre lesão fisária e fratura intra-articular corresponde ao tipo:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

34. Quanto à anatomia patológica das fraturas do colo do fêmur, é correto afirmar que:

- a) As fraturas subcapitais e mediocervicais são intracapsulares.
- b) A principal irrigação da cabeça do fêmur é feita pelos vasos retinaculares que penetram pela cabeça.
- c) Quanto mais proximal for a fratura, melhor será o prognóstico.
- d) As fraturas basocervicais são má vascularizadas.

35. Em relação à investigação da síndrome dos maus tratos em crianças, assinale a fratura de alto risco de suspeita:

- a) Fratura da clavícula.
- b) Fratura de corpo vertebral.
- c) Fratura linear do crânio.
- d) Fratura de arco costal posterior.

36. Durante partida de futebol, rapaz de 22 anos sofre traumatismo com inversão do tornozelo esquerdo. Quatro horas depois apresenta claudicação antálgica, edema moderado e dor à palpação da região distal do maléolo lateral. Também refer dor tolerável ao apoiar o pé no chão e ao fazer a dorsiflexão e flexão plantar forçada do tornozelo. A conduta é:

- a) Imobilização com gesso, sem apoio de carga, por 6 semanas, até a cicatrização completa dos ligamentos.
- b) Realização de raio X, pois a associação de fratura neste tipo de trauma é muito frequente, e, se isso ocorreu, o atendimento deve ser imediato.
- c) AINE's e imobilização, com ou sem tala gessada, na fase inicial, e reabilitação assim que a fase aguda ceder, pois se trata de um entorse leve do tornozelo.
- d) Sutura cirúrgica dos ligamentos lesados.

37. Referente à contratura de Dupuytren, assinale a alternativa correta:

- a) Ocasionalmente, é necessária a amputação.
- b) Não tem fator hereditário.
- c) É uma contratura do tendão adutor do dedo mínimo.
- d) Alcoolismo ou cirros não tem relação com essa doença.

38. Paciente masculina, vítima de acidente automobilístico, clinicamente estável, apresenta fratura cominutiva não exposta, porém com grande desvio, do terço proximal da tíbia e fíbula à direita. Não há pulsos arteriais distais palpáveis e o pé está frio e pálido. A conduta mais indicada é:

- a) Indicar ligadura arterial e ligadura venosa se houver lesão vascular associada.
- b) Indicar restauração arterial e venosa, pois há lesão vascular inequívoca.
- c) Indicar arteriografia e flebografia do membro inferior direito em caráter de urgência.
- d) Reduzir os desvios da fratura por tração longitudinal e reavaliar a circulação distal, por palpação dos pulsos e medida do índice tornozelo-braço.

39. Qual a complicação imediata mais grave das fraturas:

- a) Infecção.
- b) Embolia gordurosa.
- c) Choque hipovolêmico.
- d) Lesão nervosa.

40. Sobre os tumores ósseos malignos, é correto afirmar que:

- a) O mieloma múltiplo é o tumor ósseo primário maligno menos frequente.
- b) O sarcoma de Ewing pode cursar com leucocitose e aumento do VHS.
- c) A localização mais comum do osteossarcoma é a diáfise dos ossos longos, principalmente do úmero.
- d) O tratamento atual do osteossarcoma consiste apenas em quimioterapia.