

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO ORTOPEDISTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**

- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplami.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 22 de Abril de 2012

PARTE I – MÉDICO ORTOPEDISTA

01 - Podemos afirmar em relação às luxações agudas do quadril:

- A) As luxações anteriores são raras (cerca de 20 %), no entanto pode comprimir vasos e nervo femoral.
- B) Thompson e Epstain classificam às luxações anteriores do quadril em cinco tipos.
- C) É comum a fratura da cabeça do fêmur na luxação do quadril.
- D) No tipo IV de Thompson e Epstain, além da luxação ocorre a fratura da cabeça femoral.
- E) Existem duas alternativas corretas.

02 - Assinale à alternativa incorreta em relação às luxações agudas:

- A) Quando se necessita fazer redução aberta da luxação esternoclavicular, esta deve ser fixada com fios de Kirschner para assim evitar a perda da redução.
- B) As lesões da epífise medial da clavícula, muitas vezes são confundidas com luxações esternoclavicular, em indivíduos abaixo dos 25 anos de idade.
- C) As luxações esternoclavicular posteriores geralmente permanecem estáveis após sua redução.
- D) O índice de mortalidade é alta (cerca de 20 %), nos traumatismos onde ocorrem luxações as sínfise púbica e articulação sacro ilíaca bilateral.
- E) Nas luxações do joelho, pode ocorrer lesões vasculares, com risco para o membro inferior.

03 - Técnica utilizada para luxação acrómio clavicular antiga, que consiste em transferência do processo coracóide e seus músculos para a clavícula:

- A) Nevasier.
- B) Mumford e Gurd.
- C) Dewar e Barrington.
- D) Rowe e Zaris.
- E) Neer.

04 - Técnica utilizada para as luxações posteriores inveteradas do ombro com grande defeito anterior da cabeça umeral, consistindo em transferência do subscapular para o defeito.

- A) Speed.
- B) Cubbins.
- C) Nevasier.
- D) Neer.
- E) Mc Laughlin.

05 - Qual é a broca utilizada para a colocação de parafuso de esponjosa de 6,5mm:

- A) 2,5 mm
- B) 3,2 mm
- C) 3,5 mm
- D) 4,0 mm
- E) 4,5 mm

06 - Assinale a alternativa correta:

- A) O ângulo Q do homem é geralmente maior que o da mulher.
- B) Para o diagnóstico de patela alta pelo método de Blumensat, o joelho deverá estar em 50 graus de flexão.
- C) O ângulo Q é medido de uma linha da espinha ilíaca ântero superior até a tuberosidade tibial, e outra da tuberosidade tibial até o centro da patela.
- D) O ângulo Q é medido de uma linha da espinha ilíaca ântero inferior até a tuberosidade tibial, e outra da tuberosidade tibial até o centro da patela.
- E) Pelo método de Catton, quando o valor é maior que 1,2 indica patela alta.

07 - Segundo Schatzker, fraturas bicondíleas do planalto tibial corresponde ao tipo:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) V
- E) IV

08 - Assinale a alternativa incorreta:

- A) As fraturas do trocanter maior são devidas geralmente a tração do glúteo médio, e comumente são tratados de maneira incruenta.
- B) As fraturas do fêmur proximal são mais comuns em indivíduos acima dos 60 anos de idade, sendo bem mais freqüentes no sexo feminino.
- C) Os pacientes com fraturas transtrocanterianas devem ser operados nas primeiras 12 a 24 horas.
- D) As fraturas transtrocantéricas apresentam maior morbimortalidade que as fraturas do colo femoral.
- E) Como complicação da fratura do colo femoral no jovem, pode ocorrer a necrose da cabeça do fêmur.

09 - Assinale a alternativa incorreta em relação às fraturas subtrocantéricas do fêmur:

- A) Quando decidido o tratamento por tração a mais efetiva é 90-90.
- B) O tipo V de Seinsheimer corresponde ao tipo IV de Boyd-Griffith.
- C) Uma das complicações mais freqüentes é a pseudoartrose.
- D) O fragmento proximal é desviado em flexão, adução e rotação externa.
- E) Pode ser usada a classificação de Fielding nas fraturas subtrocantéricas do fêmur.

10 - A indicação mais freqüente de redução aberta e fixação interna da fratura da clavícula é:

- A) Fratura exposta.
- B) Comprometimento neurovascular.
- C) Pseudoartrose.
- D) Fratura irreductível.
- E) Fratura do terço médio da clavícula.

11 - São indicações primárias de artroplastia da cabeça umeral, exceto:

- A) Fratura luxação em três partes.
- B) Fratura em quatro partes desviada.
- C) Fraturas que dividem a cabeça umeral.
- D) Impressão da cabeça umeral superior a 60%.
- E) Fratura do colo anatômico no idoso, com comprometimento total do suprimento sanguíneo da cabeça umeral.

12 - Fratura em espiral da diáfise do úmero em seu terço médio distal, que após a sua redução ocorre paralisia do nervo radial, denomina-se:

- A) Holstein e Lewis.
- B) Neer.
- C) Van Gorden.
- D) Rowe e Mc Keever.
- E) Whitman.

13 - Classificação das fraturas supraintcondiliana do úmero:

- A) Norris e Busch.
- B) Riseborough e Radin.
- C) Mayo.
- D) Campbell.
- E) Gartland.

14 - Assinale a alternativa correta em relação as lesões em crianças:

- A) Em geral pode se tolerar mais deformidade angular na extremidade inferior que na superior.
- B) O sinal de Thruston-Holland é visto nas lesões tipo III de Salter-Harris.
- C) Em geral a fratura tipo V de Salter Harris é diagnosticada precocemente.
- D) A fratura de Tillaux corresponde ao tipo III de Salter Harris.
- E) Nas lesões tipo II de Salter- Harris o melhor tratamento é cirúrgico.

15 - Complicações da exeresse da cabeça radial em crianças, exceto:

- A) Sinostose rádio ulnar proximal.
- B) Desvio radial da mão.
- C) Lesão do nervo interósseo posterior.
- D) Dor ao nível do punho.
- E) Cúbito varo

16 - É correto em relação às fraturas supracondilianas do úmero em crianças:

- A) É mais comumente vistas no sexo feminino.
- B) A maioria das fraturas ocorre em crianças com mais de oito anos de idade.
- C) O nervo radial é o mais afetado, e o nervo a seguir mais acometido, varia de trabalho para trabalho.
- D) A principal indicação das fraturas supracondilianas do úmero em crianças deve ser cirúrgica, pelo risco de lesão arterial.
- E) Na incidência de Jones o cotovelo deve estar flexionado o máximo possível.

17 - O osso que mais frequentemente sofre pseudoartrose é:

- A) Úmero.
- B) Clavícula.
- C) Rádio sozinho.
- D) Fêmur.
- E) Tíbia.

18 - O melhor meio diagnóstico para detectar metástases pulmonares:

- A) Tomografia axial computadorizada.
- B) Cintilografia óssea.
- C) Radiografia do tórax.
- D) Exame físico.
- E) Fosfatase alcalina elevada.

19 - São tumores radioresistentes, exceto:

- A) Osteossarcoma.
- B) Condrossarcoma.
- C) Reticulossarcoma.
- D) Adamantinoma.
- E) Osteossarcoma teleangectásico.

20 - Enfermidade familiar, caracterizada por osteomas múltiplos, polipose colônica e tumor de partes moles:

- A) Síndrome de Jaffe.
- B) Síndrome de Campanucci.
- C) Síndrome de Horner.
- D) Síndrome de Albright.
- E) Síndrome de Gardner.

21 - É incorreto em relação ao osteossarcoma:

- A) O mecanismo comum de metástases é a via hematogênica para os pulmões.
- B) As lesões quanto mais próximas do tronco, pior o prognóstico.
- C) As metástases linfáticas são raras.
- D) Pode acometer a região do joelho.
- E) O osteossarcoma teleangectásico apresenta um melhor prognóstico, no entanto é raro.

22 - Qual é a lesão pseudotumoral mais freqüente:

- A) Fibroma não ossificante.
- B) Cisto ósseo simples.
- C) Granuloma eosinófilo.
- D) Displasia fibrosa.
- E) Ewing.

23 - Assinale a alternativa correta em relação às osteocondrites do tálus:

- A) São cirúrgicas sempre.
- B) É mais comum na parte lateral.
- C) São divididas em três fases evolutivas.
- D) As radiografias simples revelam o diagnóstico em cerca de 90 % dos casos.
- E) As lesões mediais geralmente são mais profundas e se desprendem mais frequentemente.

24 - Localização mais freqüente da osteocondrite dissecante do joelho:

- A) Face central do côndilo interno.
- B) Face lateral do côndilo interno.
- C) Face lateral do côndilo externo.
- D) Face central do côndilo externo.
- E) Face anterior do côndilo externo.

25 - Fibrose e tendinite, corresponde a síndrome do impacto em seu estágio:

- A) II.
- B) I.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

26 - A (s) polia (s) que devem ser sempre preservada (s) na bainha flexora:

- A) A2.
- B) A3 e A4.
- C) A2 e A4.
- D) A3 e C1.
- E) A1.

27 - São sinais de risco para cabeça femoral na Doença de Perthes, exceto:

- A) Cistos metafisários.
- B) Sinal de Gage.
- C) Subluxação lateral da cabeça femoral.
- D) Verticalização da lâmina epifisária.
- E) Calcificação lateral à epífise femoral.

28 - É incorreto em relação às infecções osteoarticulares:

- A) A osteomielite hematogênica aguda é mais freqüente no sexo masculino.
- B) A osteomielite é mais freqüente dos quatro aos sete anos, período do primeiro estirão de crescimento.
- C) A osteomielite pode causar alterações do crescimento, promovendo deformidades ósseas.
- D) A infecção de uma articulação pode destruí-la ou mesmo levá-la à luxação.
- E) O *Staphylococcus aureus* é o agente mais frequente das osteomielites hematogênicas.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
o que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saia do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do seu cimento.

Arnaldo Antunes. *Tudos*. 4. ed. São Paulo: Iluminuras, 1998.

29 - O que incomoda o eu lírico é:

- A) Sua dificuldade para pensar.
- B) Sua familiaridade com suas ideias.
- C) Sua facilidade para pensar.
- D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz.
- E) A autonomia de seu pensamento.

30 - Das afirmações seguintes:

I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é externo a ele.

II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu cimento”, as palavras sementes e cimento foram empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as ideias em estado inicial.

III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à vontade expressa pelo eu lírico.

- A) Todos estão corretos.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Estão corretos os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi usado de forma incorreta:

- A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas horas.
- B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão indo.
- C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
- D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
- E) Não estacione naquele local, senão você será multado.

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado corretamente:

- A) semi-infantil
- B) supra-sensível
- C) ante-braço
- D) auto-análise
- E) extra-judicial

33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos INAPTO e CANTÁSSEMOS são, respectivamente:

- A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo - temporal).
- B) radical – desinência nominal / radical – desinência verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo - temporal).
- C) prefixo – sufixo – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número - pessoal).
- D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo - temporal).
- E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) – desinência verbal (número - pessoal).

34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem receber o acento gráfico;

- A) ibero – álcool – maquinaria
- B) textil – enigma – sutil
- C) interim – zefiro – agape
- D) fortuito – ureter – estereotipo
- E) recém – pudico – zenite

35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona como predicativo do objeto:

- A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo.
- B) O ministro considerou incerta a sua presença no seminário.
- C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais fácil.
- D) Desesperados, eles gritavam por socorro.
- E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.


36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a oração destacada classifica-se em:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva completiva nominal.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva objetiva direta.
- E) subordinada adverbial temporal.

37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase foi usado corretamente, exceto em:

- A) “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
- B) A cidade à qual nos referimos é longe.
- C) Voltamos cedo à casa dos amigos.
- D) Assisti àquele filme.
- E) Estava disposto à disputar uma vaga.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que havia mudado de posição.

II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida.

III – Através do último quadrinho é possível compreender o que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e III.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer outra coisa”:

- A) anacoluto
- B) antonomásia
- C) sinestesia
- D) gradação
- E) hipérbole

40 - Nas frases seguintes:

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.

II – Fui eu quem fez o exercício.

III – Hoje sou eu quem paga a conta.

Quanto a concordância podemos afirmar:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.