



Português

01. **Nenhum** aluno conseguiu **boa nota**. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente:

- (A) substantivo, adjetivo, substantivo.
- (B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo.
- (C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo.
- (D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo.
- (E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo.

02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são:

- (A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
- (B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção.
- (C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
- (D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção.
- (E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção.

03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas:

1. Costumávamos jantar uns \_\_\_\_\_ de queijo.
  2. Perto dali ficavam uns três \_\_\_\_\_.
  3. Durante todo o dia os \_\_\_\_\_ ficaram lotados.
  4. Prefiro aquele vestidinho de \_\_\_\_\_ azuis.
- (A) pãezinhos; guarda-noturnos; bareszinhos; floreszinhas.
  - (B) pãezinhos; guardas-noturno; barzinhos; florzinhas.
  - (C) pãezinhos; guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas.
  - (D) pãozinhos; guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas.
  - (E) pãozinhos; guarda-noturnos; barezinhos; florzinhas.

04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é:

- (A) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira.
- (B) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
- (C) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona.
- (D) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
- (E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira.

05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal:

- (A) Este livro é para eu ler durante as férias.
- (B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar.
- (C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar.
- (D) Para mim, ler este livro pouco importa.
- (E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir.

06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver:

- (A) Houve um acidente na BR 116.
- (B) Havia apenas um menino na sala de aula.
- (C) Havia vários meninos na sala de aula.
- (D) Houveram vários acidentes na BR 116.
- (E) Os alunos se houveram bem nas provas.

07. Por favor, passe \_\_\_\_\_ caneta que está ali perto de você; \_\_\_\_\_ aqui não serve para \_\_\_\_\_ desenhar.

- (A) aquela – esta – mim.
- (B) esta – esta – mim.
- (C) essa – esta – eu.
- (D) essa – essa – mim.
- (E) aquela – essa – eu.

## MÉDICO CLÍNICO GERAL

08. Para nós, tanto \_\_\_\_\_ vocês \_\_\_\_\_ ficar aqui como \_\_\_\_\_ a fronteira.  
(A) faria – quisessem – transporem.  
(B) faz – quererem – transporem.  
(C) faz – quererem – transpossem.  
(D) faria – quisessem – transpusessem.  
(E) faria – quererem – transporem.
09. A \_\_\_\_\_ das \_\_\_\_\_ levou à \_\_\_\_\_ dos trabalhos da \_\_\_\_\_.  
(A) contenção – despesas – paralisação – empresa.  
(B) contensão – despesas – paralização – empresa.  
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa.  
(D) contenção – despesas – paralisação – empresa.  
(E) contensão – despesas – paralisação – empresa.
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli\_\_e; vi\_\_inho; atravé\_\_;  
fregue\_\_a.  
(A) z, z, s, s.  
(B) z, s, z, s.  
(C) s, z, s, s.  
(D) s, s, z, s.  
(E) z, z, s, z.

### Conhecimentos Específicos

11. Das alternativas abaixo podem ser utilizadas no tratamento da crise aguda gotosa, exceto:  
(A) colchicina  
(B) diclofenaco sódico  
(C) acetato de metilprednisolona  
(D) alopurinol  
(E) etoricoxib
12. São critérios diagnósticos de febre reumática, exceto:  
(A) ASLO elevada  
(B) cardite  
(C) artrite  
(D) nódulo subcutâneo  
(E) eritema marginado
13. Em indivíduo com orquiepididimite aguda de origem venérea o swab uretral revelou à microscopia óptica vários leucócitos sem microorganismos visíveis. Qual agente mais provável de tal infecção.  
(A) Neisseriagonorreae  
(B) sífilis  
(C) clamídiatracomatis  
(D) HPV  
(E) Gardenerela
14. Um homem caucasiano foi diagnosticado com herpes zoster acometendo flanco e região lombar à direita. Alguns dias depois sua filha começou a apresentar lesões pruriginosas por todo corpo vesículo-crostosas em diferentes estágios de evolução, não havendo utilizado nenhuma medicação. O diagnóstico provável:  
(A) Sarampo  
(B) Herpes Zoster  
(C) Varicela  
(D) Epstein Barr vírus  
(E) Farmacodermia

## MÉDICO CLÍNICO GERAL

15. Qual a principal complicação no equilíbrio ácido-básico induzida pelo uso excessivo de Solução de NaCl a 0,9%:
- (A) acidose metabólica com ânion gap normal
  - (B) acidose metabólica com ânion gap aumentado
  - (C) alcalose metabólica
  - (D) hipernatremia
  - (E) acidoserresporatória
16. Qual medida de tratamento inicial em indivíduo jovem, admitido em pronto-socorro com relato de rebaixamento de nível de consciência, apresentando glicemia de 900, pH sérico de 7,14 e bicarbonato de 09, além de K=5,85 e sinais de desidratação.
- (A) insulina venosa
  - (B) insulina venosa e hidratação com solução glicosada
  - (C) hidratação com solução fisiológica
  - (D) insulina venosa e bicarbonato de sódio.
  - (E) bicarbonato de sódio e solução fisiológica
17. São associações corretas entre agente tóxico e antídoto, exceto:
- (A) paracetamol e n-acetilcisteína
  - (B) organofosforado e pralidoxima
  - (C) metanol e etanol
  - (D) isoniazida e piridoxina
  - (E) bezodiazepínicos e naloxone
18. No carcinoma pulmonar de pequenas células observamos muitas vezes síndromes paraneoplásicas. Das opções abaixo, assinale a alternativa em que todos os itens correspondem a manifestações paraneoplásicas:
- (A) polimiosite, encefalite e baqueteamento digital
  - (B) Baqueteamento digital, síndrome da secreção inapropriada de ADH e *miastenia gravis*
  - (C) *Miastenia gravis*, diabetes melitus e polimiosite
  - (D) Polimiosite, secreção inapropriada de ADH, diabetes melitus
  - (E) Nda
19. Um paciente com epigastralgia e sintomas sugestivos de doença do refluxo com esofagite grau I de Savary-Miller na endoscopia digestiva, o tratamento inicial é?
- (A) cirurgia de Thal-Hatafuku, perda de peso e inibidores H2
  - (B) funduplicatura parcial, perda de peso e mudança dos hábitos alimentares
  - (C) perda de peso, suspensão do tabagismo e inibidores de bomba de prótons
  - (D) cirurgia de Nissen, inibidores de bomba de prótons e suspensão do tabagismo
  - (E) nda
20. Qual o tratamento preconizado quando da identificação clínicado pneumotórax hipertensivo, no paciente poli traumatizado, instável, na sala de trauma ainda não avaliado pelo cirurgião geral é:
- (A) intubação e ventilação com pressão positiva
  - (B) toracocentese com introdução de abocath 14 em segundo espaço intercostal
  - (C) broncofibroscopia
  - (D) drenagem fechada em selo d' água
  - (E) aguardar a chegada do cirurgião
21. Uma grávida vegetariana pode ter deficiência de qual substância?
- (A) cálcio
  - (B) ácido fólico
  - (C) ferro
  - (D) proteínas
  - (E) vitamina B12

## MÉDICO CLÍNICO GERAL

22. Qual o primeiro hormônio a se alterar e que corrobora como o diagnóstico de hipotireoidismo primário é:
- (A) TSH
  - (B) T4
  - (C) T3
  - (D) T3 livre
  - (E) índice de tiroxina livre
23. Quanto à vacinação na gravidez, assinale a correta:
- (A) Vacina anti-rábica não pode ser usada na gravidez.
  - (B) Não podem ser usadas na gravidez vacinas contra: varíola, rubéola (MMR), pólio, febre amarela.
  - (C) Gravidez não é uma contra-indicação para aplicação da vacina anti-rubéola.
  - (D) Gestante no 2º mês, com receio de aplicar a vacina contra rubéola em sua filha de 2 anos. Sabe dos riscos da rubéola na gravidez e ouviu falar que seria possível a transmissão da doença através da vacina, portanto deve aguardar o último trimestre da gestação para vacinar a sua filha, para não haver possibilidade de acometer o feto.
  - (E) Vacinações e gravidez: as vacinas inativadas e as com toxóides podem ser administradas às gestantes; deve-se indicar o abortamento se uma gestante for inoculada com a vacina contra a rubéola.
24. Prevenção é parte importante da atuação médica, neste sentido é correto afirmar:
- (A) No clássico modelo de "História natural das doenças" proposto por Lewell e Clark, considera-se período pré-patogênico o intervalo após a invasão do hospedeiro pelo agente e início dos sintomas.
  - (B) Os apoiadores de cabeças nos automóveis são uma medida típica de proteção específica (prevenção secundária).
  - (C) Constitui nível secundário de medicina preventiva: detecção e manejo precoce da doença.
  - (D) Com base no modelo explicativo da História natural da doença, pode-se dizer que a recomendação do rastreamento sorológico do HIV, desde que consentido, no acompanhamento pré-natal, constitui uma medida que, em relação à gestante, encontra-se em nível de prevenção: primária.
  - (E) Algumas condutas podem ser usadas para Diagnóstico e tratamento do atraso mental. Tais condutas correspondem aos seguintes níveis de prevenção: conselhos nutricionais a mulher grávida: primário; rastreamento da fenilcetonúria em RNs: secundário; imunização contra rubéola: secundário; reabilitação de crianças acometidas pela rubéola congênita: terciário.
25. Homem, 24 anos, operário da construção civil, procura seu posto de saúde da família, referindo dor inguinal há 6 meses com aumento de intensidade aos esforços, além de tumoração que cresce nessas ocasiões. O desconforto e limitação têm se acentuado recentemente. Ao exame, há massa de consistência amolecida, móvel, redutível, situada na região inguinal e compatível com hérnia. O paciente é hígado e não apresenta outras queixas médicas objetivas. Nestas circunstâncias, o médico do PSF deve:
- (A) encaminhar o paciente ao hospital de referência imediata para cirurgia de urgência.
  - (B) encaminhar para realização de ultra-sonografia para confirmação do diagnóstico.
  - (C) solicitar avaliação cardíaco-pulmonar pré-operatória para definir a melhor conduta a ser adotada.
  - (D) entrar em contato com cirurgião de hospital terciário para discutir o caso.
  - (E) completar história e exame físico e encaminhá-lo para cirurgia eletiva conforme acordo de referência.
26. Entre os princípios e diretrizes do SUS, o “conjunto de ações e serviços resolutivos preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” é definição para:
- (A) integralidade
  - (B) universalidade
  - (C) descentralização
  - (D) participação popular
  - (E) nda

## MÉDICO CLÍNICO GERAL

27. No Brasil, até agosto de 2009, dos 543 pacientes com gripe A confirmada e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 56 evoluíram para pneumonia, insuficiência respiratória e óbito, novos casos vem sendo detectados. No atestado de óbito, deve constar como causa básica da morte:

- (A) influenza A H1N1
- (B) síndrome respiratória aguda grave
- (C) insuficiência respiratória
- (D) pneumonia de origem infecciosa
- (E) nda

28. Qual a afirmativa correta em relação à conduta referente ao tratamento de um paciente dependente de cocaína em uma unidade de atenção primária?

- (A) A primeira escolha de tratamento farmacológico é a olanzapina.
- (B) O enfoque terapêutico mais eficaz é o que associa prevenção à recaída com tratamento farmacológico de eventuais co-morbidades.
- (C) A entrevista motivacional é a intervenção mais eficaz para pacientes com baixa capacidade de aderência ao tratamento disponibilizado.
- (D) O aprendizado de estratégias para o reconhecimento das situações que levam à recaída é o enfoque mais eficaz para pacientes com danos cerebrais provocados pela droga.
- (E) Devido à gravidade da dependência que a droga promove, o único tratamento eficaz é o da redução de danos, mediante encaminhamento a internação especializada, para manutenção em programa terapêutico.

29. Em relação à violência doméstica, são apresentadas as seguintes assertivas:

I. Ações centradas nos conselhos tutelares são as mais efetivas para a resolução do problema nas classes sociais mais pobres.

II. Entre os segmentos mais atingidos estão os adolescentes e os idosos.

III. O conceito não se restringe a pessoas que vivem sobre o mesmo teto.

Qual é a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. Paciente portador de DM tipo 2 e sem sinais de aterosclerose significativa. Quais os níveis recomendados de LDLc, HDLc e triglicérides respectivamente.

- (A) < 100, >40, <150
- (B) <130, >40, <200
- (C) < 100, >50, <150
- (D) < 130, >50, <200
- (E) <100, >40, <200