

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Concurso Público 002/2012 - Edital 001/2012 - DATA DA PROVA: 25/03/2012 - CEOCAM

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova;
- 13 O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu caderno de prova;
- 14 Assine o cartão resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Receita cazera minera de môi de repôi no ái e ói

Ingredienti:

- *5 denti di ái
- *3 cuié di oi
- *1 cabeça de repôi
- *1 cuié di mastomati
- * sar agosto

Módifazê:

- *casca o ái, pica o ái i soca o ái cum SAR
- *quenta o ói na cassarola
- *foga o ái socado no ói quênti
- *pica o repôi beeeeeemmm finin
- *foga o repôi no ói quênti junto com o ái fogado
- *poim a mastomati i mexi cum a cuié pra faze o môi
- *Sirva com rôis e meléti

Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo (variação histórica) e no espaço (variação regional). Embasados no texto resolva as questões abaixo.

01 - A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. No poema acima, a acentuação é utilizada:

- a) segundo a norma padrão, acentuando-se todas as palavras em sua sílaba tônica.
- b) para reestabelecer parâmetros da norma culta utilizada em determinada região.
- c) para demonstrar e marcar a entonação da fala, ou seja marca a oralidade de uma região.
- d) para estabelecer os padrões utilizados como linguagem formal de uma região.

02 - A receita culinária é considerada um gênero textual, o que é incorreto afirmar sobre gêneros textuais:

- a) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas.
- b) Textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas.
- c) Um gênero textual oferece uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares.
- d) Abrange um conjunto fechado e praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função.

03 - Os verbos citados estão em que conjugação verbal (casca, quenta, foga, pica, foga e poim), significando (descascar, esquentar, refogar, picar, reforgar e colocar), lembrando que estamos analisando dentro de um contexto único, e que precisamos levar em consideração que eles são representados pela oralidade:

- a) Presente do indicativo.
- b) Imperativo afirmativo.
- c) Indicativo condicional.
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

04 - Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita, ou seja, é a forma correta da escrita. Nos exemplos abaixo assinale as que correspondem às normas ortográficas:

- a) poetizar, paralisar, casebre, poetisa.
- b) embriaguez, altivez, catálise, catalizante.
- c) teimoso, brioço, cauteloso, pizar.
- d) cazeira, analisa, maciez, fazê.

05 - Veja qual seleção de palavras se adéqua as palavras parônimas:

- a) descascar - fritar.
- b) alho - óleo.
- c) dourar - embelezar.
- d) dente - cabeça.

06 - O diâmetro da base de um cone circular reto mede 8 cm. Sabe-se que a geratriz desse cone mede 0,5 dm. O volume desse cone é de:

- a) $4\pi \text{ cm}^3$.
- b) $8\pi \text{ cm}^3$.
- c) $16\pi \text{ cm}^3$.
- d) $64\pi \text{ cm}^3$.

07 - Casemiro comprou 5 camisas e 3 calças por R\$ 612,00. Sabe-se que cada camisa custou 3/5 do valor de cada calça. Se Casemiro tivesse comprado 1 calça e 1 camisa teria pagado:

- a) R\$ 163,20.
- b) R\$ 165,20.
- c) R\$ 167,20.
- d) R\$ 169,20.

08 - Rogério pensou num número, adicionou 5 unidades e multiplicou esse resultado pelo número pensado anteriormente. O resultado dessa conta foi 374. O número pensado por Rogério é:

- a) 17.
- b) 18.
- c) 19.
- d) 20.

09 - Na fazenda 3 estrelas, um rebanho de 0,45 mil cabeças de gado consome 45,9 T de ração num período de 6 dias. Se fossem 500 cabeças de gado, em 5 dias o consumo de ração seria de:

- a) 40 T.
- b) 42,5 T.
- c) 45 T.
- d) 47,5 T.

10 - Dados os conjuntos $A = \{-3, -1, 1, 2, 5\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ e $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, é correto afirmar que:

- a) $A \cap B = \{0, 1, 2\}$
- b) $B \supset C$.
- c) $C \subset A$.
- d) $B \cap C = B$.

11 - Com relação aos estágios da cicatrização das feridas, está incorreto afirmar:

- a) O estágio inflamatório tem duas fases, a vascular e a celular. Nessa fase, não ocorre nenhum ganho de consistência da ferida.
- b) Logo após o estágio inflamatório, no estágio de maturação da ferida, muitas das fibras colágenas ordenadas são destruídas e substituídas por novas fibras mais resistentes, que são orientadas para melhor sustentar o coágulo.
- c) No estágio fibroblástico os fios de fibrina derivados da coagulação do sangue que entrecruzam feridas formam um entrelaçado em que os fibroblastos podem iniciar a precipitação de substância fundamental e colágeno.
- d) O objetivo da cirurgia com respeito à formação da cicatriz não é o de prevenir a cicatriz, mas o de produzir uma cicatriz que diminua a perda de função e que pareça discreta quando possível.

12 - Com relação aos parâmetros do planejamento para retalhos de tecidos moles e tipos de retalhos mucoperiosteais, não podemos afirmar:

- a) A incisão de alívio deve ser realizada bem próxima à remoção de osso para se evitar defeitos como deiscência de tecido e cicatrização retardada.
- b) O retalho quadrangular é uma incisão em envelope com duas incisões relaxantes. Embora esse retalho forneça acesso substancial nas áreas que têm dimensão ântero-posterior limitada, ele raramente é indicado.
- c) No paciente edêntulo, a incisão em envelope é feita ao longo da cicatriz da crista do rebordo enquanto, em pacientes dentados, a incisão é realizada do sulco gengival até a crista óssea através do periósteo.
- d) O retalho pediculado é ocasionalmente usado no palato. Esse retalho é planejado para ser movimentado de uma área e depois girado para preencher um defeito de tecidos moles em outra área.

13 - Assinale a alternativa incorreta com relação às técnicas para remoção cirúrgica de dentes uni ou multirradiculares:

- a) Após a extração de um dente unirradicular, se detritos permanecerem principalmente na porção inferior do retalho, poderá ocorrer cicatrização tardia ou até mesmo um abscesso subperiosteal.
- b) A remoção de um primeiro molar inferior com uma coroa intacta é usualmente realizada através da secção do dente no sentido vestibulolingual.
- c) Dentes trirradiculados devem ser divididos num padrão diferente daqueles birradiculados. Se a coroa estiver intacta, as duas raízes vestibulares devem ser separadas do dente, e a coroa é removida junto com a raiz palatina.
- d) O cirurgião deve tentar manter a técnica fechada o máximo possível. As técnicas fechadas mais prolongadas ainda são muito menos traumáticas do que as técnicas abertas mais suaves e eficientes.

14 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às normas de conduta em dentes impactados, exceto:

- a) Como regra geral, todos os dentes impactados devem ser mantidos em suas posições até que causem problemas já que, cirurgias de dentes impactados podem trazer complicações severas para o paciente.
- b) Os pacientes que tenham tido um episódio de pericoronite, embora controlada com sucesso, continuarão apresentando episódios de pericoronite a menos que o terceiro molar inferior afetado seja removido.
- c) Um terceiro molar impactado na mandíbula ocupa o espaço que normalmente seria ocupado por osso. Isto pode enfraquecer a mandíbula e fazer com que ela se torne suscetível a fraturas.

d) Da mesma forma que os cistos odontogênicos podem ocorrer à volta de dentes impactados, os tumores odontogênicos podem surgir a partir do epitélio contido dentro do folículo dentário.

15 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação aos aspectos cirúrgicos dos tumores bucais:

- a) O odontoma pode ser removido cirurgicamente de forma conservadora, sendo o acesso cirúrgico obtido pela remoção do osso que o recobre.
- b) Os métodos de tratamento dos ameloblastomas incluem extirpação do tumor, ressecção radical do maxilar e excisão em bloco, muitas vezes complementada com eletrocauterização.
- c) O tratamento para os osteomas deve ser instituído precocemente e consiste em ressecção do osso onde se desenvolve o tumor, incluindo o suprimento sanguíneo contínuo da massa tumoral.
- d) O papiloma é tratado por excisão cirúrgica e eletrocauterização da base. A excisão é realizada através de uma incisão que se estende pela periferia do tumor até os tecidos adjacentes e a base da lesão.

16 - Com relação aos princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, não está correto afirmar:

- a) A biópsia por aspiração emprega uma agulha e uma seringa para penetrar numa lesão e fazer aspiração do seu conteúdo.
- b) Se a área sob investigação parece difícil de ser excisada devido a seu grande tamanho ou de uma localização perigosa, ou sempre que houver uma grande suspeita de malignidade, está indicada uma biópsia por aspiração.
- c) Na biópsia incisional, o material deve ser retirado da margem da lesão para incluir um volume adequado de tecido alterado. É preferível executar uma biópsia em profundidade a uma biópsia extensa e pouco profunda.
- d) A biópsia excisional deve ser empregada em lesões com menos de 1cm de diâmetro que ao exame clínico parecem ser benignas. Qualquer lesão que pode ser removida completamente sem mutilar o paciente é mais bem tratada pela biópsia excisional.

17 - Assinale a alternativa incorreta com relação às fraturas da face:

- a) As fraturas mandibulares de acordo com a sua localização anatômica são: condilares, de ângulo, de corpo, de sínfise, de alvéolo, de ramo e de processo coronóide.
- b) As fraturas de mandíbula são denominadas favoráveis ou desfavoráveis, dependendo da angulação da fratura e da força de tração muscular proximal e distalmente à fratura.
- c) A fratura de Le Fort I resulta frequentemente da aplicação de força horizontal da maxila, a qual separa a maxila das lâminas pterigóides e das estruturas nasal e zigomática.
- d) As fraturas do tipo “galho verde” são aquelas que causam fraturas incompletas em ossos compactos. Essas fraturas geralmente exibem grande mobilidade quando palpadas.

18 - O objetivo da cirurgia pré-protética é criar estruturas de suporte adequadas para subsequente colocação de aparelhos protéticos. O melhor suporte para dentadura apresenta as seguintes características, exceto:

- a) Nenhuma evidência de condições patológicas intra ou extra-orais.
- b) Relação apropriada dos maxilares nos sentidos ântero-posterior, transversal e vertical.
- c) Os processos alveolares são mais profundos possíveis, com uma configuração adequada. A forma ideal do processo alveolar tem a configuração de um profundo V, com os componentes verticais os mais divergentes possíveis.
- d) Nenhuma protuberância ou irregularidade nos tecidos ósseos ou moles.

19 - Assinale a alternativa incorreta com relação à cirurgia em endodontia:

- a) A maioria das injúrias aos retalhos resulta de procedimentos inadvertidos que podem causar esmagamento, dilaceração ou isquemia. Esses danos podem ocorrer durante a incisão, o descolamento, o afastamento ou a sutura.
- b) A causa mais comum de edema e equimose pós-cirúrgico é o esmagamento inadvertido do retalho causado pelo (s) afastador (es).
- c) Os retropreparos devem ser circulares. A utilização dos aparelhos ultra-sônicos ajuda a padronizar esses preparos e a aumentar as possibilidades de que eles sejam consistentemente bem realizados.
- d) Um campo seco e livre de sangue é de importância fundamental na aplicação dos materiais retroobturadores convencionais.

20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às doenças odontogênicas do seio maxilar, exceto:

- a) As infecções odontogênicas que podem envolver o seio maxilar incluem a doença periapical aguda e crônica e a doença periodontal. Infecção e sinusite podem resultar também de traumatismo dentário ou de cirurgia na parte posterior da maxila.
- b) A sinusite maxilar crônica é comumente oriunda de infecção odontogênica.
- c) O início da sinusite maxilar é descrito, em geral, pelo paciente com uma sensação de pressão, dor ou de peso nas vizinhanças do seio afetado.
- d) O tratamento das comunicações bucossinusais ou é feito imediatamente quando a abertura é criada, ou mais tarde, como no caso de uma fissura de longa duração ou no insucesso de uma tentativa de fechamento primário.

21 - Com relação à avaliação radiográfica da ATM, está incorreto afirmar:

- a) A radiografia panorâmica não nos permite avaliar a ATM, pois não nos fornece uma vista topográfica dessa região.
- b) Uma imagem transcraniana pode ser obtida através de um aparelho de radiografia dentária convencional, associado com um dispositivo para manter a cabeça.
- c) A técnica tomográfica permite uma visão mais detalhada da ATM. Ela possibilita a visualização em seccionamento radiográfico da articulação em diferentes níveis do complexo fossa-côndilo.

d) A técnica de imagem mais eficaz de diagnóstico para avaliar os tecidos moles da ATM é a imagem da ressonância magnética.

22 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas desvantagens da técnica da condilectomia cega por serra de Gigli, exceto:

- a) Trauma ao nervo mandibular.
- b) Lesão à glândula parótida ou à sua cápsula e formação de uma fístula salivar.
- c) Lesão a ramos do nervo facial.
- d) Hemorragia profunda.

23 - Assinale a alternativa que apresenta a dose máxima recomendada (mg) do anestésico Lidocaína com vasoconstritor para um adulto de aproximadamente 70Kg:

- a) 100.
- b) 500.
- c) 50.
- d) 75.

24 - Todas as alternativas abaixo apresentam procedimentos odontológicos que justificam a profilaxia da endocardite bacteriana, exceto:

- a) Extrações dentárias.
- b) Colocação de bandas e brackets ortodônticos.
- c) Raspagem e alisamento radicular.
- d) Instrumentação endodôntica.

25 - Com relação ao primeiro atendimento ao poli-traumatizado da face, não podemos afirmar:

- a) Os sinais vitais do paciente, como pulsação, pressão arterial e respiração devem ser mantidos.
- b) Antes de proceder a um rigoroso exame, pode haver necessidade de remoção de coágulos sanguíneos por meio de uma irrigação com soro fisiológico e enxágue da cavidade oral.
- c) As fraturas dos maxilares não devem ser verificadas prontamente devido à dor intensa.
- d) Os testes pulpares dos dentes devem ser adiados devido à ocorrência comum de resultados falso-positivos.

26 - “Se desenvolve pela fusão de três elementos que podem ainda ser separados uns dos outros pela época do nascimento.

É uma lâmina robusta e curvada que forma as paredes anterior, inferior e posterior do meato acústico externo”.

O texto acima se refere ao osso:

- a) Maxila.
- b) Temporal.
- c) Parietal.
- d) Nasal.

27 - Com relação às extrações a fórceps, não está correto afirmar:

- a) A parte ativa do fórceps, para palatino ou lingual, deve ser primeiramente posicionada, seguida pela vestibular.
- b) O longo eixo do fórceps deve ser colocado paralelo ao longo eixo do dente.
- c) O uso de fórceps anatomicamente errado, não acarreta maiores problemas além de dificultar um pouco o procedimento.
- d) As mãos devem exercer pressão suficiente para segurar o fórceps sobre o dente sem deixá-lo escapar.

28 - O fenômeno da resposta imune após transplantes de dentes pode ser evidenciado pelo seguinte, exceto:

- a) Infiltrado inflamatório crônico, celular, envolvendo o transplante e se infiltrando no tecido pulpar.
- b) Falha da polpa em formar dentina e completar a formação da raiz.
- c) Encapsulamento fibroso e reabsorção radicular, com substituição por tecido osso.
- d) Calcificação e fechamento do canal endodôntico.

29 - Com relação às feridas dos tecidos moles da face, está incorreto afirmar:

- a) Quaisquer corpos estranhos encontrados durante o debridamento de uma lesão deverão ser removidos a não se que isso seja impossível.
- b) Em casos de hemorragias, os vasos cujo sangramento persiste devem ser pinçados e ligados com fio absorvível 2-0 ou 3-0 ou fio de seda.
- c) Como todas as feridas laceradas são contaminadas, deve ser sempre instituída a proteção contra o tétano.
- d) Nas lacerações superficiais, deverá ser inserido um dreno de Penrose ou de dique de borracha para permitir a drenagem de exsudato, impedindo que se acumulem nas estruturas mais profundas.

30 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às indicações para a operação de Caldwell-Luc, exceto:

- a) Remoção de dentes e fragmentos radiculares dos seios.
- b) Traumas da maxila quando as paredes dos seios maxilares são esmagadas.
- c) Sinusite aguda maxilar.
- d) Cistos dos seios maxilares.