

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Concurso Público 002/2012 - Edital 001/2012 - DATA DA PROVA: 25/03/2012 - CEOCAM

## PERÍODO DE PROVA: TARDE



# FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PEDIÁTRICO

### CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PEDIÁTRICO

#### LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova;
- 13 O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu caderno de prova;
- 14 Assine o cartão resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

**Boa Prova!**

## Receita cazera minera de môi de repôi no ái e ói

### Ingredienti:

- \*5 denti di ái
- \*3 cuié di oi
- \*1 cabeça de repôi
- \*1 cuié di mastomati
- \* sar agosto

### Módifazê:

- \*casca o ái, pica o ái i soca o ái cum SAR
- \*quenta o ói na cassarola
- \*foga o ái socado no ói quênti
- \*pica o repôi beeeeeemmm finin
- \*foga o repôi no ói quênti junto com o ái fogado
- \*poim a mastomati i mexi cum a cuié pra faze o môi
- \*Sirva com rôis e meléti

Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo (variação histórica) e no espaço (variação regional). Embasados no texto resolva as questões abaixo.

**01 - A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. No poema acima, a acentuação é utilizada:**

- a) segundo a norma padrão, acentuando-se todas as palavras em sua sílaba tônica.
- b) para reestabelecer parâmetros da norma culta utilizada em determinada região.
- c) para demonstrar e marcar a entonação da fala, ou seja marca a oralidade de uma região.
- d) para estabelecer os padrões utilizados como linguagem formal de uma região.

**02 - A receita culinária é considerada um gênero textual, o que é incorreto afirmar sobre gêneros textuais:**

- a) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas.
- b) Textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas.
- c) Um gênero textual oferece uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares.
- d) Abrange um conjunto fechado e praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função.

**03 - Os verbos citados estão em que conjugação verbal (casca, quenta, foga, pica, foga e poim), significando (descascar, esquentar, refogar, picar, reforgar e colocar), lembrando que estamos analisando dentro de um contexto único, e que precisamos levar em consideração que eles são representados pela oralidade:**

- a) Presente do indicativo.
- b) Imperativo afirmativo.
- c) Indicativo condicional.
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

**04 - Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita, ou seja, é a forma correta da escrita. Nos exemplos abaixo assinale as que correspondem às normas ortográficas:**

- a) poetizar, paralisar, casebre, poetisa.
- b) embriaguez, altivez, catálise, catalizante.
- c) teimoso, briozo, cauteloso, pizar.
- d) cazeira, analisa, maciez, fazê.

**05 - Veja qual seleção de palavras se adéqua as palavras parônimas:**

- a) descascar - fritar.
- b) alho - óleo.
- c) dourar - embelezar.
- d) dente - cabeça.

**06 - O diâmetro da base de um cone circular reto mede 8 cm. Sabe-se que a geratriz desse cone mede 0,5 dm. O volume desse cone é de:**

- a)  $4\pi \text{ cm}^3$ .
- b)  $8\pi \text{ cm}^3$ .
- c)  $16\pi \text{ cm}^3$ .
- d)  $64\pi \text{ cm}^3$ .

**07 - Casemiro comprou 5 camisas e 3 calças por R\$ 612,00. Sabe-se que cada camisa custou 3/5 do valor de cada calça. Se Casemiro tivesse comprado 1 calça e 1 camisa teria pagado:**

- a) R\$ 163,20.
- b) R\$ 165,20.
- c) R\$ 167,20.
- d) R\$ 169,20.

**08 - Rogério pensou num número, adicionou 5 unidades e multiplicou esse resultado pelo número pensado anteriormente. O resultado dessa conta foi 374. O número pensado por Rogério é:**

- a) 17.
- b) 18.
- c) 19.
- d) 20.

**09 - Na fazenda 3 estrelas, um rebanho de 0,45 mil cabeças de gado consome 45,9 T de ração num período de 6 dias. Se fossem 500 cabeças de gado, em 5 dias o consumo de ração seria de:**

- a) 40 T.
- b) 42,5 T.
- c) 45 T.
- d) 47,5 T.

**10 - Dados os conjuntos  $A = \{-3, -1, 1, 2, 5\}$ ,  $B = \{0, 1, 2\}$  e  $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ , é correto afirmar que:**

- a)  $A \cap B = \{0, 1, 2\}$
- b)  $B \supset C$ .
- c)  $C \subset A$ .
- d)  $B \cap C = B$ .

**11 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao diagnóstico, prognóstico e o plano de tratamento:**

- a) Todo e qualquer tratamento em odontopediatria deve ter três objetivos básicos: a prevenção da cárie dentária, da doença periodontal e das maloclusões.
- b) O diagnóstico dos pacientes infantis não apenas envolve a identificação da doença e a distinção entre uma e outra, como também inclui o reconhecimento de outras condições que representam um desvio da condição esperada ou desejada.
- c) O profissional deve estabelecer o diagnóstico e o plano de tratamento na primeira consulta para que o paciente, ou seu responsável, autorizem, ou não, o início do tratamento.
- d) O prognóstico deve prever, com base na doença ou anomalia presente e em experiência anterior, a avaliação relativa à evolução, duração e cura da doença.

**12 - Do ponto de vista prático, o conceito de prevenção engloba vários componentes que, em conjunto formam a denominada “Filosofia Preventiva”. Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação a essa filosofia, exceto:**

- a) Tentar, na esfera da nossa competência, de manter a saúde das pessoas sadias, isto é, evitando que esses indivíduos adoçam.
- b) Tratar, por meios a nosso alcance ou não, rapidamente o progresso de qualquer enfermidade presente.
- c) Tratar de reabilitar o paciente física, psicológica e socialmente de modo tal que possa viver e desempenhar normalmente suas funções.
- d) Proporcionar ao paciente a oportunidade de adquirir o conhecimento, a competência e a motivação necessários para que possa manter sua saúde bucal.

**13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às regras básicas que devem eliminar boa parte dos problemas de alimentação em crianças sadias, exceto:**

- a) Na hora das refeições o alimento deve ficar situado em primeiro plano para que a criança saiba da importância do mesmo.
- b) O consumo excessivo de leite deve ser evitado após o segundo ano de vida. O excesso de leite só serve para diminuir o desejo natural de outros alimentos básicos.
- c) Evitar o consumo de carboidratos refinados, que muitas vezes são dados para satisfazer a fome da criança.
- d) Os alimentos não devem ser forçados; isso pode resultar em aversão a eles.

**14 - Com relação aos depósitos de flúor na fase pré-eruptiva e em dentes humanos está incorreto afirmar:**

- a) A maior ou menor quantidade de flúor adquirida nas camadas superficiais do esmalte depende de sua concentração nos tecidos e fluidos que envolvem os dentes.
- b) O tempo de maturação pré-eruptiva do dente permanente é maior que o do dente decíduo. Dessa forma, a concentração de flúor nos dentes permanentes é sempre maior que nos decíduos.
- c) Como o flúor tem facilidade em penetrar nas camadas mais profundas do esmalte, ele concentra-se mais em seu interior do que na sua superfície.
- d) Há maior concentração de flúor nas fissuras de dentes não erupcionados do que na região cervical ou vestibular.

**15 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos cimentos de ionômero de vidro:**

- a) O cimento de ionômero de vidro é o material mais indicado na fase de adequação do meio bucal, para técnica de restauração atraumática e selamento oclusal de molares permanentes e decíduos recém-erupcionados.
- b) As indicações do cimento de ionômero de vidro devem-se basicamente a duas características inerentes do material, que é a liberação de fluoreto e o seu poder bactericida e bacteriostático.
- c) As propriedades de escoamento dos cimentos de ionômero de vidro tipo I possibilitam sua utilização em toda a extensão da peça a ser cimentada, de maneira relativamente simples.
- d) A primeira matriz a se formar é uma matriz de poliácrlato de alumínio, menos resistente e mais susceptível à água. Logo em seguida, forma-se uma matriz de policarbonato mais resistente e que irá aumentar as propriedades mecânicas do material.

**16 - Com relação às considerações sobre os compômeros restauradores assinale a alternativa incorreta:**

- a) Os compômeros estão indicados para o uso em restaurações oclusais e proximais de dentes decíduos.
- b) Em relação ao desgaste, os compômeros apresentam menor desgaste quando comparados aos cimentos de ionômero de vidro, e maior em relação às resinas compostas.
- c) Os compômeros apresentam a dureza e textura superficial melhores quando comparados aos cimentos de ionômero de vidro convencionais e aos modificados por resina.
- d) Propriedades como a resistência adesiva e a microinfiltração nesse material, são melhorados quando o condicionamento ácido é utilizado.

**17 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos adesivos dentinários, exceto:**

- a) Em função das diferenças estruturais entre esmalte e dentina, os mecanismos de adesão dos adesivos ao esmalte são muito mais complexos, quando comparados à estrutura dentinária.
- b) Os sistemas adesivos atuais estão baseados na união micromecânica ao esmalte e dentina condicionadas.
- c) Os adesivos dentinários empregados atualmente preconizam o condicionamento ácido de dentina, promovendo a remoção total da camada de smear layer, e conseqüentemente, a abertura dos túbulos dentinários.
- d) Os adesivos considerados de quarta geração são aqueles que removem a camada smear layer, descalcificam superficialmente as dentinas inter e peritubular e expõem a rede de fibras colágenas para posterior impregnação dessa área pelos monômeros hidrofílicos.

**18 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à radiologia na odontopediatria, exceto:**

- a) A técnica de Clark pode ser utilizada para determinar a posição de dente supranumerários por palatino (lingual) ou vestibular (bucal).
- b) A técnica oclusal é de grande valia no diagnóstico de cistos e osteomielite esclerosante de Garré.
- c) Nos casos de intrusão de dentes anteriores decíduos por traumatismo, a técnica intrabucal de Fazzi nos permite saber a relação do dente intruído com o germe do permanente.
- d) A técnica pantomográfica tem grande aceitação pela facilidade de execução, pouca exposição aos raios X devido à maior distância focal e conforto para a criança.

**19 - Morfológicamente, a lesão de cárie em dentina pode ser dividida em zonas. Todas as alternativas abaixo apresentam nomes corretos dessas zonas, exceto:**

- a) Zona de esclerose dentinária.
- b) Zona de atividade odontoclástica.
- c) Zona de invasão bacteriana.
- d) Zona de desmineralização superficial ou avançada.

**20 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos sinais da Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda, exceto:**

- a) Inversão da topografia da papila.
- b) Presença de pseudomembrana sobreposta à gengiva.
- c) Enfartamento ganglionar.
- d) Contagiosa.

**21 - Assinale a alternativa que não apresenta condições médicas nas quais são indicados o uso profiláticos de antibióticos:**

- a) Estenose idiopática hipertrófica da aorta.
- b) Prolapso de válvula mitral com ou sem regurgitação.
- c) Pacientes que receberam transplantes.
- d) Lúpus eritematoso.

**22 - Assinale a alternativa incorreta com relação á endodontia em decíduos:**

- a) A técnica de remoção da polpa coronária é seguida do uso de medicamentos que procuram manter a polpa radicular em condições de saúde.
- b) A técnica da pulpectomia é, em tudo, semelhante ao tratamento de canal de dentes permanentes.
- c) A instrumentação do canal radicular do decíduo é praticamente usada para remover o máximo de tecido necrosado de dentro o canal.
- d) Na grande maioria dos casos, o capeamento pulpar direto em dentes decíduos tem apresentado bons resultados.

**23 - Com relação aos pinos intra-radulares utilizados em decíduos, não podemos afirmar:**

- a) Durante a cimentação, é importante ficar atento para que não ocorra excesso de cimento na região do sulco gengival.
- b) A porção do pino que fica fora do canal deve corresponder a aproximadamente metade da coroa do dente.
- c) Com o canal do dente previamente tratado, retira-se 2mm de material obturador com broca de aço esférica.
- d) As raízes remanescentes de dentes decíduos com perda total da coroa devem receber tratamento endodôntico e pinos intra-radulares, dependendo do grau de rizólise.

**24 - “A relação dos arcos dentários dos dentes naturais quando temos máxima intercuspidação (oclusão central) dos dentes e os músculos estejam contraídos em seu ciclo de potência máxima.”**

**O texto acima define:**

- a) Dimensão vertical de repouso.
- b) Dimensão vertical de oclusão.
- c) Relação de oclusão cêntrica.
- d) Máxima intercuspidação habitual.

**25 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas afirmativas com relação às lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes jovens, exceto:**

- a) A concussão é um pequeno traumatismo às estruturas de suporte do dente, com aumento de mobilidade ou deslocamento anormal.
- b) A luxação extrusiva ocorre quando o dente sofre esfoliação parcial. Nesses casos, é muito comum o aparecimento de reabsorção externa.
- c) O importante nos casos de luxação lateral é que o controle clínico radiográfico seja feito para avaliar as alterações que possam surgir.
- d) A intrusão pode ser total ou parcial, havendo compressão ou fratura do processo alveolar, particularmente na região correspondente ao ápice do dente intruído.

**26 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas contra indicações com relação à pulpotomia utilizando formocresol em decíduos, exceto:**

- a) Dente de que não pode ser restaurado.
- b) Destes preste a esfoliar ou sem osso que cobre a coroa do permanente.
- c) História de dor provocada.
- d) Polpa que não sangra.

**27 - Todas as alternativas abaixo apresentam doenças que podem levar a um retardo da rizólise, exceto:**

- a) hipotireoidismo.
- b) hipopituitarismo.
- c) disostose cleidocraniana.
- d) diabetes.

**28 - Assinale a alternativa incorreta com relação às diferenças morfológicas entre os dentes decíduos e os permanentes:**

- a) Os terços cervicais vestibular e lingual das coroas dos decíduos anteriores são muito mais proeminentes que os dos dentes permanentes.
- b) As câmaras pulpares nos dentes decíduos são comparativamente maiores que as nos dentes permanentes.
- c) O esmalte dos dentes decíduos é menos permeável que o esmalte dos dentes permanentes. Porém, essa permeabilidade é diminuída após o início reabsorção radicular.
- d) A espessura de dentina entre a câmara pulpar e o esmalte é menor nos dentes decíduos que a nos dentes permanentes.

**29 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas contra indicações com relação à realização de obturações dos canais radiculares nos decíduos, exceto:**

- a) Reabsorção radicular interna visível em raios X.
- b) Reabsorção radicular patológica excessiva, envolvendo mais de um terço da raiz.
- c) Presença de cisto dentígero ou folicular.
- d) Comprimento radicular de no mínimo 7mm.

**30 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas características de más oclusões classe III, exceto:**

- a) Os pacientes com este tipo de problema apresentam um perfil facial côncavo.
- b) Na maioria dos casos, os pacientes têm como característica intrabucal, a mordida cruzada posterior.
- c) Este tipo de problema poderá ser interceptado com a utilização de alguns aparelhos bem específicos. Se o paciente estiver na fase de crescimento e desenvolvimento craniofacial, e o problema for da maxila, utilizamos a Máscara Facial, que tem como finalidade tracionar a maxila para frente.
- d) Outra opção de tratamento é a mentoneira, que tem como função, a tentativa de “diminuir” o crescimento mandibular, nos casos onde este está exagerado.