



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da UniuV para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 16 de abril de 2012.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

1. Numa prescrição médica de 1.500ml de soro fisiológico, a 0,9%, mais 1.000ml de soro fisiológico, a 05%, mais 1.000 de Ringer Lactato, para serem administrados em 24 horas, o gotejamento das fases será:
 - A () De 47 a 48 gotas/min;
 - B () De 48 a 49 gotas/min;
 - C () De 49 a 50 gotas/min;
 - D () De 50 a 51 gotas/min;
 - E () De 51 a 52 gotas/min.

2. Supinação é o movimento de:
 - A () Rotação da palma da mão para baixo;
 - B () Curvar o punho em direção ao polegar;
 - C () Rotação da palma da mão para cima;
 - D () Extensão da perna para frente;
 - E () Flexão da perna para trás.

3. Durante a fase de avaliação no processo de enfermagem, o enfermeiro visa:
 - A () À coleta e análise de dados;
 - B () À seleção de ações de enfermagem;
 - C () À avaliação do plano de assistência;
 - D () À conferência sobre a assistência ao paciente;
 - E () À conferência da história clínica obtida pelo médico.

4. Na verificação de sinais vitais, é correto:
 - A () Considerar dentro da faixa de normalidade uma pessoa adulta cuja frequência respiratória é de 15 rpm;
 - B () Afirmar que um indivíduo com 37,5°C de temperatura retal está febril;
 - C () Verificar pulso apical na artéria braquial;
 - D () Posicionar o paciente com o braço abaixo da altura do coração para mensuração da pressão arterial;
 - E () Não informar o valor da pressão arterial ao paciente.

5. O balanço hídrico das 24 horas para reposição de 1.500 ml de soro glicosado, 1.000 ml de fisiológico e 500 ml de sangue total e eliminação de 1.200 ml de diurese, 300 ml de débito hemático por dreno pleural e vômito em grande quantidade. O balanço hídrico é de:
 - A () – 900 ml;
 - B () + 900 ml;
 - C () – 1.500 ml;
 - D () + 1.500 ml;
 - E () + 1.200 ml.

6. A aplicação de compressas de gelo no local da lesão está indicada em casos de:
 - A () Queimaduras elétricas;
 - B () Hemorragia venosa;
 - C () Hemorragia arterial;
 - D () Acidentes com animais peçonhentos;
 - E () Entorses e luxações.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

7. O aumento da glicose no sangue gera sintomas que variam de intensidade, de diabético para diabético. Alguns desses sintomas geralmente são:

- A () Poliúria, irritabilidade e fadiga excessiva;
- B () Edema, hipotensão e aumento de peso;
- C () Polifagia, pirose e epistaxe;
- D () Dificuldade visual, hipertensão e dispneia;
- E () Cianose de extremidade, sudorese e halitose.

8. Sobre doenças carenciais, relacione a coluna da direita (manifestações) com a da esquerda (deficiências).

- 1. Vitamina A () Alterações no colágeno.
- 2. Vitamina B1 () Insuficiência de secreção biliar e pancreática.
- 3. Vitamina B6 () Manifestações hemorrágicas.
- 4. Vitamina K () Anemia e sintomas neurológicos.
- 5. Vitamina C () Alterações no sistema nervoso.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A () 2, 3, 4, 5, 1;
- B () 5, 1, 4, 3, 2;
- C () 3, 2, 1, 4, 5;
- D () 1, 2, 3, 4, 5;
- E () 4, 5, 2, 3, 1.

9. São sinais clássicos de choque:

- A () Pele fria e úmida, petéquias e cefaleia;
- B () Hipertensão, infecção e pele fria;
- C () Desidratação, anemia e pulso rápido e fino;
- D () Pulso rápido e fino, pele fria e úmida e respiração rápida;
- E () Pulso rápido e fino, edema de membros inferiores e prurido.

10. O choque hipovolêmico é causado por:

- A () Sobrecarga cardíaca;
- B () Presença de infecção;
- C () Inadequada saturação de O₂;
- D () Diminuição de volume de líquidos por perda de sangue ou plasma;
- E () Aumento da pressão sanguínea.

11. Na tromboembolia, a principal complicação da terapia anticoagulante é:

- A () Infecção;
- B () Angina pectoris;
- C () Sangramento espontâneo em qualquer parte do corpo;
- D () Derrame pleural;
- E () Choque neurogênico.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

12. Pode-se definir cor pulmonale como:
- A () Diminuição da capacidade do coração em fornecer oxigênio;
 - B () Circulação coronária que remove dióxido de carbono;
 - C () Espessamento das paredes arteriais com perda de elasticidade;
 - D () Aumento do ventrículo esquerdo, devido a doenças que causam hipertensão;
 - E () Aumento do ventrículo direito, devido a doenças que causam hipertensão.
13. Das seguintes declarações, assinale a que define melhor a resposta inflamatória:
- A () Respostas localizadas, iniciadas pela presença de micro-organismos;
 - B () Série de alterações ocorridas no sangue, devido à invasão por patógenos;
 - C () Respostas locais e sistêmicas do organismo, iniciadas por lesão ou infecção;
 - D () Processo pelo qual a infecção é “emparedada”, para limitar o efeito sobre o organismo;
 - E () Sensibilidade e calor em local vulnerável do organismo.
14. Assinale a opção que apresenta o mecanismo de controle social no Sistema Único de Saúde:
- A () As CIB;
 - B () As CIT;
 - C () Os CMS;
 - D () CONASS;
 - E () Vigilância Sanitária.
15. O processo pelo qual, através de uma fistula arteriovenosa, filtra-se o sangue, promovendo a eliminação de toxinas, denomina-se:
- A () Diálise peritoneal;
 - B () Hemodiálise;
 - C () Toracocentese;
 - D () Videolaparoscopia;
 - E () Drenagem peritoneal.
16. Na aspiração de secreção em pacientes traqueostomizados, ao introduzir o cateter de aspiração até o fim do tubo e ao retirá-lo, a equipe de enfermagem deve, delicadamente:
- A () Desligar o cateter;
 - B () Inclinar o cateter;
 - C () Levantar o cateter;
 - D () Abaixar o cateter;
 - E () Rodar o cateter.
17. Quando é dispensada assistência a um paciente, em situação de emergência, muitas decisões importantes precisam ser tomadas. No tratamento de emergência, vários princípios são aplicáveis, EXCETO:
- A () Controlar a hemorragia e suas consequências;
 - B () Avaliar e restaurar o débito cardíaco;
 - C () Prevenir e tratar o choque;
 - D () Manter uma via aérea pérvia e proporcionar ventilação adequada;
 - E () Iniciar a monitorização de ECG, se necessário.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

18. O soro antiaracnídeo neutraliza o veneno:
- A () Só de aranhas;
 - B () De aranhas e escorpiões;
 - C () Só de escorpiões;
 - D () De serpentes venenosas;
 - E () De serpentes e aranhas.
19. O beta HCG é um excelente teste no diagnóstico precoce da gravidez, pois sua determinação ocorre desde 0 a 2 dias de atraso menstrual. Qual é o hormônio identificado por esse exame?
- A () Hormônio luteinizante;
 - B () Prolactina;
 - C () Gonadotropina coriônica;
 - D () Hormônio folículo estimulante;
 - E () Prostaglandina.
20. A hipertensão arterial é uma doença crônica, que requer o empenhamento do enfermeiro para conquistar a adesão do hipertenso ao tratamento. Entre as ações que o profissional pode implementar para aumentar as chances de sucesso está:
- A () A realização de consultas semanais;
 - B () A escolha de drogas com menos efeitos colaterais;
 - C () O controle da alimentação em registros de consumo diário;
 - D () O treinamento do cliente para a verificação da pressão em casa;
 - E () A fixação, no consultório, de mapa educativo sobre efeitos da doença.
21. O sistema denominado “rede de frio” se divide em quatro níveis, obedecendo à seguinte hierarquia:
- A () Local, regional, nacional, central, estadual;
 - B () Central, estadual, regional, local, nacional;
 - C () Nacional, central, estadual, local, regional;
 - D () Nacional, local, regional, central, estadual;
 - E () Nacional, central, estadual, regional, local.
22. Para que uma pessoa passe a se tratar no Programa DST/AIDS, a confirmação da doença deverá ser feita através do exame:
- A () De sangue;
 - B () De urina;
 - C () Clínico e laboratorial;
 - D () Físico e radiológico;
 - E () Radiológico e laboratorial.
23. A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser aplicada logo ao nascer. O local de aplicação dessa vacina nos recém-nascidos é no músculo denominado:
- A () Vasto lateral;
 - B () Glúteo;
 - C () Deltoide;
 - D () Quadríceps;
 - E () Ventre glúteo.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

24. A disenteria bacilar tem como agente etiológico a:
- A () Salmonella;
 - B () Taenia;
 - C () Ancylostoma;
 - D () Shigella;
 - E () Escherichia Coli.
25. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte das atribuições do Sistema Único de Saúde:
- A () Controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde;
 - B () Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
 - C () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho;
 - D () Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
 - E () Proteger o trabalhador e a gestante em situação de desemprego.
26. A ocorrência habitual de uma doença ou de um agente infeccioso, em uma determinada área geográfica, caracteriza uma situação de:
- A () Endemia;
 - B () Epidemia;
 - C () Pandemia;
 - D () Surto regional;
 - E () Surto local.
27. O gigantismo é uma doença causada pela liberação exagerada do hormônio do crescimento. Esse hormônio é liberado por:
- A () Hipófise anterior;
 - B () Hipófise posterior;
 - C () Pâncreas;
 - D () Fígado;
 - E () Suprarrenal.
28. O tétano é uma doença aguda causada pelo bacilo Clostridium tetani nos ferimentos contaminados ou desvitalizados. Esse bacilo tem afinidade com os centros motores da medula e do cérebro. Os sinais e sintomas característicos do tétano são vários, EXCETO:
- A () Trismo, riso sardônico;
 - B () Rigidez de nuca e MMII;
 - C () Opistótono, convulsão generalizada;
 - D () Sialorreia, alteração do estado mental;
 - E () Rigidez do corpo, espasmos tônicos.
29. Concussão é um golpe significativo na cabeça, que pode levar à inconsciência. Há vários cuidados de enfermagem em uma concussão, EXCETO:
- A () Atentar para vômitos;
 - B () Observar sonolência;
 - C () Hidratar o paciente por VO;
 - D () Atentar para a incapacidade de acordar;
 - E () Monitorar sinais vitais e oximetria.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

30. A vontade de urinar chega até a bexiga com um sinal do sistema nervoso autônomo quando seu volume interno é de:
- A () 200 ml;
 - B () 250 ml;
 - C () 350 ml;
 - D () 400 ml;
 - E () 300 ml.
31. No pós-operatório de traqueostomia, os cuidados de enfermagem necessários são:
- A () Fixar a cânula com cadarço e Insuflar o cuff.
 - B () Estimular a deambulação;
 - C () Estimular ingesta hídrica;
 - D () Iniciar alimentação;
 - E () Controle rigoroso da PA (pressão arterial).
32. A isquemia que ocorre nas escaras é devido:
- A () À Sujidade na lesão;
 - B () À compressão da lesão;
 - C () À anóxia dos tecidos;
 - D () À fricção das roupas sobre a lesão;
 - E () À nutrição deficitária.
33. Ptalismo significa:
- A () Hiperplasia bilateral que afeta a tireoide;
 - B () Queda dos cílios;
 - C () Ato de cuspir;
 - D () Sialorreia;
 - E () Obstrução do ducto salivar.
34. Os sinais e sintomas mais comuns da intoxicação digitalica são:
- A () Palidez, hipertensão, vômitos e sonolência;
 - B () Hipertensão, sangramento, náuseas e febre;
 - C () Febre, epistaxe, sonolência e palidez;
 - D () Náuseas, vômitos, confusão mental e tontura;
 - E () Vômitos, hipotensão, cianose e palidez.
35. O decúbito de Sims é utilizado quando:
- A () Na passagem da sonda vesical de demora;
 - B () Na passagem de sonda nasogástrica;
 - C () Em exames ginecológicos;
 - D () Nas lavagens intestinais;
 - E () Nas cirurgias abdominais.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA/PR**

36. Transfusão de sangue é a infusão de sangue na circulação. Os cuidados de enfermagem durante a administração do sangue são:
- A () Controle de sinais vitais e controle hídrico rigoroso;
 - B () Controle de sinais vitais e observar sinais de choque neurogênico;
 - C () Controle de sinais vitais e observar sinais de reações anafiláticas;
 - D () Controle de sinais vitais e observar sinais de choque cardiogênico;
 - E () Controle de sinais vitais e observar sinais de choque séptico.
37. A certificação da posição da sonda nasoenteral é feita de que forma?
- A () Aspiração de conteúdo gástrico;
 - B () Ausculta de ar chegando ao jejuno;
 - C () Raio-X abdominal;
 - D () Ausculta do ar chegando ao estômago;
 - E () Ausência de tosse.
38. Sinal flogístico é o mesmo que:
- A () Sinal de infecção;
 - B () Sinal de inflamação;
 - C () Sinal bacteriano;
 - D () Sinal viral;
 - E () Sinal de flictena.
39. A sonda de Béniqué é utilizada para:
- A () Dilatar estenose anal;
 - B () Dilatar estenose vaginal;
 - C () Dilatar estenose uretral;
 - D () Dilatar estenose arterial;
 - E () Dilatar estenose de esôfago.
40. O rodízio no local de aplicação da insulina deve ocorrer devido ao risco de:
- A () Não absorção da droga;
 - B () Lipodistrofia;
 - C () Edema;
 - D () Inflamação;
 - E () Abscesso.