



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados via internet no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 9 de Janeiro de 2012.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

1. Na hanseníase (MH), o tratamento é eminentemente ambulatorial. Nos serviços básicos de saúde, administra-se uma associação de medicamentos, a poliquimioterapia. Assim sendo a PQT é constituída pelos seguintes medicamentos:
- A () Rifampicina, dapsona e clofazimina.
 - B () Isoniazida, rifampicina e dapsona.
 - C () Rifampicina, clofazimina e pirazinamida.
 - D () Dapsona, etambutol e rifampicina.
 - E () Isoniazida, rifampicina e pirazinamida.
2. No manejo da gestante em uso de TARV (terapia antirretroviral), qual a idade gestacional recomendada para o início da terapia antirretroviral? Indique a alternativa correta:
- A () Entre 4 a 8 semanas de gestação;
 - B () Após a 28ª semana de gestação;
 - C () A partir da 34ª semana de gestação;
 - D () Após a 12ª semana de gestação;
 - E () Após a 20ª semana de gestação.
3. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância. Qual agente etiológico causador desse agravo? Escolha a alternativa correta:
- A () Pertence ao gênero MORBILLIVIRUS, família PARAMYXOVIRIDAE;
 - B () Pertence ao gênero RUBIVIRUS, família TOGAVIRIDAE;
 - C () Pertence ao gênero LYSSAVIRUS, família RHABDOVIRIDAE;
 - D () Pertence ao gênero ENTEROVIRUS, família PICORNAVIRIDAE;
 - E () Pertence ao gênero FLAVIRUS, família FLAVIVIRIDAE.
4. Uma das ações do enfermeiro na fase intraoperatória com pacientes submetidos a cirurgia, é posicionar corretamente o paciente para o procedimento anestésico e cirúrgico, mantendo o alinhamento funcional do corpo. As posições mais usadas para cirurgia do abdome são:
- A () Dorsal recumbente e trendelemburg;
 - B () Dorsal recumbente e litotômica;
 - C () Abdominotorácica e litotômica;
 - D () Abdominotorácica e spinks;
 - E () Abdominotorácica e depage.
5. Qual o quadro clínico e achados laboratoriais, na síndrome de HELLP, que é uma complicação obstétrica grave, que requer intervenções emergenciais? Assinale a opção correta:
- A () Hipertensão arterial, taquicardia, anasarca, hiperglicemia e plaquetas $< 1000.000/mm^3$;
 - B () Hipertensão arterial, edema, náusea, e ou vômito, hiponatremia e TGO $< 70 U/L$;
 - C () Hipertensão arterial, hiponatremia e cianose, náusea e ou vômito e bilirrubina total $< 1,2 mg/dl$;
 - D () Hipertensão arterial, taquicardia, cianose, náusea e ou vômito, hipoglicemia e plaquetas $> 100.000/mm^3$;
 - E () Hipertensão arterial, náusea e ou vômito, gengivorragia, icterícia, petéquias e plaquetas $< 100.000 mm^3$.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

6. Sendo a gestante soropositivo para HIV, quando iniciar a primeira dose da profilaxia com AZT (Azidotimidina) solução oral em recém-nascido? É correto afirmar que:
- A () Nas primeiras 4 horas após o nascimento;
 - B () Nas primeiras 6 horas após o nascimento;
 - C () Nas primeiras 2 horas após o nascimento;
 - D () Nas primeiras 8 horas após o nascimento;
 - E () Nas primeiras 5 horas após o nascimento.
7. São funções da Vigilância Epidemiológica, EXCETO:
- A () Coleta de dados;
 - B () Análise e interpretação dos dados processados;
 - C () Promoção das ações de controle indicadas;
 - D () Divulgação de informações pertinentes;
 - E () Planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde.
8. A TALIDOMIDA é uma droga eficaz no tratamento das manifestações cutâneas moderadas a graves da reação hansênica tipo II. A opção por seu uso se dá devido à sua ação principal que é:
- A () Ação anti-inflamatória;
 - B () Ação antibacteriana;
 - C () Ação antibiótica;
 - D () Ação anti-histamínica;
 - E () Ação antimicótica.
9. A hanseníase é uma doença causada por um bacilo denominado mycobacterium leprae, não é hereditário, e sua evolução depende de características do sistema imunológico da pessoa que foi infectada. São sinais e sintomas:
- A () Sensação de formigamento, dormência nas extremidades, manchas brancas ou avermelhadas e diminuição na força muscular;
 - B () Alteração da sensibilidade, manchas brancas ou avermelhadas, início súbito da febre e dores musculares;
 - C () Sensibilidade ao calor, frio e dor, anorexia, cefaleia e dificuldade para segurar objetos;
 - D () Carços e placas em qualquer local do corpo, alteração da sensibilidade, artralgia, náuseas e vômitos;
 - E () Manchas brancas ou avermelhadas com exantema máculo-papulares, cefaleia e dormência nas extremidades.
10. A CK – MB é liberado quando há:
- A () Pressão arterial sistólica diminuída;
 - B () Pressão arterial sistólica aumentada;
 - C () Processo inflamatório cardíaco;
 - D () Lesão nas células miocárdicas;
 - E () Anormalidade lipoproteica miocárdica.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

11. A VIP (vacina inativada contra poliomielite). Qual a via de administração recomendada?
- A () Via oral;
 - B () Via tópica;
 - C () Via intramuscular;
 - D () Via intradérmica;
 - E () Via sublingual.
12. O pneumococo faz parte da microbiótica normal da nasofaringe, sendo causa frequente de otite média aguda, pneumonias, bacteremias e meningites. A maior incidência de doença pneumocócica ocorre nos primeiros anos de vida e no idoso. De acordo com o CRIE – Centro de Referência de imunobiológicos especiais, a revacinação é indicada:
- A () Cada dez anos;
 - B () Dose única;
 - C () Anualmente;
 - D () Cada cinco anos após a dose inicial;
 - E () Conforme orientação médica.
13. No quarto período clínico do parto ocorrem a hemostasia da ferida placentária e a contratilidade uterina. Algumas condutas obstétricas podem auxiliar nesse processo, entre elas:
- A () O uso racional de ocitócitos e a amamentação do recém-nascido na primeira hora pós-parto;
 - B () A massagem abdominal com expressão do fundo uterino para remoção dos coágulos;
 - C () A curetagem uterina profilática, após a dequitação da placenta;
 - D () O uso controlado de Kristeller, no segundo período clínico do parto;
 - E () A infusão profilática rotineira de ocitócito, logo após a dequitação.
14. Na manutenção do cateter de monitorização da Pressão Arterial Sistêmica, é fundamental a lavagem do sistema, para evitar trombose intra-arterial e intracateter. Na lavagem intermitente (flush), qual a solução a ser indicada?
- A () Soro fisiológico heparinizado (2U/ml);
 - B () Soro fisiológico a 0,9% (fluxo de 3ml/hora);
 - C () Soro glicosado heparinizado (3U/ml);
 - D () Soro fisiológico heparinizado (3U/ml);
 - E () Soro glicosado (fluxo 3ml/hora).
15. No que se refere à ventilação mecânica, é correto afirmar que:
- A () A modalidade controlada, o ventilador determina o início da inspiração por um critério de tempo, estipulado a partir do ajuste do comando da frequência respiratória;
 - B () Na ventilação mandatória intermitente, o ventilador determina início da inspiração por um critério de pressão ou de fluxo;
 - C () A modalidade CPAP é indicada nas situações em que o paciente não apresenta movimentos respiratórios;
 - D () Na ventilação assistida/controlada, o disparo da fase inspiratória é realizado pelo aparelho, combinando um mecanismo a tempo e volume;
 - E () Em uma ventilação puramente assistida, a frequência respiratória e o tempo expiratório ficam totalmente a cargo do respirador.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

16. A respiração de Kussmaul caracteriza-se por:

- A () Respiração curta e taquipneia;
- B () Hipoventilação e respiração profunda;
- C () Hiperventilação e bradipneia;
- D () Episódios alternados de apneia e períodos de respiração profunda;
- E () Incursões rápidas e profundas.

17. A anestesia utilizada em toracotomia deve ser:

- A () Local;
- B () Geral;
- C () Raquimedular;
- D () Inalatória;
- E () Geral / inalatória.

18. Qual a inflamação causada pela *Cândida albicans* que surge na boca do recém-nascido?

- A () Gastrite;
- B () Laringite;
- C () Glossite;
- D () Estomatite;
- E () Enterite.

19. Entorses, luxações e fraturas, muitas vezes, requerem imobilização mediante aparelho gessado. Sobre a assistência a portadores desses aparelhos, é correto afirmar que:

- A () A dor acima de proeminências ósseas não requer atenção especial, porque reduz à medida que ocorre reparação do trauma local;
- B () Os exercícios de dedos e artelhos não imobilizados estão contraindicados porque vão interferir na consolidação óssea da lesão;
- C () Edema, coloração esbranquiçada da pele, temperatura e sensibilidade reduzidas são sintomas comuns no período pós-imobilização;
- D () A síndrome compartimentar é tratada pela abertura do gesso e elevação do membro no nível do coração;
- E () As janelas ou aberturas do aparelho gessado são desnecessárias nas imobilizações de tornozelos e pés.

20. Para o controle das doenças crônico-degenerativas, devemos saber de alguns parâmetros. No caso da hipertensão, se a PA estiver, após três verificações consecutivas em dias alternados, com valores entre 160/179 X 100/109 mmHg, estamos diante de um paciente:

- A () Hipotenso limítrofe;
- B () Hipertenso leve;
- C () Hipertenso moderado;
- D () Hipertenso grave;
- E () Normal limítrofe.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

21. Assinale a alternativa correta:

- A () Devido a sua baixa toxicidade, o uso de desinfetantes fenólicos para desinfecção de nível médio deve ser preferível a outras substâncias;
- B () Atualmente a solução de glutaraldeído a 2% está indicada para desinfecção de superfícies de mobiliário e equipamentos;
- C () O álcool etílico a 70% promove a desinfecção de alto nível, desde que o tempo de exposição do material à substância seja no mínimo 10 minutos;
- D () Em unidades básicas de saúde, o uso de formaldeído para esterilização de material crítico é o meio mais indicado devido ao seu baixo custo e facilidade de manuseio;
- E () Por se tratar de um produto instável, termo fotossensível, inativando-se rapidamente em presença de matéria orgânica, soluções de hipoclorito de sódio devem ser usadas sob rigoroso controle de qualidade.

22. A lavagem gástrica é um procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago, nos casos de ingestão de substâncias venenosas. Durante a lavagem gástrica, o paciente deve ser posicionado em decúbito:

- A () Lateral direito, com pernas estendidas, para favorecer o fluxo sanguíneo;
- B () Lateral esquerdo, para diminuir a passagem de líquido no duodeno;
- C () Lateral esquerdo, para garantir a homeostase;
- D () Ventral, para garantir a regurgitação;
- E () Dorsal, para garantir a homeostase.

23. São cuidados de enfermagem ao paciente que apresenta graves queimaduras, EXCETO:

- A () Avaliar inicialmente a respiração e, se necessário, estabelecer, de imediato, desobstrução das vias aéreas e realizar manobras de ressuscitação pulmonar;
- B () Não oferecer alimentos ou líquidos por via oral;
- C () Resfriar as queimaduras com aplicação local de gelo ou água fria;
- D () Instalar acesso venoso, pois essa é uma das medidas para se evitar o choque em pacientes queimados;
- E () Usar gorros, máscaras, luvas e aventais no atendimento aos pacientes com ferimentos abertos provocados por queimaduras.

24. Quanto ao procedimento de drenagem torácica, é correto afirmar que:

- A () O vazamento e a retenção de ar no espaço pleural podem resultar em pneumotórax hipertensivo. Por isso deve-se evitar o clampeamento do tubo por tempo prolongado.
- B () A flutuação do nível do líquido no tubo de água do frasco de drenagem.
- C () O tubo deve estar a 1,0 cm abaixo do nível de água do frasco de drenagem.
- D () Estão contraindicados o estímulo à respiração profunda e à tosse, pois aumentam a pressão intrapleural, levando à atelectasia.
- E () Deve-se conectar a rede de vácuo diretamente ao respiro do frasco selo d'água.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

25. Julgue os itens a seguir, relativos ao tratamento de enfermagem ao paciente sob terapia endovenosa.

- I. As veias das extremidades são relativamente seguras e de fácil acesso para punção. Nas terapias endovenosas, os acessos nos membros superiores e inferiores são mais comumente utilizados, por não apresentarem riscos;
- II. O local escolhido para a punção venosa não deve interferir na mobilidade do paciente. Por essa razão, a fossa antecubital deve ser evitada;
- III. A terapia endovenosa predispõe a vários riscos e a complicações sistêmicas, como sobrecarga hídrica, embolia gasosa, septicemia e infecções, as quais ocorrem com menor frequência;
- IV. Uma das complicações locais da terapia endovenosa, caracterizada pela presença de um coágulo acompanhado de inflamação da veia, é conhecida como flebite, sendo evidenciada pela queixa de dor localizada;
- V. Como a infecção pode ser uma complicação importante da terapia endovenosa, o dispositivo usado, o frasco que contém a solução parenteral e a tubulação, obrigatoriamente, têm de ser estéreis.

A quantidade de itens certos é igual a:

- A () 1
- B () 2
- C () 3
- D () 4
- E () 5

26. O choque hipovolêmico é uma das situações mais graves que pode apresentar um paciente politraumatizado. Com relação a esse assunto, assinale a opção INCORRETA.

- A () O choque é caracterizado por uma insuficiência circulatória que provoca inadequada perfusão tissular, resultando em um desequilíbrio entre o aporte e o consumo de oxigênio;
- B () O primeiro sinal de alarme é a hipotensão, que ativará os barorreceptores, produzindo aumento do tônus simpático, o que resulta em aumento da frequência cardíaca e em uma vasoconstrição arterial e venosa;
- C () A hipóxia tissular leva à acidose metabólica e a hipóxia cerebral, às alterações no nível de consciência;
- D () O paciente deve ser mantido na posição supina, com as pernas elevadas, independentemente de outras intercorrências, pela prioridade;
- E () A administração de oxigênio por máscara facial, para manter o PO₂ entre 90 torr 100 torr, líquidos e cateter urinário são intervenções importantes.

27. Formulações hipoalergênicas, destinadas ao preparo de pele e mucosas. Essa é definição de:

- A () Detergentes;
- B () Desinfetantes;
- C () Fungicida;
- D () Antisséptico;
- E () Germicida.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

28. Com relação à prevenção de infecção de corrente sanguínea, assinale (V) Verdadeiro ou (F) Falso:
- () Todo cateter periférico, tanto em pacientes adultos como em crianças, deve ser trocado a cada 72 horas.
 - () A troca de cateter venoso central (CVC), PICC com data pré-estabelecida, ajuda a prevenir infecção.
 - () Atualmente a clorexidina é o antisséptico de escolha para o preparo da pele antes da inserção de CVC.
 - () O cateter de PICC deve ser considerado para pacientes com previsão de mais de 6 dias de necessidade de cateter central.
 - () A nutrição parenteral total (NPT) não precisa ser infundida em via exclusiva.
- A () F; F; V; V; F.
B () V; V; F; F; F.
C () V; F; V; F; F.
D () F; V; F; V; V.
E () V; V; V; F; F.
29. São consideradas estratégias fundamentais para prevenir a infecção em pacientes imunodeprimidos:
- A () Higiene das mãos, técnica asséptica, isolamento protetor;
 - B () Higiene das mãos, técnica asséptica, isolamento quando recomendado;
 - C () Higiene das mãos, isolamento reverso, controle ambiental;
 - D () Higiene das mãos, isolamento protetor;
 - E () Higiene das mãos, técnica asséptica.
30. Na reforma da assistência psiquiátrica, o modelo centrado no hospital deve ser substituído por?
- A () Unidades psiquiátricas de hospital geral;
 - B () Hospitais-dia e centro de atenção Psicossocial;
 - C () Modelo de internações hospitalares;
 - D () Modelo descentralizado;
 - E () Modelo de rodízio entre hospital e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
31. Na esquizofrenia paranoide, os principais sintomas estão listados, EXCETO:
- A () Raiva;
 - B () Possível violência;
 - C () Alucinações auditivas;
 - D () Ideias delirantes de grandeza e perseguição;
 - E () Queixas hipocondríacas.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

32. Para o tratamento de HIV, os inibidores análogos nucleosídeos da transcriptase reversa de uso comum seriam:
Assinale a alternativa correta.
- A () Saquinavir, d4t (estavudina) e ritonavir.
 - B () Ritonavir, azidotimidina (azt) e d4t nelfinadir.
 - C () Azidotimidina (azt), d4t (estavudina) e 3tc.
 - D () D4t nelfinadir, ritonavir e saquinavir.
 - E () 3 tc, saquinavir e ritonavir.
33. Sobre o diabetes tipo I (ou insulino dependente), é CORRETO afirmar que:
- A () É causado pela destruição das células do pâncreas e pela consequente interrupção na produção de insulina, podendo ser prevenido por dieta e exercícios;
 - B () Ocorre quando o organismo produz insulina em quantidade insuficiente para a quantidade de glicose consumida, podendo ser prevenido por dieta e exercícios;
 - C () Ocorre quando o organismo produz insulina em quantidade suficiente, mas a glicose ingerida permanece na circulação sanguínea, não sendo metabolizada;
 - D () É uma doença autoimune, caracterizada pela destruição das células beta, produtores de insulina;
 - E () É mais frequente em pessoas com mais 50 anos.
34. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que constam na Lei nº 8.080/90:
- A () Universalidade, utilização da epidemiologia e autonomia da comunidade;
 - B () Igualdade, universalidade e direito à formação;
 - C () Igualdade, centralização e integralidade;
 - D () Autonomia da comunidade, universalidade e utilização da epidemiologia;
 - E () Centralização, regionalização e autonomia da comunidade.
35. O colesterol que é denominado de “mau colesterol”, que se deposita nas paredes das artérias quando em excesso, é o:
- A () HDL;
 - B () LDL;
 - C () ACTH;
 - D () STH;
 - E () FSH.
36. J. P., 17 anos, procurou o serviço de saúde com queixa de atraso menstrual. Durante a consulta, foi realizado o exame de urina, para diagnóstico de gravidez, cujo resultado foi positivo. A cliente informou que seus ciclos menstruais eram regulares e sua última menstruação havia iniciado no dia 15 de maio de 2006. Aplicando-se a regra Naegele, verifica-se que a data provável do parto está prevista para:
- A () 15/12/2006;
 - B () 25/12/2006;
 - C () 22/01/2007;
 - D () 01/02/2007;
 - E () 22/02/2007.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

37. Entre as medidas de prevenção primária para diminuição da incidência de infecção pelo HPV, destaca-se a:
- A () Distribuição de anticoncepcionais orais;
 - B () Realização frequente de Papanicolau;
 - C () Prescrição do uso de preservativo;
 - D () Seleção dos parceiros sexuais;
 - E () Cauterização de lesões do colo uterino.
38. A aplicação da vacina injetável não pressupõe antisepsia da região. Contudo, se a pele estiver muito suja, deve-se fazer o uso de:
- A () Éter;
 - B () Álcool;
 - C () Timerosol;
 - D () Água e sabão;
 - E () Clorexidina.
39. O teste de Mitsuda é utilizado para auxiliar o diagnóstico de:
- A () Difteria;
 - B () Hanseníase;
 - C () Tifo;
 - D () Hepatite;
 - E () Dengue.
40. A pressão do cuff que assegura o posicionamento da cânula e previne o risco de broncoaspiração é de:
- A () 10 a 15 mmHg;
 - B () 15 a 20 mmHg;
 - C () 20 a 25 mmHg;
 - D () 25 a 30 mmHg;
 - E () 30 a 40 mmHg.