



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem apurmo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofria o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.

- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.

- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar
porque vos nunca louv'en em meu trobar
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes (a) tan gran coraçõ
que vos eu loe, en esta razon
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçõ:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
b) Tan gran coraçõ.
c) Dona fea.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. Em sinusites agudas de crianças e adultos predominam os seguintes tipos de microorganismo:

- a) Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae.
b) Staphylococcus aureus e Moraxella catarrhalis.
c) Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae.
d) Moraxella catarrhalis streptococcus pyogene.

18. Com relação a sinusite subaguda supurativa e sinusite crônica supurativa assinale a alternativa correta:

- a) Na sinusite subaguda supurativa não se observa proliferação do epitélio e da submucosa, mas sim alterações vasculares e exsudação. Na crônica observa-se uma intensa proliferação da camada mucosa e submucosa.
b) Na sinusite crônica supurativa observa-se intensos fenômenos vasculares e exsudação, não podendo ser observado fenômenos proliferativos na mucosa. Na subaguda observa-se fenômenos proliferativos intensos na submucosa.
c) Na sinusite subaguda supurativa observa-se uma discreta metaplasia no epitélio colunar ciliado para escamoso estratificado concomitante com fenômenos vasculares e

exsudativos. Na crônica observa-se a proliferação do epitélio e intensa metaplasia das células colunares ciliadas para escamosa estratificada.

- d) Na sinusite subaguda supurativa observa-se uma proliferação do tecido conjuntivo da submucosa com persistência do epitélio ciliado e células calciformes. Na Crônica observa-se a necrose da camada superficial do epitélio seguida de proliferação da mucosa e a metaplasia de um epitélio colunar ciliado em escamoso estratificado.

19. O tratamento de primeira escolha para rinossinusites agudas leve a moderada de um quadro não recorrente é:

- a) Amoxicilina em associação com clavulanato com duração de 7 a 10 dias.
b) Cefaclor ou cefpodoxima proxetil com duração do tratamento de 7 a 14 dias.
c) Amoxicilina com duração do tratamento de 7 a 10 dias.
d) Levofloxacino ou gatifloxacino com duração do tratamento de 5 dias.

20. Paciente, 7 meses, deu entrada no pronto socorro com dor ao movimentar o pavilhão auricular, eritema, edema concêntrico do conduto auditivo externo e apresentando linfonodomegalia periauricular. O provável agente etiológico e a terapêutica mais adequada são respectivamente:

- a) Haemophilus influenzae, gotas otológicas com anestésicos e descongestionante via oral.
b) Enterobacter aerogenes, gotas otológicas com corticosteróides e anti-inflamatório via oral.
c) Streptococcus aureus, analgésico via oral e gotas otológicas com antibióticos.
d) Streptococcus pneumoniae, antibiótico via oral e gotas otológicas com anestésico.

21. Considere as seguintes afirmações com relação a tuba auditiva:
I - É conhecida como trompa de Eusáquio e comunica a orelha média com a rinofaringe.

II - Possui inclinação no sentido caudal no adulto com o ostio timpânico superior ao ostio faríngeo.

III - No nascimento mede de 17 a 18mm de comprimento atingindo até 35mm no adulto. Na criança apresenta-se mais verticalizada.

IV - O epitélio é ciliado, variando de colunar simples na extremidade faríngea até pseudoestratificado na extremidade timpânica.

V - Suas paredes permanecem em contato, exceto durante a deglutição, bocejo e espirro quando são abertas pelo músculo levantador do véu palatino.

- a) Somente I, II e V são verdadeiras.
b) Somente I, III e IV são verdadeiras.
c) Somente I e II são verdadeiras.
d) Somente I, III e V são verdadeiras.

22. A alta sensibilidade a sons de pequena magnitude é devido em parte a:

- a) A membrana timpânica ser muito delgada (aproximadamente 0,95mm de espessura) e elástica.
b) A cada parte do ouvido humano apresentar uma ressonância que não permite um ganho na intensidade de sons do meio ambiente.
c) A não existência de um efeito alavanca entre os ossículos (martelo, estribo e bigorna) e diferença de área entre a membrana timpânica e a fossa oval.
d) A membrana timpânica apresentar seu ligamento anular mais firme na margem superior, portanto não tendo um movimento de pistão e sim balanço por ser mais lateral na margem inferior do que na superior.

23. A ritidoplastia pode ter como complicações: hematomas, necrose de pele e lesão do nervo facial. As regiões de maior risco de lesão do nervo facial são:

- a) Mandibular, temporal e eminência malar.
b) Temporal, occipital e frontal.
c) Infratemporal, zigomática e orbital.
d) Eminência malar, zigomática e mandibular.

24. Os seguintes seios drenam para o meato médio:

- a) Esfenoidal, frontal e maxilar.
- b) Frontal, maxilar e células etmoidais anteriores.
- c) Maxilar, frontal e células etmoidais posteriores.
- d) Maxilar, células etmoidais anteriores e posteriores e frontal.

25. As causas de maior prevalência de tonturas em pacientes adultos jovens são:

- a) Vertigem postural paroxística benigna e neuronite vestibular.
- b) Vertigem postural paroxística benigna e doença de Ménière.
- c) Doença de Ménière e neuronite vestibular.
- d) Schwannoma do vestibulo e doença de Ménière.

26. Considere um paciente de 31 anos, apresentando histórico de uso de drogas intravenosas com lesões no assoalho da boca, sangrante e infiltrativa. O exame histopatológico demonstra sarcoma de Kaposi. Com base no achado histopatológico assinale a alternativa correta:

- a) Não apresenta relação com a AIDS e ocorre principalmente em indivíduos africanos.
- b) Trata-se de um tumor maligno do endotélio vascular linfático, apresentando lesões de cor rósea com formas regulares.
- c) É uma lesão extremamente maligna sendo necessário tratamento cirúrgico, radioterapia e quimioterapia.
- d) Trata-se de uma lesão freqüente em pacientes portadores do vírus da imunodeficiência adquirida.

27. Paciente, 45 anos, procura atendimento médico com queixa de corpo estranho na garganta, com disfagia e otalgia reflexa. O diagnóstico mais provável é de tumor:

- a) Vestibuloepiglótico.
- b) Supraglótico.
- c) Glótico.
- d) Subglótico.

28. Considere as seguintes afirmações com relação a fase faríngea da deglutição:

- I – Apresenta um curso rápido, sendo involuntária.
 - II – Os pares de nervos cranianos envolvidos são o VII e X, e também são responsáveis pelo reflexo do vômito.
 - III – A laringe é elevada e tracionada inferiormente na base da língua.
 - IV – Ocorre inicialmente o fechamento das pregas vocais (adução) seguido pelo fechamento das pregas vestibulares e finalmente pela cobertura do vestibulo laringeo através da epiglote.
- a) I e III estão corretas.
 - b) I, II e III estão corretas.
 - c) I, III e IV estão corretas.
 - d) II e III estão corretas.

29. Considere as seguintes afirmações com relação a síndrome de Sjögren:

- I – Trata-se de uma doença auto-imune apresentando como principais sintomas clínicos ceratoconjuntivite seca e xerostomia.
 - II – Ocorre um intenso infiltrado linfocitário nas glândulas exócrinas, principalmente LT CD4, LT CD8 e LB.
 - III – Infecções viral precedentes podem contribuir com os mecanismos de patogenicidade da doença resultando no agravamento do quadro clínico.
 - IV – A xerostomia resulta na diminuição da capacidade gustatória e não tem relação com disfagia.
- a) I e II estão corretas.
 - b) I, II e III estão corretas.
 - c) II e III estão corretas.
 - d) I, II e IV esta corretas.

30. Abscessos periamigdalianos são observados com mais frequência na região:

- a) Antero-inferior.
- b) Antero-superior.
- c) Pósterio-inferior.
- d) Pósterio-superior.

31. A intercorrência mais comum observada no pós-operatório imediato da estapedectomia é:

- a) Vertigem transitória branda.
- b) Paralisia facial transitória.

- c) Perda auditiva neurosensorial grave.
- d) Vertigem persistente grave.

32. Em uma abordagem endoscópica do seio esfenoidal existe o maior risco de lesar:

- a) Artéria carótida externa e nervo óptico.
- b) Artéria carótida primitiva e seio cavernoso.
- c) Artéria carótida externa e seio cavernoso.
- d) Artéria carótida interna e nervo óptico.

33. Os nervos cranianos responsáveis pela inervação sensitiva da membrana timpânica são:

- a) V, IX e XI.
- b) V, X e XI.
- c) IX, X e XI.
- d) V, IX e X.

34. Na eletrofisiologia da audição a atividade bioelétrica de latência curta, são as que ocorrem nos primeiros...e são representados pelo(s) seguintes locais.... Assinale a alternativa que completa corretamente a frase em questão.

- a) 1 a 5ms, nervo auditivo.
- b) 5 a 10ms, nervo auditivo e via talamocortical.
- c) 10 a 15ms, nervo auditivo e tronco encefálico.
- d) 15 a 80ms, tronco encefálico e via talamocortical.

35. A hipótese levantada por Lorenz para explicar o motivo do comprometimento do nervo laríngeo recorrente esquerdo ser mais comum é:

- a) Ao trajeto à esquerda ser mais longo.
- b) À aderência do nervo na croça da aorta.
- c) Ao nervo estar em contato íntimo com o esôfago.
- d) Ao nervo mergulhar no mediastino.

36. Paciente adolescente, masculino procura atendimento medico com queixa de obstrução nasal e epistaxes de repetição, por vezes graves. Deve-se suspeitar do seguinte tumor na nasofaringe:

- a) Carcinoma.
- b) Leiomioma.
- c) Angiofibroma.
- d) Papiloma invertido.

37. Segundo a escala de sonolência de Epworth, paciente com sonolência excessiva diurna tem obrigatoriamente seu valor excedendo:

- a) 10.
- b) 8.
- c) 6.
- d) 4.

38. Para o diagnóstico de lesões retrococleares com os traçados do BERA na orelha afetada evocados por estímulos cliques de 90dB NA de intensidade, são considerados sugestivos:

- I – Atraso da latência da onda V maior do que 0,1ms para cada 10dB de perda auditiva, quando comparada com a latência da onda V do ouvido contralateral.
 - II – Ausência somente de onda I e presença das subsequentes.
 - III – Qualquer atraso de latência da onda V maior do que 0,1ms, independente do nível da perda auditiva do ouvido comprometido.
- a) I está correta.
 - b) I e II estão corretas.
 - c) I e III estão corretas.
 - d) II está correta.

39. Qual das seguintes doenças pode estar relacionado com queixa de zumbido pulsátil unilateral:

- a) Mieloma múltiplo.
- b) Carcinoma epidermoide.
- c) Rabdomyosarcoma embrionário.
- d) Glomus jugular.

40. No tratamento da otosclerose o procedimento utilizado é:

- a) Labirintectomia.
- b) Estapedotomia.
- c) Maleocudopexia.
- d) Timpanoplastia.