



# CONCURSO PÚBLICO



## MÉDICO ENDOSCOPISTA

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
  - 02** Preencha os dados pessoais.
  - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
  - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
  - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
  - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
  - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
  - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
  - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
  - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
  - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

**Nome** \_\_\_\_\_

**Identidade** \_\_\_\_\_ **Órgão Exp.:** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_



**Fundação Apolônio Salles**  
de Desenvolvimento Educacional

## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:  
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: [www.coachingsp.wordpress.com](http://www.coachingsp.wordpress.com). Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
  - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
  - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
  - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
  - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

## História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
  - B) Escola Franciscana do Nordeste.
  - C) Barroco neoclássico.
  - D) Escola Barroca do Nordeste.
  - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
  - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
  - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
  - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
  - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

*O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.*

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
  - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
  - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
  - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
  - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
  - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
  - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
  - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
  - B) 4, apenas.
  - C) 2 e 3, apenas.
  - D) 1, 2 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
  - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
  - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
  - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
  - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
  - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
  - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
  - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
  - B) Conselho Estadual de Saúde.
  - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
  - D) Conferência Estadual de Saúde.
  - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
  - B) Atenção Primária em Saúde.
  - C) Vigilância Sanitária.
  - D) Vigilância Epidemiológica.
  - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
  - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
  - D) promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais.
  - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

## Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- |    | pH   | pCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55               | 26,8             |
| B) | 7,53 | 40               | 32,5             |
| C) | 7,40 | 40               | 24,9             |
| D) | 7,24 | 30               | 15,2             |
| E) | 7,53 | 25               | 20,2             |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
  - B) Pressão arterial.
  - C) Temperatura.
  - D) Hematócrito.
  - E) Creatinina sérica.

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

## Conhecimentos Específicos

26. São orientações e cuidados a serem observados em pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta, EXCETO:

- A) é necessário suspender o uso de aspirina ou anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) para realizar procedimento terapêutico, mesmo que não haja sangramento preexistente.
- B) o tempo mínimo de jejum recomendado deve ser de 2 horas para líquidos claros, de 6 horas para leite e de 8 horas para sólidos (ASA 1999).
- C) pacientes vítimas de traumatismo craniano, insuficiência renal e neuropatia diabética autonômica estão sujeitos a maior risco de broncoaspiração.
- D) de acordo com resolução do CFM (1.886/2008), não é permitido sedar pacientes em Unidade do tipo I (consultório médico independente de um hospital).
- E) indivíduos hospitalizados e com idade maior do que 70 anos têm risco aumentado de eventos cardiopulmonares inesperados em consequência da sedação.

27. A correta administração de pré-medicação e sedação é extremamente importante para conforto e segurança do paciente e qualidade do exame endoscópico. Em relação a isso, assinale a alternativa correta.

- A) A dose máxima de xilocaína tópica recomendada é de 0,8 a 0,9mg/Kg, e cada jato libera 10mg da substância.
- B) O flumazenil tem início de ação semelhante ao do midazolam, porém sua vida média é 2 a 3 vezes mais longa.
- C) A dose recomendada do midazolam é de 0,01 a 0,05mg/Kg de peso, e para início da ação deve-se aguardar de 1 a 3 minutos.
- D) O propofol promove aumento da atividade elétrica encefálica e, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de epilepsia.
- E) Todos os opióides, especialmente a meperidina, causam diminuição da frequência cardíaca e aumento paradoxal da atividade medular simpática.

- 28.** A respeito das esofagites por ingestão de agentes corrosivos, assinale a alternativa correta.
- A) O período mais indicado para iniciar as dilatações – quando indicadas – é a fase aguda (até o décimo dia após a ingestão).
  - B) Embora controversa, a avaliação endoscópica das lesões não deverá ser feita nas primeiras 6 horas, devido ao risco de perfuração.
  - C) A fase intermediária da esofagite corrosiva estende-se da 2ª à 3ª semana e é também chamada de “traíçoeira”, ou de cura aparente.
  - D) A cintilografia que utiliza sucralfato marcado com Tc-99 tem sido usada para avaliação de danos morfofuncionais esofágicos em crianças, com bons resultados.
  - E) A administração oral de substâncias neutralizantes do agente corrosivo está indicada nas primeiras 24 horas, mas apenas nos casos leves e moderados.
- 29.** A ingestão de corpos estranhos é uma emergência frequente na atividade do médico endoscopista. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.
- A) No estômago pode-se aguardar até sete dias, a depender do tipo de corpo estranho deglutido.
  - B) No duodeno, em geral, só é necessário remover corpos estranhos com dimensões maiores ou iguais a 4,0cm.
  - C) Os corpos estranhos esofágicos devem ser retirados nas primeiras 24 horas, na maioria dos casos, observando-se o jejum habitual.
  - D) Os corpos estranhos contendo substâncias entorpecentes (cocaína, por exemplo) têm indicação precisa de remoção por via endoscópica.
  - E) Corpos estranhos localizados nos cólons, deglutidos, são frequentemente mobilizados apenas com o preparo para colonoscopia.
- 30.** Com relação à intervenção endoscópica nas vias biliares, é correto afirmar que:
- A) as próteses plásticas de 7Fr são as mais indicadas em todos os casos, pois têm maior tempo de patência.
  - B) pacientes jovens com suspeita de disfunção do esfíncter de Oddi têm uma incidência maior de sangramento pós-papilotomia.
  - C) nos casos de insucesso no clareamento das vias biliares, indica-se o dreno nasobiliar, por ter melhores resultados do que as próteses.
  - D) para colocação de próteses plásticas nem sempre a papilotomia é essencial, exceto quando é necessário o posicionamento de duas ou mais.
  - E) no posicionamento das próteses metálicas biliares para palição de tumores, a esfínterotomia e dilatação da massa são fundamentais.
- 31.** As mucosectomias endoscópicas têm atualmente grande número de indicações. Qual das proposições abaixo é correta com relação à técnica e indicações?
- A) Lesões gástricas dos tipos IIb e IIc com até 20mm e displasia de alto grau devem ser ressecadas.
  - B) Apenas as lesões esofágicas tipo IIa e IIc com menos de 10mm e comprometendo até 2/3 da circunferência podem ser removidas.
  - C) A técnica de elevação e corte difere da de sucção e corte porque naquela não é necessário realizar marcação das margens.
  - D) A incidência de recidiva local pós-mucosectomia aumenta em até 40% se a lesão for retirada com margem menor do que 3mm.
  - E) Adenocarcinomas bem diferenciados dos cólons, tipos IIa, IIb, IIc ou os tumores de crescimento lateral (LST) podem ser excisados com segurança.
- 32.** Segundo a Classificação da Sociedade Japonesa para estudo da Hipertensão Portal, as varizes esofágicas têm características que se correlacionam com o risco de sangramento, EXCETO:
- A) grosso calibre.
  - B) coloração azulada.
  - C) erosões nas superfícies venosas.
  - D) presença de manchas “cor de cereja”.
  - E) vermelhidão difusa na mucosa dos cordões varicosos.
- 33.** Segundo o Projeto Diretrizes (AMB/CFM/2003), as biopsias esofágicas de rotina não estão indicadas em qual situação?
- A) Presença de estenose distal.
  - B) Fase aguda da esofagite erosiva, sem estenose ou úlcera.
  - C) Presença de úlcera em atividade.
  - D) Área de reepitelização avermelhada menor do que 2,0cm de extensão.
  - E) Área de reepitelização avermelhada com 2,0cm ou mais acima das pregas gástricas.
- 34.** A endoscopia digestiva constitui-se, entre nós, num dos principais instrumentos para diagnóstico da infecção pelo *H. pylori*. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.
- A) Deve ser retirado um número mínimo de 8 fragmentos no primeiro exame.
  - B) As biopsias do antro são as mais importantes para o controle do tratamento.
  - C) A retirada de fragmentos da “incisura angularis” deve ser evitada.
  - D) O controle de erradicação deve ser feito entre 6 a 8 semanas após o final do tratamento.
  - E) O uso de inibidores de bomba deve ser suspenso com 24 horas de antecedência da realização das biopsias.

- 35.** Com relação às complicações decorrentes das colangiopancreatografias endoscópicas retrógradas (CPER), é correto afirmar que:
- A) níveis sanguíneos elevados das bilirrubinas e pacientes do sexo masculino são fatores de risco para pancreatite.
  - B) idade avançada, tempo prolongado de procedimento e tamanho da incisão da esfínterectomia são fatores de risco para sangramento.
  - C) as perfurações retroperitoneais secundárias à manipulação por fio-guias e cateteres são as mais frequentes.
  - D) a utilização de pedinosona e alopurinol previamente à CPER previne as colangites pós-esfínterectomia.
  - E) A colocação de prótese pancreática é altamente recomendável para prevenção de pancreatites pós-CPER.
- 36.** Com relação ao tratamento endoscópico da hemorragia por ruptura de varizes esôfago-gástricas, é correto afirmar que:
- A) a ligadura elástica apresenta maior número de recidivas do que a escleroterapia.
  - B) a escleroterapia com oleato de etanolamina acarreta menor incidência de complicações, do que a ligadura elástica.
  - C) a associação de ligadura elástica com escleroterapia deve ser recomendada nos casos em que se desejam resultados mais rápidos.
  - D) A ligadura elástica das varizes esofágicas pode agravar a situação (calibre e congestão) das varizes de fórnix, quando presentes.
  - E) a injeção de cianoacrilato nas varizes esofágicas substitui com vantagens a ligadura elástica em portadores de cirrose hepática.
- 37.** Qual dos fatores abaixo listados não representa fator de risco associado à colopatia isquêmica?
- A) Sexo feminino.
  - B) Choque hipovolêmico.
  - C) Idade maior do que 65 anos.
  - D) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
  - E) Doença arteriosclerótica coronariana.
- 38.** O escore de Rockall é utilizado como tentativa de estratificar o risco de ressangramento e prognóstico de hemorragia por lesões do trato gastrointestinal superior. Sobre esse escore, assinale a alternativa correta.
- A) Presença de insuficiência renal equivale a 2 pontos.
  - B) As lacerações de Mallory Weiss equivalem a 1 ponto.
  - C) O escore não contempla o aspecto endoscópico das lesões.
  - D) Pacientes com escore igual a 4 são considerados de baixo risco.
  - E) Escore igual a 8 representa risco de ressangramento em mais da metade dos casos.
- 39.** A hemorragia digestiva baixa (HDB) é menos frequente, porém oferece maiores dificuldades propedêuticas e terapêuticas do que a hemorragia digestiva alta. Sobre a HDB, assinale a alternativa correta.
- A) Tem resolução espontânea em cerca de 1/3 dos casos.
  - B) A cápsula endoscópica tem indicação nos casos de HDB aguda e intensa.
  - C) As ectasias vasculares e hemorróidas são as causas mais frequentes em jovens.
  - D) O diagnóstico arteriográfico independe da atividade do sangramento.
  - E) A cintilografia nuclear pode detectar sangramento com vazão de 0,1ml/min.
- 40.** A indicação ou o momento mais apropriado para intervenção endoscópica nos casos de pancreatite aguda biliar permanece alvo de controvérsias. Qual das complicações abaixo não é relatada como consequência do tratamento endoscópico naqueles casos?
- A) Colecistite.
  - B) Osteíte lombar.
  - C) Colangite aguda.
  - D) Insuficiência cardíaca.
  - E) Agravamento da pancreatite.
- 41.** Os exames colonoscópicos são atualmente de grande auxílio para o diagnóstico e a terapêutica das obstruções intestinais. Sobre esses exames, assinale a alternativa incorreta.
- A) Se há sinais de peritonismo, o exame não é indicado.
  - B) O preparo dos cólons é contraindicado na maioria dos casos.
  - C) Na síndrome de Ogilvie está indicado posicionar sonda (Levine), que deve ser mantida por até 3 dias.
  - D) Nos vólculos secundários à doença de Chagas, os resultados costumam ser satisfatórios.
  - E) A cecostomia endoscópica percutânea é uma alternativa segura se há falha no tratamento endoscópico.
- 42.** Qual das condições abaixo relacionadas não é referida como diagnóstico diferencial endoscópico com a Doença Celíaca?
- A) Giardíase.
  - B) Doença de Crohn.
  - C) Intolerância alimentar.
  - D) Supercrescimento bacteriano.
  - E) Doença Imunoproliferativa do Intestino Delgado.

43. Com relação aos tumores subepiteliais gastroduodenais, é correto afirmar que:

- A) o pâncreas ectópico pode ocorrer em qualquer segmento do tubo digestivo e tem potencial de malignidade quando se encontra nos cólons.
- B) os tumores estromais gastrointestinais (GISTs) têm risco alto de malignidade quando atingem 2,0cm de diâmetro.
- C) a hiperplasia das glândulas de Brünner pode evoluir para adenoma e, mais raramente, para adenocarcinoma.
- D) os lipomas são os tumores submucosos mais comuns no duodeno.
- E) os Schwannomas são tumores raros, sem potencial de malignidade e com marcador imunológico cKit positivo.

44. As doenças inflamatórias intestinais são um fator de risco para desenvolvimento do carcinoma colorretal. Qual das alternativas está incorreta com respeito à vigilância endoscópica nesses casos?

- A) Recomenda-se, nos casos de colite extensa, retirada de 32 fragmentos – sendo 4 a cada 10cm, do ceco ao reto.
- B) Área de mucosa plana com displasia de alto grau ou de baixo grau, porém multifocal, é indicação para colectomia.
- C) Os pacientes portadores de doença extensa deverão ser submetidos a colonoscopias anuais ou bienais, após 8 a 10 anos do diagnóstico.
- D) No envolvimento menos extenso dos cólons, as biopsias podem ficar restritas a áreas com comprovação histológica prévia de envolvimento.
- E) Lesões elevadas com displasia de qualquer grau, mesmo que localizadas em área de mucosa não inflamada, são indicações para colectomia.

45. A cromoscopia pode trazer informações adicionais importantes ao médico endoscopista quando adequadamente utilizada. Qual das substâncias abaixo não está corretamente indicada à proposta diagnóstica?

- A) Lugol a 1% a 5% pode identificar áreas de mucosa gástrica heterotópica no esôfago.
- B) Azul de metileno é útil para delimitar áreas de metaplasia intestinal, que absorvem o corante.
- C) O índigo carmim funciona apenas como agente de contraste e é usado no estômago para avaliar morfologia de lesões.
- D) Derivados da violeta de genciana são corantes vitais e têm grande utilidade para identificar lesões colônicas.
- E) O vermelho congo reage com a urease produzida pelo *H. pylori* e auxilia na identificação de áreas infectadas no estômago.

46. Qual das descrições corresponde corretamente ao grau das Classificações para esofagite por refluxo?

- A) Grau 2 de Savary-Miller Modificada – erosões confluentes que se estendem por toda a circunferência.
- B) Grau D de Los Angeles – soluções de continuidade envolvendo pelo menos 75% da circunferência.
- C) Grau 5 de Savary-Miller Modificada – presença de úlceras e estenoses, isoladas ou associadas a erosões.
- D) Grau A de Los Angeles – uma ou mais soluções de continuidade com mais de 5mm que não se estende entre duas pregas longitudinais.
- E) Grau B de Los Angeles – soluções de continuidade que são contínuas entre duas pregas, envolvendo menos do que 75% da circunferência.

47. Com relação ao carcinoma colorretal, assinale a alternativa correta.

- A) A sequência adenoma-carcinoma tem período estimado em 15 anos para se completar em pólipos menores do que 1cm.
- B) O adenoma serrátil é uma lesão benigna que não tem qualquer potencial de malignização.
- C) Menos de 1/3 dos carcinomas colorretais são ditos esporádicos, ou seja, não têm fator de risco conhecido.
- D) É denominado carcinoma “de novo” um tipo de lesão que parece não seguir a sequência adenoma-carcinoma.
- E) Dieta rica em fibras, vitamina C e antioxidantes são comprovadamente fatores de proteção contra o carcinoma colorretal.

48. Em relação à polipectomia dos cólons, é incorreto afirmar que:

- A) quando a polipectomia não foi adequada, é recomendável repetir a intervenção em período de 3 a 4 semanas.
- B) a antibioticoterapia profilática é fortemente recomendada para todos os pacientes com história prévia de endocardite.
- C) a exérese com alça a frio oferece menos risco e material de melhor qualidade para histopatológico do que o fórceps de “hot biopsy”.
- D) as alças monofilamentares não permitem tração tão forte quanto as multifilamentares, mas cortam mais profundamente.
- E) os tumores de crescimento lateral (LST) podem ser ressecados com segurança, pois caracteristicamente têm pouco poder de invasão vertical.

**49.** Os tumores malignos do hilo hepático são divididos conforme a extensão e o grau de comprometimento hilar, segundo a Classificação de Bismuth-Corlette. Qual das alternativas não corresponde à descrição?

- A) Tipo I: acometimento do ducto hepático comum, sem atingir a bifurcação.
- B) Tipo II: acometimento do ducto hepático comum, atingindo a bifurcação.
- C) Tipo III: acometimento do ducto hepático comum, atingindo o ducto hepático direito ou esquerdo.
- D) Tipo IV: acometimento do ducto hepático comum, atingindo ambos os ductos intra-hepáticos.
- E) Tipo V: acometimento do ducto hepático comum, atingindo difusamente os ductos intra-hepáticos.

**50.** O Artigo 11, inciso IV, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem como objetivo fixar requisitos mínimos exigidos para Serviços de Endoscopia Digestiva e Respiratória. Qual das alternativas abaixo não faz parte desse Artigo?

- A) O equipamento utilizado deve permitir que a imagem por ele captada seja clara, limpa e sem manchas.
- B) Endoscopias complexas são definidas como aquelas que necessitam de sedação com a presença de médico anestesista.
- C) A vacinação contra o vírus B da hepatite é obrigatória para toda equipe de saúde e para o pessoal envolvido na limpeza.
- D) Após a realização do procedimento, o cliente deve receber instruções por escrito de como proceder antes de retornar às suas atividades normais.
- E) Os aparelhos devem passar por rigorosa limpeza mecânica dos canais, imersão em solução enzimática e a seguir em glutaraldeído a 20%, por trinta minutos.