



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**EDITAL 082/2013 - GPQS/DGTES/AMS**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO**  
**DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA**  
**NA FUNÇÃO DE SERVICO DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**  
**PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013**

Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

- 1) Pacientes idosos são mais sensíveis aos efeitos de substâncias sedativo-hipnóticas, devido a:**
  - a) Alterações farmacodinâmicas que acompanham o processo de envelhecimento.
  - b) Menor velocidade de metabolização hepática de substâncias lipossolúveis.
  - c) Redução da função renal.
  - d) Variações na ligação a proteínas plasmáticas.
  - e) Maior distribuição dessas substâncias para o tecido adiposo.
  
- 2) Sobre o abuso do álcool e a dependência alcoólica, é INCORRETO afirmar que:**
  - a) O álcool funciona como um depressor do sistema nervoso central, à maneira dos barbitúricos.
  - b) O sinal clássico da abstinência é representado pelos tremores que se desenvolvem entre 6 (seis) e 8 (oito) horas após a interrupção do consumo.
  - c) A síndrome do alcoolismo fetal é caracterizada, principalmente, por macrocefalia e fibrose hepática.
  - d) Contrastando com a maioria das substâncias de abuso, nenhum receptor cerebral específico foi identificado para o álcool.
  - e) O álcool afeta a arquitetura do sono, estando associados com a diminuição do sono REM.
  
- 3) Você e a sua equipe do SAV-SAMU 192 foram acionadas para um atendimento a domicílio. Chegando à residência depara com um jovem com intoxicação aguda pela cocaína. Segundo sua mãe vem sofrendo com esta situação há mais de dois anos. Em relação à cocaína é incorreto afirmar:**
  - a) O tratamento da overdose de cocaína deve ser visto como uma emergência clínica.
  - b) Clinicamente, encontramos hipotensão arterial, bradicardia e arritmias cardíacas.
  - c) Clinicamente, são evidentes hipertensão arterial, taquicardia e arritmias cardíacas.
  - d) Podem ocorrer convulsões do tipo tônico-clônicas.
  - e) A vítima da intoxicação aguda deverá ser internada em Unidade de Terapia Intensiva para monitoramento.
  
- 4) As serpentes da família Elapidae, serpentes terrestres do gênero Micrurus, são encontradas em todos os continentes, com exceção da Europa. O acidente elapídico é raro em nosso meio, havendo poucos relatos clínicos na literatura. Responda a afirmativa correta baseado no texto acima:**
  - a) A cobra jararaca faz parte da família Elapidae.

- b) Seu veneno tem elevada toxicidade, causam paralisia flácida e, em geral, morte por insuficiência respiratória aguda.
- c) Seu veneno tem elevada ação proteolítica, pode levar a um estado de incoagulabilidade sanguínea.
- d) Seu veneno provoca hemorragias, fatores que parecem ser responsáveis por sangramento à distância.
- e) Ocupam terras secas e ligeiramente elevadas e predominas em plantações ricas em pequenos roedores dos quais se alimentam.

**5) Em relação à Taquicardia Sinusal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) É uma resposta fisiológica ao exercício físico e ao estresse emocional.
- b) Pode ocorrer como resposta compensatória em uma hipovolemia, febre, sepse, embolia pulmonar.
- c) No eletrocardiograma (ECG), a taquicardia sinusal é definida por uma frequência acima de 100bpm, com ondas P idênticas às do ritmo sinusal normal.
- d) Drogas estimulantes, como a cocaína e a anfetamina, também são causas de taquicardia sinusal.
- e) Taquicardia sinusal manifesta-se com ondas P diferentes, com uma frequência entre 100-250bpm.

**6) Você e sua equipe do SAMU chegam para atender uma paciente vítima de acidente automobilístico. Ela encontra-se em coma, com abertura ocular somente ao estímulo doloroso, gemente. Ao estímulo doloroso flexiona os membros superiores, ventilando irregularmente. Assinale a alternativa que indique a sequência correta e o valor da escala de coma de Glasgow.**

- a) 2 – 1 – 5 = 8
- b) 3 – 1 – 2 = 6
- c) 3 – 2 – 4 = 9
- d) 2 – 2 – 3 = 7
- e) 3 – 3 – 4 = 10

**7) O choque decorre geralmente do débito cardíaco inadequado. Por esta razão, qualquer fator que reduza o débito cardíaco pode levar ao choque circulatório. Baseado nesse enunciado, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta**

- I. O choque circulatório que decorre da diminuição da capacidade de bombeamento do coração é denominado choque cardiogênico.
- II. No choque irreversível, as transfusões sanguíneas ou qualquer outro tipo de terapia tornam-se incapazes de salvar a vida da pessoa.
- III. No choque hipovolêmico pela perda de plasma, tem como complicador o aumento da viscosidade sanguínea, tornando lento o fluxo sanguíneo.
- IV. Choque endotóxico é um tipo especial de choque anafilático.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas

- 8) **Você chega com a sua equipe do SAMU 192 - SAV no local da ocorrência para atender um rapaz que sofreu acidente automobilístico, estando ele acompanhado de um carona. O carro foi atingido à esquerda e o motorista faleceu no local. O carona tem 30 anos de idade e está alcoolizado. Você realiza um acesso venoso e infunde 2.000 ml de Ringer lactado, conforme orientação do médico. O rapaz está sonolento e apresenta escoriações em flanco, distensão abdominal e dispnéia. Sua PA é de 70x40 mmHg, FC de 130 bpm, FR de 34 irpm. Durante a avaliação neurológica, o paciente é classificado como Glasgow 8, por apresentar as seguintes evidências:**
- a) Abre os olhos quando solicitado, os sons são incompreensíveis, localiza a dor no abdome.
  - b) Abre os olhos quando sente dor, as palavras são desconexas, tem flexão anormal dos membros.
  - c) Não abre os olhos, não fala, retira o braço quando sente dor.
  - d) Abre os olhos espontaneamente, está confuso quanto ao acidente, obedece à solicitação totalmente.
  - e) Abre os olhos quando sente dor, as palavras são ininteligíveis e flexiona os membros superiores quando estimulado a dor.
- 9) **O pneumotórax hipertensivo pode ser decorrente tanto do trauma torácico fechado quanto aberto. O pneumotórax hipertensivo provoca choque devido:**
- a) À compressão do ventrículo esquerdo.
  - b) Ao desvio da traquéia.
  - c) Ao colapso do pulmão ipsilateral.
  - d) Ao desvio do mediastino.
  - e) À distensão das veias do pescoço.
- 10) **Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, foi vítima de queimaduras por fogo, durante incêndio em sua residência. Ao ser atendido pelo SAMU 192-SAV foram constatadas inúmeras lesões exsudativas, eritematosas e muito dolorosas e várias flictenas, distribuídas na cabeça e no pescoço, em toda a parte anterior do tronco e no membro superior direito. Em relação ao caso é correto afirmar, EXCETO:**
- a) A administração endovenosa de opióides constitui boa opção no controle da dor e deve ser providenciado tão logo o paciente seja atendido.
  - b) Nas lesões dos pulmões por inalação de fumaça, tem como uma das evidências, níveis elevados de carbohemoglobina no sangue.
  - c) As lesões descritas ocorrem classicamente em queimaduras de 2º grau, quando ocorre destruição total da epiderme e parcial da derme.
  - d) O paciente apresenta queimaduras em aproximadamente 36% da superfície e pode ser considerado um grande queimado.
  - e) Na reposição volêmica a solução de escolha é Ringer lactato nas primeiras 24 horas.
- 11) **Paciente de 50 anos de idade, 70Kg, apresentando queimaduras em tronco, membro superior direito e membro inferior direito, dá entrada no pronto socorro. A reposição volêmica inicial, segundo a fórmula de Parkland, seria:**
- a) Soro fisiológico 13.230 ml, sendo 6.615 ml nas primeiras 8h e o restante nas 16 horas subsequentes.
  - b) Soro fisiológico 12.600 ml, sendo 6.300 ml nas primeiras 8h e o restante nas 16 horas subsequentes.
  - c) Ringer lactato 17.640 ml, sendo 8.820 ml nas primeiras 8h e o restante nas 16 horas subsequentes.
  - d) Ringer lactato 12.600 ml, sendo 6.300 ml nas primeiras 8h e o restante nas 16 horas subsequentes.
  - e) Ringer lactato 6.615 ml, durante as 24h, associado ao uso de albumina 20% - 50 ml a cada 6 horas.

**12) No tratamento do choque hemorrágico secundário à trauma grave, o melhor sinal de restauração hemodinâmica bem sucedida é:**

- a) Aumento da pressão arterial sistólica acima de 100 mmHg.
- b) Diminuição da frequência cardíaca para menos de 120bpm.
- c) Diminuição da pressão de pulso.
- d) Normalização do débito urinário.
- e) Melhora do nível de consciência.

**13) Com relação a queimaduras provocadas por agentes químicos, é correto afirmar que:**

- a) As queimaduras por ácido são mais graves do que as causadas por álcalis e derivados de petróleo.
- b) As queimaduras por ácidos podem ser tratadas através da aplicação de soluções básicas fracas.
- c) As queimaduras causadas por álcalis necessitam de irrigação com água por tempo maior.
- d) Todos os pacientes vítimas de queimaduras químicas devem imediatamente ser encaminhados para um Centro de Queimados.
- e) As queimaduras causadas por álcalis não devem ser irrigadas com água, pois aprofundam a queimadura, piorando a condição do paciente.

**14) Um rapaz de 25 anos recebeu um tiro em fossa ilíaca direita e chega ao pronto socorro com pulso de 125 bpm, pressão arterial sistólica de 80 mmHg, FR de 32 irpm, em confusão mental. Recebeu sonda vesical de demora e está apresentando débito urinário de 10ml/h. De acordo com a classificação de hemorragia, sua perda estimada de sangue deve ser de:**

- a) < 750 ml – menor que 15% – Classe I.
- b) 750 – 1.500 ml – 15% a 30% – Classe II.
- c) 750 – 1.500 ml – 30% a 40% – Classe III.
- d) 1.500 – 2.000 ml – 30% a 40% – Classe III.
- e) > 2.000 ml – >40% – Classe IV.

**15) A mulher grávida pode necessitar de atendimento de suporte avançado pelo SAMU por dois motivos principais: primeiro, alguns estados de doença são próprios da gravidez, tais como a eclampsia; segundo, outras doenças graves que não são próprias da gravidez, tais como doenças cardíacas e trauma, podem ser precipitadas ou agravadas pela gravidez, e podem ter manifestações diferentes durante a gravidez.**

**Em relação ao enunciado acima, analise as assertivas a seguir.**

- I. O volume de sangue aumenta a cada trimestre no curso da gravidez.
- II. O débito cardíaco aumenta em 30% a 50% durante uma gravidez normal.
- III. Ocorre um aumento no volume corrente de aproximadamente 40% e uma diminuição na capacidade residual funcional (FRC) em 25%.
- IV. A pré-eclâmpsia é considerada grave na presença de PA de repouso sistólica  $\geq 90$  mmHg ou diastólica  $>100$  mmHg.
- V. A eclâmpsia usualmente pode ocorrer antes da 20ª semana de gestação ou depois de 48 horas pós-parto.

**É correto afirmar, EXCETO:**

- a) A afirmativa III está correta.
- b) As afirmativas III e IV estão corretas.
- c) As afirmativas III e V estão corretas.
- d) As afirmativas IV e V estão corretas.
- e) As afirmativas III, IV e V estão corretas.

**16) Criança de 5 anos de idade chegou ao Pronto Socorro, vítima de incêndio em recinto fechado, apresentando queimaduras em face, pescoço e membros superiores. Ao exame físico constatou-se dificuldade respiratória. Nesse caso, o quadro respiratório é decorrente de:**

- a) Lesão por aspiração de monóxido de carbono.
- b) Queimaduras térmicas de vias aéreas.
- c) Queimadura química e térmica das vias aéreas.
- d) Queimadura química das vias aéreas.
- e) Baixa perfusão pulmonar consequente ao aumento da viscosidade sanguínea provocada pela desidratação.

**17) A maioria dos pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda (IRA), requer oxigênio suplementar que pode ser fornecido por vários dispositivos. A eficiência de cada um é determinada pela capacidade do aparelho liberar oxigênio suficiente a uma velocidade de fluxo suficientemente alta para compatibilizar-se com a velocidade de fluxo inspiratório espontâneo do paciente. Segundo o enunciado acima, assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta.**

- a) Um cateter nasal é considerado um dispositivo de alto fluxo e baixa taxa de frações inspiradas de oxigênio (FiO<sub>2</sub>).
- b) Uma máscara de “Venturi” pode ser ajustada para fornecer frações inspiradas de oxigênio de 21 a 100%.
- c) Quando em uso de uma máscara facial nebulizadora, é desejável que se ajuste o fluxo de oxigênio de modo a se perceber completo desaparecimento da “nuvem” de aerossol durante a inspiração.
- d) As FiO<sub>2</sub> fornecidas por um cateter nasal não costumam exceder 40 -50% mesmo sob altos fluxos.
- e) A máscara facial com reservatório é considerada um aparelho de oxigênio alto e fluxo baixo de oxigênio.

**18) A utilização de marcapasso cardíaco transcutâneo temporário pode promover algumas complicações. Assinale a alternativa que contenha uma delas.**

- a) Convulsões.
- b) Falha de captura em aproximadamente 20% dos pacientes.
- c) Paralisia de musculatura estriada esquelética.
- d) Conversão em fibrilação ventricular.
- e) Fraturas.

**19) Leia as assertivas a seguir e indique V, para as verdadeiras, e F, para as falsas.**

- (     ) Na vítima de trauma com abdome rígido em tábua à palpação é sinal de peritonite instalado, sendo mandatória a exploração cirúrgica.
- (     ) Tríade diagnóstica de Beck refere-se pressão intracraniana aumentada (PIC).
- (     ) Com o envelhecimento o miocárdio se torna menos sensível às catecolaminas exógenas e endógenas.
- (     ) A queimadura grave leva a hemoconcentração resultando em circulação lenta que leva à formação de trombos.
- (     ) Na hipotermia leve ocorre aumento da frequência de pulso e débito cardíaco devido à estimulação do parassimpático.
- (     ) Cuidados ao manusear o paciente hipotérmico grave, é importante para não desencadear Fibrilação Ventricular (FV).
- (     ) Dor desproporcional e que piora no estiramento passivo dos músculos são um dos sinais da rabdomiólise.

**Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo:**

- a) V F V V F F F
- b) V V F F F F F
- c) V F V V F V F
- d) F F F V V V V
- e) V F V V F F V

**20) A parada cardiopulmonar em lactentes e crianças, raramente é um evento súbito. Pelo contrário, geralmente é resultado final da deterioração progressiva da função respiratória e circulatória. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa que contenha a afirmativa INCORRETA.**

- a) A frequência respiratória normal apresenta relação inversa à idade: é rápida no recém-nascido, decrescendo no lactente mais velho e na criança.
- b) O aumento do esforço respiratório frequentemente produz batimento de asa do nariz e retração inspiratória intercostal, subcostal e supraesternal. Esses podem ser sinais de obstrução de vias aéreas ou doenças alveolares.
- c) Lactentes ou crianças emitem gemido com a finalidade de aumentar a pressão nas vias aéreas, preservando ou aumentando a capacidade residual funcional.
- d) Estridor e som respiratório áspero é sinal de obstrução da via aérea superior.
- e) Frequência respiratória normal em crianças pequenas, de 1 (um) a 3 (três) anos, é de 30 a 60 irpm.

**21) Em uma ocorrência em via pública, você está atendendo uma criança de 5 anos de idade, vítima de queda de bicicleta. Ao exame, a criança encontra-se um pouco confusa, agitada e chorosa, com escoriações em couro cabeludo, FC de 120 bpm, FR de 33 irpm, sem retração, PA de 95X70 mmHg, sem outras lesões aparentes. Escala de coma de Glasgow é 14. Em relação à avaliação primária dessa criança, é INCORRETO afirmar.**

- a) A frequência respiratória no “B”, nessa faixa etária está dentro da normalidade.
- b) A FC de 120 bpm indica provável choque hipovolêmico e vai ser necessário volume para essa criança.
- c) Deve ser oferecido oxigênio sob máscara simples 12l/minuto.
- d) A permeabilidade da via aérea deve ser mantida associada, com a estabilização da coluna cervical.
- e) Na avaliação do “C” (circulação) a FC de 120 bpm está normal para a sua idade.

**22) Um homem de 40 anos de idade envolvido em uma colisão contra uma árvore chega ao pronto-socorro com pressão arterial sistólica de 120mmHg, pulso de 110bpm, escoriações sobre o esterno extra-sístoles ventriculares no eletrocardiograma (ECG). Analise as assertivas a seguir.**

- I. Monitorização de seu ECG deve ser feito nas primeiras 24 horas.
- II. Tratamento deve incluir correção de acidose, hipoxemia e/ou qualquer outro distúrbio eletrolítico.
- III. A dosagem das enzimas cardíacas (troponinas) dá o diagnóstico conclusivo de contusão miocárdica.
- IV. Provavelmente trata-se de um tamponamento cardíaco.

**Assinale a alternativa que contenha a avaliação e o tratamento adequado.**

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- e) Somente a afirmativa IV está correta.

**23) Um rapaz de 23 anos, durante o campeonato de karatê, recebeu um forte golpe no tórax. Está com muita dor no peito, no local do golpe, e com dificuldade de respirar. O médico que está dando atendimento suspeita de contusão pulmonar. Qual dos seguintes mecanismos fisiológicos primário faz aumentar a frequência respiratória?**

- a) Nível diminuído de oxigênio.
- b) Nível elevado de oxigênio.
- c) Nível diminuído de dióxido de carbono.
- d) Nível elevado de dióxido de carbono.
- e) Nível elevado de monóxido de carbono.

**24) Um senhor de 40 anos de idade sofreu um acidente automobilístico e encontra-se dispnéico e com movimento paradoxal do tórax. Baseado nesse quadro clínico, provavelmente se trata de:**

- a) Hemotórax maciço.
- b) Um grande pneumotórax.
- c) Tórax flutuante.
- d) Tamponamento pericárdico.
- e) Ferida torácica aspirativa.

**25) Um paciente jovem, vítima de acidente automobilístico, com suspeita de trauma abdominal fechado, aproximadamente 70 kg, apresenta-se taquicárdico (110bpm), taquipnéico (30irpm), com pressão arterial 110X80 mmHg.**

**Encontra-se ansioso, inquieto, informando bem. Estava pálido, com dor abdominal discreta e leve defesa à palpação. Sua perda sanguínea está estimada entre 20 a 30%. Assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta.**

- a) Refere-se à classe I de choque hemorrágico.
- b) Refere-se à classe II de choque hemorrágico.
- c) Refere-se à classe III de choque hemorrágico.
- d) Refere-se à classe IV de choque hemorrágico.
- e) Refere-se à classe V de choque hemorrágico.

**26) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. De acordo com a Constituição Federal promulgada em 1988, analise as afirmativas a seguir:**

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- IV. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

- V. Não compete ao Sistema Único de Saúde: participar da produção de medicamentos, equipamentos, hemoderivados e outros insumos; ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaborar na proteção do meio ambiente.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.

**27) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS):**

- a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- c) A execução de ações como as de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.
- d) A manutenção do sigilo das informações de saúde obtidas por meio das notificações.
- e) A participação na execução de ações de saneamento básico.

**28) A Lei Complementar nº 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Com base na Lei Complementar nº 141, analise as afirmativas a seguir:**

- I. Os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- II. Os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% (dez) da arrecadação dos impostos.
- III. Os Estados aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 23% (vinte e três) da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.
- IV. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente a 10% (dez) da arrecadação dos impostos.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa I é correta.
- b) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.



**29) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale V, para a (s) verdadeira (s) e F, para a (s) falsa (s).**

- ( ) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- ( ) Valorizar e otimizar os serviços especializados de saúde, os espaços de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- ( ) Aumentar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, entre outras).
- ( ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- ( ) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na média e alta complexidade.

**Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.**

- a) F F V V V
- b) V F V V F
- c) V V F V F
- d) V V V V F
- e) V F V F F

**30) Julgue as afirmativas a seguir acerca do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.**

- I. Este decreto regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da Rede de Atenção Básica, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- II. Este decreto define Região de Saúde como espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- III. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- IV. Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde distribuídos em níveis de complexidade crescente, em forma piramidal, sendo que a atenção básica fica na base da pirâmide e acima os níveis secundário e terciário respectivamente.
- V. São portas de entrada aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: de atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e V são corretas.
- c) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.

**31) Segundo a NOB-93, além das atribuições já definidas na lei de sua criação, NÃO compete ao Conselho Municipal de Saúde:**

- a) Deliberar sobre o Plano Municipal de Saúde.
- b) Fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Saúde.
- c) Aprovar critérios de programação ambulatorial e hospitalar.
- d) Aprovar a programação físico-orçamentária.
- e) Representar o segmento a que pertencem, exercendo atividades consideradas de relevância pública, gerando a estes o direito a remuneração.

**32) No que se diz respeito à participação social no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) A Constituição de 1988 incorporou as principais propostas da VIII Conferência, criando o Sistema Único Saúde (SUS).
- b) A participação da comunidade está prevista em lei, portanto representam os canais legais de controle social, garantindo a presença de representantes da população organizada nos processos de gestão da política de saúde.
- c) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo.
- d) As Conferências de Saúde devem se reunir em cada nível de governo, em espaço de tempos não superiores a 2 (dois) anos, com representantes dos vários segmentos sociais.
- e) Os conselhos de saúde devem controlar e fiscalizar a execução da política de saúde em sua esfera governamental, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

**33) Com relação ao Núcleo de Educação em Urgência (NEU), incluso no Capítulo VII da Portaria Ministerial nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta.**

- a) Tem como princípios norteadores a organicidade com o processo de formulação de políticas públicas para a atenção integral às urgências, buscando organizar o sistema regional de atenção às urgências a partir da qualificação assistencial com equidade.
- b) Busca a transformação da realidade e seus determinantes, fundamentada na educação no processamento de situações-problemas, extraídas do espaço de trabalho e do campo social.
- c) Os objetivos do NEU constituem-se em núcleos de excelência regional, estadual e nacional, para a formação de profissionais de saúde a serem inseridos na atenção às urgências.
- d) Elaborar, implantar e implementar uma política pública, buscando construir um padrão nacional de qualidade de recursos humanos, instrumentalizada a partir de uma rede de núcleos regionais, os quais articulados entre si poderão incorporar paulatinamente critérios de atenção e profissionalização às urgências.
- e) Capacitar os recursos humanos envolvidos somente no Atendimento Pré-hospitalar Móvel e Atendimento Pré-hospitalar Fixo, promovendo programas de formação e educação continuada na forma de treinamento em serviço.

**34) Segundo a Portaria Ministerial nº 2.048/GM, são atribuições gestoras da Regulação Médica das Urgências:**

- a) Garantir, junto ao gestor competente, o pagamento aos prestadores de serviço de todos os pacientes encaminhados para central.
- b) Utilizar o conceito “vaga zero”, definido no Capítulo II deste Regulamento também nos casos de regulações inter-hospitalares, quando a avaliação do estado clínico do paciente e da disponibilidade de recursos loco-regionais o tornem imperativo.
- c) Garantir os recursos assistenciais dos procedimentos eletivos, para que estes não venham a sobrecarregar as portas de urgências posteriormente.
- d) Refazer os pactos durante o seu plantão, de acordo com a necessidade de cada instituição.

e) Encaminhar o paciente a uma unidade de saúde, sem contato prévio, independente da disponibilidade de recursos, utilizando o conceito de “vaga zero”.

**35) Com relação à Política Nacional de Atenção às Urgências, instituída pela Portaria 1.863/2003, é correto afirmar que:**

- a) Ela foi organizada de forma a permitir, em âmbito estadual, regional e municipal, o desenvolvimento de estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades.
- b) Ela dispõe que a despesa do custeio seja de responsabilidade compartilhada entre Estado e Município.
- c) Ela dispõe sobre a responsabilização da atenção primária no acolhimento/atendimento das urgências de baixa gravidade.
- d) Todas as alternativas estão corretas.
- e) Nenhuma das alternativas está correta.