



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

CONCURSO PÚBLICO

005. PROVA OBJETIVA

MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **04**.

Bons olhos

De um dia para o outro percebo a cidade mais clara. O ar mais limpo, os prédios mais brancos, a luz mais intensa, as cores mais vivas, o verde das árvores mais luminoso. Como se a paisagem tivesse sido lavada. Mudou como um automóvel que vemos entrar e sair do lava a jato. Da minha janela, voltada para o oeste, distingo morros ao longe, em sequência, bem para lá do Pico do Jaraguá, para os lados de Jundiá.

Explico: fiz uma cirurgia de catarata, substituí o cristalino avariado dos olhos por lentes implantadas e constato que uma parte da poluição da cidade, daquela névoa de tom sépia que dava à paisagem da minha janela uma aparência de foto antiga, era dos meus próprios olhos. A fuligem era minha.

A língua portuguesa tem uma expressão que agora ficou mais rica para mim: “ver com bons olhos”. Significa concordar, apoiar, receber bem uma coisa, um fato. Vejo com bons olhos a saída do ministro Fulano. Vejo com bons olhos o namoro de vocês. Bons olhos são pró, a favor. A expressão não indica apenas a simpatia do olhar, ou olhar com aprovação, boa vontade. Indica também que aquilo que se vê com bons olhos se revela, mostra o que tem de bom. Com bons olhos, o mundo melhora.

“Bons olhos o vejam!” – se diz (ou se dizia, pois a língua vai perdendo poeira pelo caminho, como os cometas) a uma pessoa querida que não se vê há algum tempo. Quando dizemos que alguém “tem um bom olho” significa que é perspicaz, sabe das coisas, enxerga longe, tem talento para negócios, visão. Quem tem “olho clínico” acerta o ponto, enxerga exatamente o que é relevante.

Todavia há o outro lado. “Ele não me vê com bons olhos” é o mesmo que “não gosta de mim”. O pessimista e o mal-humorado veem com maus olhos. É verdade que os olhos quando melhoram enxergam pequenos defeitos que antes não eram percebidos. Ah, se são mesmo pequenos os defeitos, que bons olhos os vejam.

Outro dia, em conversa com o oftalmologista, viajamos eu e ele para um futuro sem óculos. Eu e o doutor falamos de um mundo que se avizinha, o das lentes implantadas, ou intraoculares, LIOs, como eles chamam. E nos convencemos de que assim que se tornarem inúteis os óculos virarão enfeite, um adereço da moda, um luxo.

(Ivan Angelo, *Veja SP*, 29.06.2005. Adaptado)

- 01.** Pela leitura do texto, é correto afirmar que, segundo o cronista, a cirurgia de catarata
- (A) deixou-o feliz, pois agora identifica nitidamente os objetos que estão mais próximos dele, embora ainda não consiga ver bem à longa distância.
 - (B) incentivou-o a pesquisar no dicionário o sentido de algumas expressões, como “bons olhos o vejam”, de que antes ele desconhecia o significado.
 - (C) permitiu-lhe ter um “olho clínico”, visto que, agora, ele pode avaliar as opiniões relevantes que surgem a partir de determinada situação.
 - (D) motivou-o a refletir sobre os avanços na área da oftalmologia que possivelmente terão, como uma de suas consequências, a transformação dos óculos em acessórios de moda.
 - (E) levou-o a reconhecer-se como um indivíduo que, às vezes, comporta-se com pessimismo e mau humor ao não ver com bons olhos as outras pessoas.
- 02.** No trecho – De um dia para o outro percebo a cidade mais clara. O ar mais limpo, os prédios mais brancos, a luz mais intensa, as cores mais vivas, o verde das árvores mais luminoso. (1.º parágrafo) – a repetição do advérbio **mais** permite ao cronista
- (A) evidenciar seu apreço por morar em ambiente campestre e sem poluição.
 - (B) expor sua decisão de usar óculos apenas por questões estéticas.
 - (C) enfatizar sua satisfação por estar enxergando de outra maneira a paisagem.
 - (D) relembrar seu temor e sua preocupação dias antes de realizar a cirurgia.
 - (E) ressentir-se da ausência do tom sépia que recobria antigamente a cidade.
- 03.** Analise a conjunção em destaque e assinale a alternativa que apresenta, corretamente e entre colchetes, a relação que ela estabelece entre as ideias do trecho.
- (A) Mudou **como** um automóvel que vemos entrar e sair do lava a jato. [finalidade] – 1.º parágrafo.
 - (B) substituí o cristalino avariado dos olhos por lentes implantadas e constato que uma parte da poluição da cidade... [concessão] – 2.º parágrafo.
 - (C) A expressão não indica apenas a simpatia do olhar, **ou** olhar com aprovação, boa vontade. [proporção] – 3.º parágrafo.
 - (D) “Bons olhos o vejam!” – se diz (ou se dizia, **pois** a língua vai perdendo poeira pelo caminho, como os cometas)... [conclusão] – 4.º parágrafo.
 - (E) **Todavia** há o outro lado. “Ele não me vê com bons olhos” é o mesmo que “não gosta de mim”. [oposição] – 5.º parágrafo.

04. Observe o trecho reescrito a partir das ideias do texto.

Antigamente, quando a língua ainda não havia perdido poeira pelo caminho, se _____ “bons olhos o vejam” _____ que era um grande prazer rever a pessoa.

Para dar sentido ao texto, as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com as formas verbais

- (A) disséssemos ... significava
- (B) disséssemos ... irá significar
- (C) dissermos ... significará
- (D) dissermos ... significaria
- (E) vamos dizer ... teria significado

Considere a charge a seguir para responder às questões de números 05 e 06.



(Mandrade, *Folha de S.Paulo*, 12.11.2010. Adaptado)

05. Analisando a cena, é correto afirmar que

- (A) o pai está preocupado, pois não deu à filha de 15 anos as devidas orientações sexuais.
- (B) o amigo procura aconselhá-lo, pois também é pai de filhas adolescentes.
- (C) a filha tem gastado mais dinheiro do que o pai esperava para a idade dela.
- (D) o pai não tem recursos financeiros, por isso está temeroso com as altas dívidas que vem acumulando.
- (E) mãe e filha são vaidosas e fazem compras cujos valores superam o estrito orçamento familiar.

06. Assinale a alternativa cujos termos preenchem, correta e respectivamente, o texto a seguir reescrito a partir da charge.

Em uma conversa, o pai da adolescente comentou que, ___ dias, vem levando mais ___ sério o comportamento da filha, o que levou seu amigo a lhe perguntar se ele se referia ___ atividades amorosas da garota.

- (A) há ... à ... as
- (B) há ... a ... às
- (C) há ... à ... às
- (D) a ... à ... as
- (E) a ... a ... às

Considere o texto a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

Atendimento hospitalar ligado a energéticos cresce

Cresce o número de pacientes atendidos em emergências hospitalares por complicações ligadas ao consumo de bebidas energéticas, revelam novos dados federais dos Estados Unidos.

Os casos anuais em que pessoas procuraram hospitais por razões ligadas ao consumo de energéticos surpreendentemente dobraram entre 2007 e 2011.

Os problemas, normalmente ligados ao consumo excessivo de cafeína, podem incluir ansiedade, dores de cabeça, arritmia cardíaca e até ataques cardíacos.

Os dados mostram que o maior grupo de pacientes está na faixa dos 18 aos 25 anos. Dois terços dos pacientes atendidos foram homens.

Cerca de 42% das pessoas atendidas tinham tomado as bebidas com álcool ou outras substâncias, como remédios para déficit de atenção.

O setor de energéticos vem sendo alvo de atenção após a revelação de que a FDA (agência americana que regula remédios) teria recebido denúncias de mortes e ferimentos envolvendo as bebidas.

Os fabricantes de energéticos afirmam que seus produtos não causam perigos à saúde, e há poucas evidências de que as bebidas proporcionem qualquer coisa senão uma dose alta de cafeína, semelhante à que é encontrada numa xícara de café forte.

(*New York Times*, tradução Clara Allain, publicado pela *Folha de S.Paulo* em 16.01.2013. Adaptado)

07. Assinale a afirmação correta sobre o texto.

- (A) Sintomas como ansiedade e arritmia cardíaca podem ser decorrentes da ingestão de energéticos em cuja composição está ausente a cafeína.
- (B) Embora as estatísticas indiquem alteração insignificante no número de atendimentos, os médicos estão surpresos com as complicações causadas pelo consumo de bebidas energéticas.
- (C) A maioria dos pacientes atendidos em hospitais públicos são do sexo masculino e pertencem à faixa etária que vai dos 18 anos à meia-idade.
- (D) A indústria de energéticos tornou-se alvo de denúncias, pois se comprovou que essas bebidas estão sendo comercializadas para menores de 18 anos.
- (E) O setor de energéticos defende-se das acusações alegando que seus produtos são inócuos e contêm dose de cafeína similar à de uma xícara de café forte.

08. É correto afirmar que um dos objetivos do texto é

- (A) descrever as várias substâncias que são utilizadas na composição de produtos energéticos.
- (B) apresentar pareceres opostos sobre os problemas físicos decorrentes da ingestão de bebidas energéticas.
- (C) expor dados estatísticos que evidenciam o poder financeiro do setor de energéticos.
- (D) informar sobre a FDA, órgão que age na punição e na aplicação de multas aos fabricantes de energéticos.
- (E) comprovar que optar pelo consumo de café em lugar do consumo de energéticos é mais saudável.

09. Observe a tirinha.



(Fernando Gonsales, *Folha de S.Paulo*, 28.03.2011)

Uma figura de linguagem empregada na tirinha é a prosopeia, pois

- (A) expressões com sentido pejorativo foram substituídas por outras mais amenas.
- (B) o diálogo entre os ratos baseia-se em palavras que apresentam sentido oposto.
- (C) os ratos conversam e têm atitudes semelhantes às dos seres humanos.
- (D) a intimidade com que a pesquisadora se dirige aos ratos é exagerada e irreal.
- (E) o termo “labirinto” permite duas interpretações: espaço tortuoso e sensação de insegurança.

10. Considere o texto a seguir.

O oftalmologista disse para _____ comprar óculos _____ a fim de proteger os olhos contra o excesso de claridade. Mas foi difícil escolher um modelo, pois nas lojas _____ muitas marcas e estilos _____.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta, respectivamente, por:

- (A) mim ... escuro ... haviam ... diferenciados
- (B) mim ... escuros ... havia ... diferenciados
- (C) mim ... escuro ... haviam ... diferenciadas
- (D) eu ... escuros ... havia ... diferenciados
- (E) eu ... escuro ... haviam ... diferenciadas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. As planilhas eletrônicas costumam usar letras para nomear os cabeçalhos de suas colunas, com a letra A para a primeira coluna, B para a segunda, seguindo a ordem alfabética até Z para a coluna 26. A partir da vigésima sétima coluna, mais de uma letra será usada para nomear as colunas, com AA para a coluna 27, AB para a coluna 28 e assim sucessivamente. Por esse padrão, a coluna de número 333 terá como cabeçalho

- (A) IA.
- (B) JK.
- (C) KG.
- (D) LU.
- (E) MP.

12. Três amigos, de apelidos MH, MC e MJ, disputaram cartas de jogadores de futebol. Mário ganhou mais cartas que Manoel, e Mateus ganhou mais cartas que Mário. Como MJ foi o que mais ganhou cartas no total, ficou em primeiro lugar na disputa, e MC ficou em último, pois foi o que menos ganhou cartas. De acordo com as informações, é possível concluir que o apelido de


- (A) Mário é MH.
- (B) Mário é MC.
- (C) Manoel é MJ.
- (D) Manoel é MH.
- (E) Mateus é MC.

13. Na Ilha Blopitiblopiti, a menor unidade monetária é o blimpe, e 13 blimpes formam um blompe. Um grupo de amigos foi a um bar e gastou 16 blompes e 11 blimpes. Quatro desses amigos perceberam que, embora eles e os outros do grupo tivessem feito pedidos diferentes entre si, cada um dos amigos do grupo gastou a mesma quantia. Sabendo-se que o gasto, por pessoa, foi maior que 1 blimpe, o número de amigos que foram a esse bar foi

- (A) 33.
- (B) 43.
- (C) 53.
- (D) 63.
- (E) 73.

14. Henrique decidiu exercitar-se subindo e descendo os degraus de uma escada. Ele começa subindo 7 degraus e depois descendo 5 degraus e continua subindo 7 degraus e descendo 5 degraus, até chegar ao topo da escada. Ao chegar ao topo, Henrique subiu um total de 49 degraus, o que permite concluir que o total de degraus da escada é
- (A) 15.
 - (B) 17.
 - (C) 19.
 - (D) 21.
 - (E) 23.
15. Se economizo dinheiro, viajo por quinze dias. Se viajo por quinze dias, então levo um livro. Ao viajar, ou levo um livro ou levo um filme. Na última viagem, levei um filme, logo, conclui-se que
- (A) não economizei dinheiro.
 - (B) viajei por quinze dias.
 - (C) levei um livro.
 - (D) viajei por mais de quinze dias.
 - (E) não comprei um livro.
16. Seja a afirmação: “Se um gato mia e pula, então não está com fome.” A negação dessa afirmação é
- (A) Se um gato não mia e não pula, então ele não está com fome.
 - (B) O gato mia e pula, e está com fome.
 - (C) Um gato com fome não mia ou não pula.
 - (D) Ou um gato mia ou um gato pula.
 - (E) Se um gato mia ou pula é porque quer comer.
17. Uma editora é especializada em traduzir para o português livros escritos em japonês, inglês e francês. No total, ela conta com 30 tradutores, sendo que nenhum deles domina os três idiomas estrangeiros. Quem domina o inglês ou o francês também domina outro idioma. O número de tradutores que dominam apenas o japonês é o mesmo dos que dominam simultaneamente o francês e o inglês. Sete tradutores dominam inglês e japonês, e outros três dominam francês e japonês. O número de tradutores dessa editora que dominam o inglês é
- (A) 16.
 - (B) 17.
 - (C) 18.
 - (D) 19.
 - (E) 20.

18. Em uma tribo, o *gram* e o *grum* são usados para quantificar a ração oferecida para as vacas. Para alimentar três vacas, são necessários um gram e sete grums. Para alimentar quatro vacas, são necessários dois grams e sete grums. Para alimentar seis vacas, utilizando apenas o grum, o número de unidades necessárias é
- (A) 9.
 (B) 13.
 (C) 17.
 (D) 21.
 (E) 25.
19. Em uma companhia de dança com 100 dançarinos, 90 têm tatuagens, 80 têm cabelos compridos e 70 são canhotos. O número de dançarinos com essas três características é, no mínimo,
- (A) 30.
 (B) 35.
 (C) 40.
 (D) 45.
 (E) 50.
20. Um relógio de ponteiros foi construído de modo a marcar um total de 7 horas, conforme a figura. Dessa forma, a cada sessenta minutos, o ponteiro dos minutos completa uma volta, e a cada sete horas, o ponteiro das horas completa uma volta.



À meia-noite, de domingo para segunda, esse relógio foi ajustado de modo que os ponteiros das horas e dos minutos estivessem apontando para o número 7, e um relógio tradicional também teve seus ponteiros ajustados de modo a apontarem para o número 12. Na quinta-feira seguinte, à tarde, esse relógio estará marcando 5h 30 min, conforme a figura. Isso significa que o relógio tradicional estará marcando

- (A) 15h 30 min.
 (B) 16 horas.
 (C) 16h 30 min.
 (D) 17 horas.
 (E) 17h 30 min.

21. A Constituição Federal estabelece que o Sistema Único de Saúde deve ser organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Com relação a essas diretrizes, é correto afirmar que
- (A) a descentralização significa que a gestão do sistema de saúde passa a ser executada pelas unidades da federação.
 - (B) a descentralização implica que o município formule suas próprias políticas de saúde e atue como parceiro para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde.
 - (C) o atendimento integral pressupõe que cada município deva ofertar na integralidade os serviços de saúde, por meio de recursos próprios.
 - (D) a participação da comunidade sobre a aplicação dos recursos da saúde se dá por meio dos Tribunais de Conta Municipais.
 - (E) a participação e o controle social são feitos pelos conselhos de saúde, com participação em igual número de representantes dos usuários, dos trabalhadores da saúde e dos prestadores de serviço.
22. De acordo com o Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que
- (A) o processo de planejamento da saúde deve ser descendente e integrado, do nível federal até o nível local, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
 - (B) os Conselhos Estaduais de Saúde estabelecerão as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas dos entes federativos.
 - (C) no planejamento da saúde devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS.
 - (D) o planejamento da saúde é obrigatório para serviços de saúde da iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
 - (E) compete à Comissão Intergestores Tripartite – CIT pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
23. De acordo com a legislação (Lei n.º 8.080 e Lei n.º 11.108), os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, de
- (A) seu cônjuge, tanto nos serviços da rede própria, como da conveniada.
 - (B) seu cônjuge, desde que o serviço seja da rede própria.
 - (C) um acompanhante indicado pela parturiente, tanto nos serviços da rede própria, como da conveniada.
 - (D) um acompanhante indicado pela parturiente, desde que o serviço seja da rede própria.
 - (E) um acompanhante indicado pela parturiente, apenas em situações de gravidez de risco.
24. Com relação à participação da comunidade na gestão do SUS, é correto afirmar que
- (A) ela tem como principal instância colegiada os Conselhos de Saúde.
 - (B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
 - (C) os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com igual número de representantes de cada um desses segmentos.
 - (D) a representação dos municípios no Conselho Nacional de Saúde é feita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass.
 - (E) as Conferências de Saúde devem ser convocadas, ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, pelo Poder Executivo.
25. Em 2006, por meio da Portaria n.º 399, o Ministério da Saúde fez um balanço do SUS, após cerca de uma década e meia de sua implantação, concluindo que
- (A) apesar de importantes avanços, ele ainda é avaliado negativamente pelos que o utilizam rotineiramente.
 - (B) para seu aprimoramento, é necessário que se definam normas de caráter técnico-processual mais detalhadas e de maior complexidade.
 - (C) se coloca, dentre outras ações de alta complexidade a serem melhoradas, a necessidade de se aumentar a capacidade da rede de saúde para a realização de transplantes de órgãos.
 - (D) o modelo adotado parece ter se esgotado, em parte, pela dificuldade de se imporem normas gerais a um país tão grande e desigual.
 - (E) ele é altamente positivo e que, apesar da possibilidade de medidas para sua melhoria, não há necessidade de reformas incrementais.

26. Com relação à Política Nacional de Atenção Básica, definida pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar que
- (A) ela se caracteriza por um conjunto de ações de saúde de âmbito coletivo, visando, sobretudo, a proteção da saúde e a prevenção de agravos.
 - (B) para se atingir a integralidade das ações em seus vários aspectos, os gestores devem ser capazes de sobrepor as ações programáticas a aquelas advindas da demanda espontânea.
 - (C) para se garantir o acesso universal e igualitário às ações de saúde, ele deve ocorrer, sem qualquer tipo de restrição, em todos os serviços, sejam eles de alta, média ou baixa complexidade.
 - (D) sua característica principal é a utilização de recursos simples e de baixo custo, respeitando a hierarquia dos diferentes serviços que compõem a rede de saúde.
 - (E) ela tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica.
27. A Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000, constitui-se num importante instrumento legal para garantir o acesso de todos os cidadãos à promoção, proteção e recuperação de sua saúde. Seu objetivo foi o de
- (A) ampliar os recursos orçamentários e o comprometimento de todos os entes da Federação com o financiamento do SUS.
 - (B) resgatar o papel do governo federal no financiamento das ações e dos serviços de saúde.
 - (C) aumentar a autonomia dos municípios no planejamento da alocação dos recursos para a saúde.
 - (D) resgatar os princípios de integralidade, universalidade e equidade do SUS.
 - (E) permitir que novas fontes de recursos orçamentários pudessem ser utilizadas para o financiamento das ações e dos serviços de saúde.
28. Dentre outros, são de notificação compulsória os seguintes agravos relacionados ao trabalho:
- (A) asma ocupacional, dermatose ocupacional e câncer relacionado ao trabalho.
 - (B) distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, silicose e disfonia ocupacional.
 - (C) perda auditiva induzida pelo ruído, asma ocupacional e dermatose ocupacional.
 - (D) acidente de trabalho fatal, lombalgia relacionada ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho.
 - (E) acidente de trabalho com mutilações, acidente de trabalho em crianças e adolescentes, dermatose ocupacional.
29. De acordo com o Código de Ética Médica, é permitido ao médico
- (A) oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial.
 - (B) participar de anúncios de empresas ou produtos ligados à Medicina, em matérias de comprovado rigor científico.
 - (C) divulgar o endereço e telefone de seu consultório, clínica ou serviço, por ocasião das entrevistas, comunicações, publicações de artigos e informações ao público.
 - (D) anunciar, por qualquer meio de comunicação, sua especialidade e/ou área de atuação, desde que registrada no Conselho Regional de Medicina.
 - (E) incluir seu nome em concursos ou similares, cuja finalidade seja escolher o “médico do ano”, “destaque”, “melhor médico” ou outras denominações que visam ao objetivo promocional ou de propaganda, individual ou coletivo.
30. O médico é responsável pelo atendimento de um paciente que tinha febre tifoide e apresentou perfuração intestinal, falecendo em consequência de peritonite. Na Declaração de Óbito, a “febre tifoide”, a “perfuração intestinal” e a “peritonite”, devem ser anotadas, correta e respectivamente, como causa
- (A) básica, intermediária e imediata.
 - (B) intermediária, básica e imediata.
 - (C) imediata, intermediária e básica.
 - (D) terminal, intermediária e básica.
 - (E) básica, terminal e imediata.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Uma equipe de saúde da família deve ter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
- (A) médico generalista ou com especialização em saúde da família, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
 - (B) médico generalista ou com especialização em saúde da família, dentista, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
 - (C) médico generalista ou com especialização em saúde da família, dentista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
 - (D) médico com especialização em saúde da família, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
 - (E) médico com especialização em saúde da família, dentista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
32. Assinale a resposta correta sobre prevenção de doenças.
- (A) Prevenção primária é aquela relacionada ao diagnóstico precoce de uma determinada doença.
 - (B) Prevenção secundária consiste na reabilitação em casos com a doença estabelecida.
 - (C) Prevenção terciária refere-se ao tratamento precoce de uma determinada doença.
 - (D) Prevenção primária é aquela relacionada às medidas para evitar doenças.
 - (E) Prevenção terciária está relacionada ao tratamento de doenças complexas em centros terciários de saúde.
33. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que traz as vacinas que fazem parte do calendário vacinal oficial nos primeiros seis meses de vida.
- (A) BCG, DTP, vacina oral da poliomielite, vacina oral de rotavírus humano, vacina meningocócica C, febre amarela e vacina pneumocócica 10.
 - (B) BCG, DTP + hepatite B, vacina oral da poliomielite, vacina meningocócica C, febre amarela e vacina pneumocócica 10.
 - (C) BCG, DTP + hepatite B, vacina oral da poliomielite, vacina oral de rotavírus humano, vacina meningocócica C, febre amarela, vacina pneumocócica 10, tríplice viral.
 - (D) BCG, DTP + hepatite B, vacina oral da poliomielite, vacina oral de rotavírus humano, vacina meningocócica C, vacina pneumocócica 10 e tríplice viral.
 - (E) BCG, DTP + hepatite B, vacina oral da poliomielite, vacina oral de rotavírus humano, vacina meningocócica C e vacina pneumocócica 10.
34. Sobre o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, assinale a alternativa correta.
- (A) Em mulheres com idade entre 35 e 64 anos, após um exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) negativo, o exame seguinte pode ser realizado após três anos.
 - (B) A coleta do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) deve ser realizada pelo médico ginecologista da unidade de saúde.
 - (C) O resultado do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) deve ser avaliado somente no dia do retorno da paciente à unidade de saúde.
 - (D) Além do acompanhamento do médico de família, as mulheres também devem fazer avaliação especializada anual com ginecologista.
 - (E) Os agentes comunitários de saúde devem fazer a busca ativa de mulheres para rastreamento do câncer ginecológico, inclusive fazendo a coleta do Papanicolau no domicílio, quando a mulher não puder ou não quiser ir até a unidade de saúde.
35. Adolescente feminina de 14 anos procura atendimento médico para realizar contracepção. Em relação a essa situação, assinale a alternativa correta.
- (A) Devem ser evitados contraceptivos hormonais na adolescência.
 - (B) Deve-se orientar a adolescente sobre as vantagens e desvantagens de cada método e decidir, em conjunto, a melhor opção para ela, respeitando as indicações da OMS.
 - (C) Deve-se convocar o pai ou a mãe da adolescente para participar do processo e tomar ciência da atividade sexual dela, mesmo contra a vontade da adolescente, devido à sua idade.
 - (D) Se ela mantiver relação com apenas um parceiro fixo e optar pelo uso de contraceptivo hormonal oral, o uso de preservativo é dispensável.
 - (E) O uso de DIU está contraindicado nesta idade.
36. Assinale a alternativa correta sobre contracepção.
- (A) O uso do preservativo masculino é eficaz na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas não deve ser utilizado como contraceptivo.
 - (B) Anticoncepcional oral combinado não é recomendado para mulheres tabagistas com mais de 40 anos de idade.
 - (C) Anticoncepcional oral de progesterona (minipílula) não deve ser utilizado por mulheres acima dos 35 anos de idade.
 - (D) O DIU de progesterona pode ser utilizado no puerpério imediato.
 - (E) A injeção trimestral de progesterona não é recomendada em mulheres tabagistas.

37. Em relação ao ganho de peso recomendado durante a gestação, é correto afirmar que
- (A) uma gestante de baixo peso deve ter ganho ponderal de, pelo menos, 20 kg durante a gestação.
 - (B) gestantes de peso normal e gestantes obesas devem ter o mesmo ganho de peso durante a gestação, porém gestantes de baixo peso devem ter maior ganho de peso durante a gestação.
 - (C) o ganho de peso recomendado durante a gestação é de 7 a 10 kg, independentemente do peso antes da gestação.
 - (D) a partir do segundo trimestre, o ganho de peso deve ser de 0,5 kg/semana, independentemente do peso antes da gestação.
 - (E) gestantes obesas devem ganhar menos peso durante a gestação do que gestantes de peso normal.
38. Paciente feminina de 30 anos apresenta corrimento vaginal branco-acinzentado, com odor fétido, que se acentua durante o período menstrual. Ao exame bacteriológico, notam-se células-chave (*clue cells*). Considerando essas informações, assinale a alternativa que responde, correta e respectivamente, às seguintes perguntas: Qual é a hipótese diagnóstica? Qual é o tratamento? Há necessidade de se tratar o parceiro?
- (A) Vaginose; Metronidazol; Não.
 - (B) Tricomoníase; Metronidazol; Sim.
 - (C) Candidíase; Fluconazol; Não.
 - (D) Gonorreia; Ceftriaxona; Sim.
 - (E) Clamídia; Doxiciclina; Sim.
39. Assinale a alternativa correta sobre atividade física em adultos no contexto de promoção à saúde.
- (A) A atividade física recomendada é aquela que gaste 1 000 kcal/semana, como, por exemplo, atividade moderada, cinco vezes por semana, por uma hora.
 - (B) A atividade física é importante na prevenção de doenças cardiovasculares, porém não previne outras doenças.
 - (C) O médico de saúde da família não deve recomendar nem orientar a prática de atividade física, sendo essa atribuição responsabilidade do cardiologista ou do médico do esporte.
 - (D) É recomendado que todos os pacientes realizem teste ergométrico antes de iniciarem atividade física.
 - (E) Exercício físico moderado é aquele em que a frequência cardíaca atinge 70-90% da frequência cardíaca máxima, enquanto que exercício físico de alta intensidade é aquele em que a frequência cardíaca atinge mais que 90% da frequência cardíaca máxima.
40. Em relação à promoção de saúde e cuidados dos idosos, é correto afirmar que
- (A) o instrumento de avaliação multidimensional do idoso foi concebido para uso em centros secundários ou terciários por médicos geriatras.
 - (B) idosos com presbiacusia quase sempre se queixam de dificuldade para ouvir.
 - (C) os idosos são capazes de mudar hábitos, mesmo aqueles com mais de 75 anos.
 - (D) é normal a perda de peso no idoso, sendo que perda de até 20% do peso corporal em seis meses não deve ser valorizada.
 - (E) no atendimento ao idoso, deve-se ter como objetivo a melhora da qualidade de vida, mas não se deve preocupar com aumentar a expectativa de vida.
41. Assinale a alternativa correta sobre a triagem de acuidade visual na puericultura.
- (A) Deve ser realizada na primeira consulta após o nascimento, pelo teste de Snellen.
 - (B) Deve ser realizada após os sete anos de idade.
 - (C) É realizada pelo teste do reflexo vermelho com o oftalmoscópio, logo ao nascer.
 - (D) Pode ser feita em uma consulta de rotina, a partir dos 4 anos ou, ainda, ser planejada para ser realizada nas escolas.
 - (E) Deve ser programada visita de médico oftalmologista nas escolas para triagem de crianças com 7 anos de idade.
42. Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa correta.
- (A) Não foi demonstrado nenhum benefício sobre a saúde da mãe.
 - (B) Puérperas com contra-indicação absoluta ao aleitamento materno devem, obrigatoriamente, utilizar estrogênio ou inibidor da prolactina.
 - (C) História prévia de desmame precoce não representa risco de interrupção do aleitamento materno precoce.
 - (D) Deve-se incentivar a livre demanda das mamadas, sem horário preestabelecido.
 - (E) Bochechas encovadas em cada sucção é um sinal de boa técnica de amamentação.

43. Em relação à obesidade infantil, assinale a alternativa correta.
- (A) A oferta alimentar tem papel desprezível na obesidade infantil.
 - (B) A obesidade na infância não está relacionada à obesidade na idade adulta.
 - (C) A avaliação da presença de obesidade deve ser feita pelo percentil em que o índice de massa corpóreo da criança se encontra.
 - (D) Em crianças obesas, deve-se impor dietas rígidas e restritivas para que ocorra perda de peso.
 - (E) No tratamento da obesidade infantil, deve-se focar na dieta da criança, sem necessidade de alterar a dieta e/ou os hábitos dos pais.
44. Homem, 50 anos, tabagista, sem história de hipertensão arterial ou diabetes melito, sedentário, assintomático. Ao exame físico, apresenta PA: 120 x 80 mmHg, IMC: 25 kg/m² e circunferência abdominal: 115 cm. Nesse caso, quanto à prevenção de doenças cardiovasculares, assinale a alternativa correta.
- (A) Idade e tabagismo são os fatores de risco cardiovascular identificáveis nesse paciente.
 - (B) O uso do ácido acetilsalicílico, na ausência de contraindicações, é consenso para a prevenção de doenças cardiovasculares nesse tipo de paciente.
 - (C) Deve-se recomendar redução pela metade da quantidade de cigarros fumados diariamente por 2 semanas e, após, interromper totalmente o tabagismo, evitando iniciar o processo com a interrupção total do tabagismo.
 - (D) Recomenda-se calcular o risco cardiovascular na consulta pelo modelo de Framingham, após a dosagem do colesterol total e HDL.
 - (E) Deve-se recomendar a prática de atividade física de baixa intensidade, 30 minutos, três vezes por semana, após realização de teste ergométrico com resultado normal.
45. Em relação à medida da pressão arterial, é correto afirmar que
- (A) deve ser realizada nos dois braços, em todas as consultas médicas, devendo-se considerar apenas a medida mais baixa.
 - (B) deve ser realizada nos dois braços e nas duas pernas, em todas as consultas, e deve ser considerada a média dessas medidas.
 - (C) a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) deve ser solicitada, no atendimento primário, a todos os pacientes com medida elevada da pressão arterial na consulta.
 - (D) não deve ser realizada quando não estiver disponível, na unidade de saúde, um manguito adequado ao tamanho do braço do paciente.
 - (E) no acompanhamento de pacientes hipertensos, ela deve ser realizada duas vezes em cada consulta, com pelo menos um minuto de intervalo entre as medidas.
46. Homem, 38 anos, sedentário, vem em primeira consulta para uma avaliação clínica. Ao exame físico, IMC: 31 kg/m² e pressão arterial (PA): 140 x 90 mmHg no braço esquerdo e 144 x 94 mmHg no braço direito. Em relação a esse paciente, é correto afirmar o seguinte:
- (A) deve-se considerar que a pressão arterial do paciente é 142 x 92 mmHg.
 - (B) o paciente deve receber o diagnóstico de pré-hipertensão, sendo recomendada mudança do estilo de vida.
 - (C) o paciente deve receber o diagnóstico de hipertensão arterial estágio I, sendo recomendado, nessa consulta, mudar o estilo de vida e iniciar anti-hipertensivo em monoterapia.
 - (D) esse paciente deve ter hipertensão arterial secundária, já que apresenta aumento dos níveis pressóricos antes dos 40 anos de idade.
 - (E) o diagnóstico de hipertensão arterial só poderá ser confirmado se forem feitas mais 2 medidas, em momentos diferentes, com valores de PA sistólica \geq 140 mmHg e/ou PA diastólica \geq 90 mmHg.
47. Quanto à abordagem familiar na prática da medicina de família, assinale a alternativa correta.
- (A) É imprescindível a presença do núcleo familiar em todas as consultas para que seja feita uma abordagem familiar no atendimento.
 - (B) Quando o médico da família julgar importante a presença de um familiar na consulta e o paciente não aceitar essa proposta, não se deve mais abordar este assunto em consultas posteriores.
 - (C) A família só deve ser chamada para participar do tratamento nos casos de abuso de substâncias ou risco de suicídio.
 - (D) Um familiar não deve ser chamado para a consulta quando houver risco de agressão ao paciente ou ao familiar.
 - (E) O convite para a família participar de uma próxima consulta deve ser feito verbalmente, por intermédio do paciente ou por visita domiciliar; nunca deve ser realizado por meio de carta direcionada à família.
48. Assinale a alternativa correta sobre o conceito de trabalho em equipe.
- (A) Uma equipe deve ter um líder que saiba impor suas vontades e que tenha capacidade de ocultar de seus membros informações ou fatos que possam ser desagradáveis.
 - (B) Um bom líder trata seus colegas como iguais e sempre tenta se colocar na posição do outro para compreendê-lo, mesmo quando não concorda com ele.
 - (C) A falta de capacitação e inexperiência dos profissionais de saúde não são fatores que prejudicam o trabalho em equipe.
 - (D) Ao delegar tarefas para outros profissionais, o líder consegue diminuir suas responsabilidades.
 - (E) Não cabe ao médico de família a administração de conflitos que possam ocorrer na equipe de saúde, devendo ignorá-los quando estes ocorrerem.

49. Com relação aos óbitos ocorridos no domicílio e à declaração de óbito, assinale a alternativa correta.
- (A) A declaração de óbito pode ser fornecida pelo médico do programa de saúde da família no qual o paciente esteja cadastrado, quando o médico souber a causa do óbito.
 - (B) Óbitos ocorridos no domicílio devem sempre ser encaminhados ao serviço da verificação de óbitos ou ao instituto de medicina legal, este último na suspeita de morte violenta.
 - (C) A declaração de óbito é apenas um documento legal, não tendo importância do ponto de vista de vigilância em saúde.
 - (D) A declaração de óbito só está disponível para centros hospitalares; assim, não é possível que o médico de saúde da família forneça o documento nos casos de óbito em domicílio.
 - (E) A declaração de óbito pode ser preenchida pelo enfermeiro, podendo o médico apenas verificar se o preenchimento está correto e assinar a declaração.
50. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os núcleos de apoio à saúde da família são organizados da seguinte forma:
- (A) as UBS devem ser gerenciadas por um médico integrante daquela unidade.
 - (B) um profissional de saúde só pode ser nomeado gerente de uma UBS após a realização de um curso formal de gestão de serviços de saúde.
 - (C) atualmente, alguns médicos que assumem cargos de gerência da UBS ainda necessitam manter algum grau de atendimento à população, junto com a função de gerente.
 - (D) os núcleos de apoio à saúde da família são a porta de entrada do sistema para os usuários.
 - (E) equipe de saúde da família e núcleo de apoio à saúde da família são nomes diferentes para o mesmo conjunto de profissionais e a mesma atuação.
51. Senhora de 40 anos vem em primeira consulta médica para avaliação. Assintomática. Ao exame físico, apresenta pressão arterial: 120 x 80 mmHg, FC: 80 bpm, peso: 80 kg e altura 1,60 m. Sem antecedentes pessoais significativos. Assinale a alternativa correta sobre a avaliação dessa paciente.
- (A) A medida da circunferência abdominal da paciente não trará informações adicionais, pois ela já é obesa.
 - (B) Inicialmente, a paciente deve ser encaminhada ao nutricionista e ao psicólogo para seguimento e controle da obesidade com esses profissionais.
 - (C) Em complemento à consulta, o médico deve solicitar perfil lipídico e glicemia de jejum.
 - (D) O médico de saúde da família deve orientar dieta, atividade física e iniciar uma medicação para auxiliar na perda de peso, como a sibutramina.
 - (E) Essa paciente, além de dieta e atividade física, deve ser encaminhada para cirurgia bariátrica.
52. Paciente de 60 anos, sexo masculino, sedentário, hipertenso, dislipidêmico e com índice de massa corpórea 31 kg/m². Em exame laboratorial, apresenta glicemia de jejum de 115 mg/dL. Nesse momento, a melhor conduta é:
- (A) orientar dieta, atividade física e repetir a glicemia de jejum após um ano.
 - (B) orientar dieta, atividade física e iniciar hipoglicemiantes orais – glibenclamida.
 - (C) encaminhar o paciente ao endocrinologista para avaliação.
 - (D) tranquilizar o paciente sobre achado e explicar que glicemia < 140 mg/dL é normal.
 - (E) solicitar teste oral de tolerância à glicose para complementar a avaliação.
53. Pais trazem criança com quatro semanas de vida para avaliação, queixando-se de que, há uma semana, ela chora excessivamente, ficando com as bochechas vermelhas durante o choro. Relatam que o choro é de forte intensidade e que observam flatulência no bebê. O choro é mais comum no final do dia e início da noite, e os episódios de choro somados têm duração aproximada de três horas por dia. O ganho de peso tem sido normal desde o nascimento, e o exame físico não tem alterações. Trata-se de:
- (A) provável patologia intestinal, devendo-se encaminhar a criança à consulta especializada.
 - (B) choro por cólica, devendo-se tranquilizar os pais do(a) paciente e observar a criança.
 - (C) choro de fome; deve-se estimular a família a oferecer outros produtos lácteos além do aleitamento materno.
 - (D) alergia ao leite materno. Deve-se suspender o leite materno e iniciar a alimentação com uma fórmula láctea adequada à idade.
 - (E) deve-se solicitar ultrassonografia de abdômen e radiografia contrastada do abdômen superior, para o diagnóstico.
54. Indivíduo de 65 anos, assintomático, que vive em seu domicílio, sem história de comportamento de risco e sem viagem programada, vem procurar atendimento, pois deseja atualizar suas vacinas. A última vacina recebida foi “para tétano” há 5 anos. A recomendação a esse paciente deve ser:
- (A) vacina contra influenza sazonal durante a campanha anual de vacinação.
 - (B) dT + vacina contra influenza sazonal.
 - (C) tríplice viral + vacina contra influenza sazonal.
 - (D) pneumocócica + vacina contra influenza sazonal.
 - (E) vacina oral contra o rotavírus humano + pneumocócica + vacina contra influenza sazonal.

55. Em relação à vigilância nos contatos de pacientes com tuberculose, assinale a alternativa a correta.
- (A) Pessoas que não dormem no mesmo quarto/cômodo do paciente não devem ser consideradas contatos.
 - (B) Todos os contatos devem ser submetidos à anamnese, exame físico, radiografia de tórax e exame baciloscópio do escarro.
 - (C) Contatos que não apresentam tosse não precisam comparecer à unidade de saúde para avaliação.
 - (D) Os contatos devem ser avaliados por anamnese e exame físico. Se forem assintomáticos, devem fazer o teste tuberculínico.
 - (E) Crianças assintomáticas que sejam contatos e que tenham sido vacinadas com BCG não necessitam de avaliação.
56. Assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento infantil de crianças nascidas a termo.
- (A) A criança deve conseguir sustentar a cabeça com um mês de idade.
 - (B) O sorriso social surge ao redor do sexto mês de vida.
 - (C) A criança consegue andar sem apoio por volta dos 15-18 meses de vida.
 - (D) A criança consegue sentar sem apoio com 4 meses de vida.
 - (E) A criança começa a andar com seis meses de vida.
57. Os números recomendados e máximo de pessoas que podem estar sob os cuidados de uma única equipe de saúde da família são, correta e respectivamente,
- (A) 500 e 1 000.
 - (B) 2 000 e 3 000.
 - (C) 3 000 e 4 000.
 - (D) 5 000 e 7 000.
 - (E) 8 000 e 9 000.
58. Em relação às parasitoses, na abordagem de crianças que frequentam creches, o médico de saúde da família deve realizar
- (A) apenas medidas educativas quanto à higiene.
 - (B) medidas educativas quanto à higiene e coletar coproparasitológico periodicamente de todas as crianças.
 - (C) medidas educativas quanto à higiene e coletar coproparasitológico periodicamente das crianças com mais de dois anos.
 - (D) apenas medidas educativas quanto à higiene e administrar antiparasitários periodicamente em todas as crianças.
 - (E) apenas medidas educativas quanto à higiene e administrar antiparasitários periodicamente nas crianças com mais de dois anos.
59. Indivíduo do sexo masculino, de 50 anos, hipertenso, vem à unidade básica de saúde com febre, tosse produtiva e dor torácica ventilatória dependente há 2 dias. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 90 bpm, pressão arterial: 130 x 80 mmHg, frequência respiratória: 20 rpm e estertores pulmonares em base direita. Radiografia de tórax mostra consolidação em base direita. Nesse caso, a conduta adequada é:
- (A) coletar escarro para bacterioscopia e iniciar antibiótico por via oral.
 - (B) encaminhar paciente para avaliação em hospital secundário ou terciário e coleta de hemocultura.
 - (C) encaminhar paciente para hospital secundário ou terciário para internação e administração de antibiótico intravenoso.
 - (D) tratamento com antibiótico, por via oral, por 7-10 dias.
 - (E) se a opção for por tratamento com antibiótico por via oral e o paciente retornar após 24 horas taquicárdico e confuso, deve-se tranquilizar a família e orientá-la no sentido de que é necessário aguardar 48 horas para o antibiótico fazer efeito.
60. Senhor de aproximadamente 60 anos é trazido inconsciente à Unidade Básica de Saúde. Como deve ser a sequência inicial de atendimento após checar a responsividade e o paciente não responder?
- (A) Realizar duas ventilações e, após, checar pulso. Se pulso ausente, iniciar compressões torácicas e solicitar ajuda e desfibrilador.
 - (B) Chamar ajuda e solicitar que liguem para o SAMU e tragam um desfibrilador. Checar pulso; se ausente, iniciar compressões torácicas.
 - (C) Solicitar ajuda e aguardar alguém trazer um desfibrilador.
 - (D) Checar pulso; se ausente, iniciar compressões torácicas e ventilação (alternar 30 compressões e duas ventilações). Após cinco ciclos, checar novamente pulso; se ausente, chamar ajuda e solicitar que liguem para o SAMU.
 - (E) Checar pulso; se ausente, iniciar compressões torácicas. Após 30 compressões, realizar duas ventilações e checar novamente o pulso. Se o pulso continuar ausente, ligar para o SAMU e continuar compressões torácicas.

