

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

I. Trata-se de um texto figurativo.

II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.

III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.

IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III apenas.

b) II e III, apenas.

c) III e IV, apenas.

d) I, II, III e IV.

e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.

porque

II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*

a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.

b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira

c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira

d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.

e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.

II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.

III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

a) I. e II, apenas

b) I apenas

c) II apenas

d) II e III apenas

e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) **Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:**
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) **Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:**
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) **Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:**

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) **Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:**
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) **Entre as competências da EBSEERH não se inclui:**

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) **Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:**
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Considerando a Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, que define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) são serviços hospitalares voltados para o atendimento de recém-nascido grave, ou com risco de morte, assim considerados:
- Recém-nascidos menores 32 semanas de idade gestacional que necessitem de cirurgias de pequeno porte ou com peso de nascimento menor de 2000 gramas.
 - Recém-nascidos menores de 36 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor de 1.900 gramas.
 - Recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda de insuficiência respiratória com FiO_2 maior que 30% (trinta por cento).
 - Recém-nascidos menores de 34 semanas e que necessitem de nutrição enteral.
 - Recém-nascidos menores de 33 semanas de idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica com FiO_2 maior que 50% (cinquenta por cento).
- 27) Você é enfermeiro (a) de uma instituição hospitalar que possui uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do tipo II, com 10 leitos. Considerando a Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, a equipe de enfermagem mínima para essa unidade deve ser de:
- 01 (um) enfermeiro coordenador, com jornada diária de 8 horas, com habilitação em neonatologia, ou no mínimo 2 (dois) anos de experiência profissional comprovada em terapia intensiva pediátrica ou neonatal; 01 (um) enfermeiro assistencial, em cada turno; e, no mínimo, 05 (cinco) técnicos de enfermagem, em cada turno.
 - 01 (um) enfermeiro coordenador com título de especialização em terapia intensiva/terapia intensiva neonatal, ou no mínimo 5 (cinco) anos de experiência profissional comprovada de atuação na área; 02 (dois) enfermeiros assistenciais, em cada turno; e, no mínimo, 10 (dez) técnicos de enfermagem, em cada turno.
 - 01 (um) enfermeiro coordenador com título de especialização em terapia intensiva/terapia intensiva neonatal, ou no mínimo 3 (três) anos de experiência profissional comprovada de atuação na área; no mínimo 03 (três) enfermeiros assistenciais, em cada turno; e, no mínimo, 07 (sete) técnicos de enfermagem, em cada turno.
 - 01 (um) enfermeiro coordenador, com jornada diária de 8 horas, com habilitação em neonatologia ou, no mínimo, 1 (um) ano de experiência profissional comprovada em terapia intensiva pediátrica ou neonatal; no mínimo, 02 (dois) enfermeiros assistenciais, em cada turno; no mínimo, 05 (cinco) técnicos de enfermagem, em cada turno; e, no mínimo 05 (cinco) auxiliares de enfermagem.
 - 01 (um) enfermeiro coordenador, com jornada diária de 8 horas, com título de especialização em terapia intensiva/terapia intensiva neonatal ou no mínimo 05 (cinco) anos de experiência profissional comprovada de atuação na área; e no mínimo 05 (cinco) enfermeiros assistenciais, em cada turno.
- 28) Considerando o Capítulo II - da Organização dos leitos de Unidades Neonatal, da Portaria nº 930 de 10 de maio de 2012, a Unidade Neonatal é um serviço de internação responsável pelo cuidado integral ao recém-nascido grave, ou potencialmente grave, dotado de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
- As Unidades Neonatal são divididas de acordo com as necessidades do cuidado, nos seguintes termos: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); e II - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN), sendo que esta última apresenta duas tipologias: a) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo); e b) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).
 - O número de leitos de Unidades Neonatal atenderá ao parâmetro de necessidade populacional, sendo que para cada 100.000 (cem mil) nascidos vivos poderão ser contratados 2 (dois) leitos de UTIN e 2 (dois) leitos de UCIN.
 - A UCINCa somente funcionará em unidade hospitalar que conte com UCINCo, de forma anexa ou como subconjunto de leitos de uma UCINCo. O conjunto de leitos de Cuidados Intermediários (UCINCo e UCINCa) será composto de 2/3 de leitos de UCINCo e 1/3 de UCINCa.
 - Para novos estabelecimentos de saúde que disponham de maternidade e que possuam também UTIN ou UCIN é obrigatória a previsão, no projeto arquitetônico de sua área física, de alojamento para as mães cujos recém-nascidos estiverem internados em UTIN ou UCIN, de forma a garantir condições para o cumprimento do direito do recém-nascido a acompanhante em tempo integral.
- F,F,V,V.
 - V,F,V,V.
 - V,V,F,F.
 - F,V,F,F.
 - F,F,F,F.
- 29) Considerando a Síndrome de Angústia Respiratória (SAR), leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.
- É uma causa comum de morbidade e mortalidade associada ao parto prematuro.
 - A incidência e gravidade da SAR geralmente aumentam quanto maior for a idade gestacional ao nascimento e costumam ser piores em neonatos do sexo feminino.
 - Os recém-nascidos com SAR apresentam, ao nascimento ou nas primeiras horas após o nascimento, sinais clínicos de dificuldade respiratória, como taquipnéia, gemência, retrações e cianose, acompanhados de aumento das necessidades de oxigênio.
- Apenas as frases I e III estão corretas.
 - Todas as frases estão corretas.
 - Todas as frases estão incorretas.
 - Apenas as frases II e III estão corretas.
 - Apenas a frase III está correta.

30) Não são diretrizes para a atenção ao recém-nascido grave ou potencialmente grave:

- a) Atenção humanizada.
- b) Promoção da equidade.
- c) Integralidade da assistência.
- d) Atenção multiprofissional, com enfoque nas necessidades do usuário.
- e) Estímulo à participação e ao protagonismo exclusivo da mãe nos cuidados ao recém-nascido.

31) Considerando os requisitos de Humanização que as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) devem cumprir, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Controle de ruído e de iluminação.
 - II. Garantia de informações da evolução dos pacientes aos familiares, pela equipe médica, no mínimo, uma vez ao dia.
 - III. Garantia de livre acesso ao pai, e permanência exclusiva da mãe.
 - IV. Garantia de visitas programadas exclusivamente aos parentes de primeiro grau.
- a) As frases I e IV estão corretas.
 - b) Todas as frases estão corretas.
 - c) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - d) Apenas as frases III e IV estão corretas.
 - e) Apenas as frases II e IV estão corretas.

32) São repercussões do Diabetes Mellitus, durante a gestação, manifestadas no recém-nascido:

- a) Hiperglicemia, hiperbilirrubinemia, retinopatia, neuropatia e nefropatia.
- b) Hiperglicemia, hipercalcemia, hiperbilirrubinemia, síndrome do desconforto respiratório e malformações cardíacas.
- c) Hipoglicemia, hipercalcemia, hiperbilirrubinemia, síndrome do desconforto respiratório agudo e malformações encefálicas.
- d) Hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, síndrome do desconforto respiratório idiopático e malformações cardíacas.
- e) Retinopatia, neuropatia, nefropatia, hiperglicemia e macrossomia.

33) Em relação à Sífilis Congênita, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se que a maioria das crianças (mais de 60%) é sintomática, apresentando sintomas clássicos ao nascer como baixo peso, alterações neurológicas e oftalmológicas.
- b) Mães com sífilis latente adquirida há mais de quatro anos, não tratadas, representam o maior risco de prematuridade, morte perinatal (18 – 40%) e infecção congênita (70 – 100%) quando comparadas àquelas com sífilis primária ou secundária ou com sífilis adquirida nos últimos quatro anos, em que o risco de infecção congênita é de 23 a 40%.
- c) É uma infecção congênita que pode causar diversas alterações como restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, anormalidades liquóricas e cicatrizes de retinocoroidite.
- d) É comum a presença da tríade clínica clássica como associação de hidrocefalia, calcificações cerebrais e retinocoroidite.
- e) É uma infecção de vários órgãos, que pode causar morte fetal ou neonatal, sequelas neurológicas e esqueléticas.

34) São essenciais o conhecimento e a análise do perfil dos nascimentos e das mortes, assim como de indicadores assistenciais para o planejamento e adequação da assistência. Assinale a alternativa correta.

- a) A proporção de partos cesáreos, segundo dados do Ministério da Saúde, elevou-se de 40,2% em 1996, para 50%, em 2008 entre os tipos de partos classificados. Essa situação aponta a necessidade de ações mais efetivas para a redução da realização de cesarianas desnecessárias, já que é fator de risco para a prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidades neonatal e materna.
- b) O baixo peso ao nascer (< 2.500g) não é o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. Entretanto, reforça a importância da organização do sistema de assistência de saúde à gestante e ao RN de risco.
- c) A prematuridade é um dos fatores determinantes mais importantes da mortalidade infantil. Vem sendo registrada redução da incidência da prematuridade no País, o que tem sido relacionada às baixas taxas de cesarianas programadas, com interrupção indevida da gravidez, sem justificativa médica.
- d) A escolaridade materna não é considerada como fator de risco importante para a sobrevivência infantil. Segundo dados do Ministério da Saúde, mães com menos de 8 anos de instrução apresentaram índices semelhantes de mortalidade infantil quando comparadas às mães com mais de 8 anos de instrução, indicando que não há relação da escolaridade materna e sobrevivência infantil.
- e) A elevação da mortalidade infantil no País é expressiva nos últimos anos. A mortalidade neonatal (entre 0 e 27 dias de vida) representa apenas cerca de 10% do total da mortalidade infantil. Esses dados indicam que avanços na saúde da criança brasileira estão garantidos pela maior atenção à saúde do RN.

35) Um recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) apresentou uma parada cardiorrespiratória (PCR) asfíxica. Na ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a massagem cardíaca e ventilação devem ser realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de:

- a) 10:2.
- b) 3:1.
- c) 15:3.
- d) 30:2.
- e) 5:2.

- 36) **Um recém nascido, em uso de hidratação venosa e nutrição parenteral por mais que sete dias e com manuseio restrito, necessita de um acesso venoso central. Nesse caso, um procedimento particularmente útil é:**
- O cateterismo umbilical, que pode ser utilizado cateter de duplo lúmen, sendo que esse cateter está associado a menor risco de contaminação e está indicado para todas as situações.
 - O cateter central de inserção periférica (PICC), que deve ser realizado exclusivamente pelo profissional médico.
 - O cateter central de inserção periférica (PICC), que pode ser utilizado qualquer acesso venoso, porém a veia de preferência é a basílica.
 - A exsanguineotransfusão, que deve ser feita por intermédio de um vaso calibroso central, sendo geralmente, realizada pela veia umbilical.
 - O cateterismo umbilical, sendo lícito ao Enfermeiro a sua inserção, conforme Resolução do COFEN nº 258/2001.
- 37) **Um recém nascido pré-termo, com 1800 gramas, internado na Unidade de Terapia Intensiva de Neonatal**
- Deverá receber vacinação apenas a partir dos 3 meses de vida.
 - Deverá receber metade da dose das seguintes vacinas: BCG e Hepatite B antes de completar os 30 dias de vida.
 - Deverá receber apenas BCG ao nascer, independentemente do seu peso.
 - Deverá receber a vacina BCG quando ≥ 2.000 gramas. A recomendação da Hepatite B é usar o esquema com quatro doses (Esquema 0-1-2-6 meses).
 - Não deverá receber vacinação antes do primeiro ano de vida.
- 38) **Um recém-nascido (RN) se apresenta com estabilidade clínica, nutrição enteral plena por seio materno e peso de 1450 gramas. Sua mãe possui capacidade de reconhecer sinais de estresse e situações de risco do filho; conhecimento e habilidade para manejar o bebê em posição canguru; e desejo de participar, disponibilidade de tempo e de redes de apoio. Considerando a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru, assinale a alternativa correta.**
- O recém nascido deve possuir, no mínimo, 2500 gramas para ingressar na Unidade Canguru.
 - Apenas a mãe atinge os critérios para ingresso na Unidade Canguru, pois o recém-nascido possui peso inferior a 1500 gramas.
 - A mãe e o recém-nascido não atingem os critérios para ingresso na Unidade Canguru.
 - O recém nascido deve possuir, no mínimo, 2000 gramas para ingressar na Unidade Canguru.
 - A mãe e o recém-nascido atingem os critérios para ingresso na Unidade Canguru.
- 39) **É consenso que a avaliação objetiva da dor no Recém-Nascido (RN) deve ser feita por meio de escalas, que envolvam diversos parâmetros e procuram uniformizar os critérios de mensuração das variáveis. Dentre as diversas escalas de avaliação da dor do RN descritas na literatura, várias podem ser aplicadas na prática clínica como _____, que é composta por cinco parâmetros comportamentais e um indicador fisiológico, avaliados antes, durante e após procedimentos invasivos agudos em RN a termo e pré-termo. Essa escala deve ser aplicada sempre que se registrem os sinais vitais; e define-se dor quando a pontuação é _____.** Preencha as lacunas acima e a seguir assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- BIIP (Indicadores Comportamentais da Dor no Lactente); maior que 7.
 - EDIN (Escala de Dor e Desconforto do RN); maior ou igual a 5.
 - NIPS (Escala de Avaliação de Dor no RN e no Lactente); maior ou igual a 4.
 - COMFORT (Avaliação Comportamental do RN); menor que 1.
 - BRADEN (Avaliação do Risco do RN); maior ou igual a 8.
- 40) **Para um recém-nascido a termo, no sétimo dia de vida, internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, foi prescrito 120 ml de soro glicosado a 5%, para correr em 8 horas, por via endovenosa. O gotejamento desse soro deverá ser de:**
- 15 microgotas/minuto.
 - 5 microgotas/minuto.
 - 12 microgotas/minuto.
 - 1 microgota/minuto.
 - 2 microgotas/minuto.
- 41) **Um recém-nascido a termo, com peso ao nascer adequado para a idade gestacional, saudável, em aleitamento materno exclusivo e adequado, mostrou o seguinte perfil dos níveis séricos de Bilirrubina Total (BT) nos primeiros 6 dias de vida: 5,6mg/dL, no 3º e 4º dias, e 4,8mg/dL no 6º dia de vida. Esse recém-nascido apresentou Hiperbilirrubinemia**
- Significante.
 - Fisiológica.
 - Patológica.
 - Grave.
 - Extrema.
- 42) **Julia tem 2 meses de vida. Sua gestação transcorreu sem problemas, tendo sua mãe feito o pré-natal desde o primeiro mês de gestação. Julia nasceu a termo, pesou 3.100 gramas, chorou logo ao nascer, não tendo apresentado nenhuma alteração no período neonatal. Compareceu hoje à unidade para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. O Enfermeiro avaliou seu desenvolvimento e observou que Julia apresenta padrão de resposta para sua idade. Considerando os marcos do desenvolvimento, Julia apresentou os seguintes comportamentos**
- Responde ao examinador; segura objetos; emite sons; e sustenta a cabeça.
 - Fixa o olhar no rosto do examinador ou da mãe; segue objeto na linha média; reage ao som; e eleva a cabeça.
 - Alcança um brinquedo; leva objetos a boca; localiza o som; e rola.
 - Eleva a cabeça; responde ao examinador; emite sons; e sustenta a cabeça.
 - Imita gestos; localiza o som; rola; e eleva a cabeça.

- 43) Um recém-nascido (RN) a termo saiu de alta hospitalar no segundo dia de vida juntamente com sua mãe, pesando 3430 gramas. Após uma semana, a mãe levou seu filho à Unidade Básica de Saúde para consulta. A Enfermeira fez o exame físico do RN e verificou que seu peso reduziu para 3020 gramas. Durante a entrevista, a Enfermeira detectou que o RN não estava recebendo leite materno em livre demanda, conforme recomendação. Um dos diagnósticos de enfermagem para o problema apresentado pelo RN poderia ser
- Disposição para sono melhorado.
 - Risco de hiperglicemia.
 - Risco de motilidade gastrointestinal disfuncional.
 - Constipação.
 - Padrão ineficaz de alimentação do bebê.
- 44) Considerando a idade gestacional, classifica-se o recém-nascido em pós-termo quando o nascimento ocorre:
- A partir das 40 semanas de gestação, com peso ao nascer superior a 3800 gramas.
 - Entre 38 e 41 semanas, independente do peso ao nascer.
 - Entre 40 e 42 semanas, independente do peso ao nascer.
 - A partir de 42 semanas de gestação, independente do peso ao nascer.
 - A partir de 41 semanas, com peso ao nascer superior a 4000 gramas.
- 45) O recém-nascido (RN) de MJJ, com 34 semanas de idade gestacional, 6º dia de vida, está internado na Unidade de Neonatologia, e após exame físico, foram observados sinais de sopro cardíaco, impulsões precordiais e aumento da amplitude dos pulsos centrais e periféricos. Esses sinais clínicos sugerem _____; e um dos cuidados de enfermagem deve ser _____. Preencha as lacunas e a seguir assinale a alternativa correta.
- Hipotermia Grave; restrição na oferta alimentar.
 - Hemorragia Peri-intraventricular; restrição na oferta hídrica.
 - Persistência do canal arterial; suporte ventilatório adequado.
 - Encefalopatia hipóxico-isquêmica; administração de drogas vasoativas conforme prescrição médica.
 - Cardiopatía Congênita; monitorização cardíaca.
- 46) Um recém-nascido (RN) prematuro, peso ao nascer inferior a 1500 gramas, apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) na sala de parto, sendo reanimado, entubado e transferido para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Encontra-se em ventilação mecânica. Esse RN possui alguns fatores de risco que podem favorecer o desenvolvimento de _____; e um dos cuidados de enfermagem deve ser _____, pois tem efeito protetor. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- Hipercapnia; Manter cabeça em posição neutra e a cabeceira elevada a 30°.
 - Pneumotórax; Posicionamento do RN em decúbito lateral.
 - Hidrocefalia; Manter cabeça em posição lateral e a cabeceira elevada a 45°.
 - Hemorragia craniana (HC); Realização de aspiração de cânula traqueal, sempre que necessário.
 - Hemorragia peri-intraventricular (HPIV); Uso criterioso de aspiração rotineira de cânula traqueal.
- 47) Considerando a importância da temperatura do recém-nascido (RN), leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.
- A prematuridade, a hipóxia e a restrição do crescimento intrauterino são condições que comprometem a termogênese neonatal e aumentam o risco de hipotermia.
 - Recomenda-se a avaliação da temperatura retal, pois sua aferição tem menos risco de lesão e permite a avaliação contínua.
 - A temperatura do RN entre 36,0 e 36,4°C é classificada como potencial estresse do frio (hipotermia leve).
 - As manifestações clínicas da hipotermia são inespecíficas, incluindo, entre outras: sucção débil, hipotonia, letargia, taquipnéia, tremores e taquicardia ou bradicardia.
- Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
 - Apenas a frase III está correta.
 - Apenas a frase II está correta.
 - Todas as frases estão corretas.
- 48) A Sepsis Precoce apresenta-se nas primeiras 72 horas de vida e tem uma mortalidade muito elevada. Na suspeita de sepsis precoce, é recomendado
- Iniciar imediatamente a antibioticoterapia empírica; e após colher todos os exames solicitados.
 - Iniciar imediatamente antibioticoterapia empírica; e após colher os exames mais importantes: PCR, Líquor e eletrólitos.
 - Colher apenas hemograma e iniciar imediatamente a antibioticoterapia empírica.
 - Colher hemocultura(s) antes do início da antibioticoterapia empírica. O hemograma e a PCR (Proteína C Reativa) deverão ser colhidos preferencialmente entre 12 e 24 horas de vida, por apresentar melhor especificidade que amostras colhidas ao nascimento.
 - Colher hemograma(s) antes do início da antibioticoterapia empírica. A PCR deve ser colhida obrigatoriamente durante o nascimento, pois é o período que possibilita a prevenção da sepsis neonatal.

49) São infecções adquiridas por via transplacentária:

- a) Herpes simples, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Sífilis, Hepatite B e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV).
- b) Coqueluche, Sarampo, Candidíase, Hanseníase, Rubéola e Infecção do trato urinário.
- c) Herpes simples, Tuberculose, Rubéola, Citomegalovírus, Hepatite B, Hepatite C e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV).
- d) Hepatite C, Pneumonia, Onfalite, Toxoplasmose, Sífilis e Conjuntivite.
- e) Sífilis, Herpes Simples, Toxoplasmose, Citomegalovírus, Pneumonia, Condiloma, Hanseníase.

50) Um recém-nascido pré-termo, com 28 semanas de idade gestacional, internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), receberá alimentação por via parenteral. Você é Enfermeiro (a) da UTIN e deve orientar a equipe quanto aos cuidados de enfermagem a serem prestados para o procedimento de Nutrição Parenteral (NP). Assinale a alternativa correta.

- a) O acesso vascular deve ser exclusivo para NP; não realizar a infusão concomitante de medicações ou outras soluções pela mesma via.
- b) A solução parenteral deve ser armazenada em temperatura ambiente, por no máximo 48 horas, até sua utilização no paciente.
- c) O equipo utilizado na NP deve ser transparente (equipo comum), pois facilita a visualização do líquido infundido e trocado a cada 48 horas.
- d) Não utilizar bomba de infusão para controlar o fluxo, pois ocorre perda de proteínas.
- e) O equipo utilizado na NP deve ser fotossensível e trocado a cada 96 horas.

