



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 04/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

NÍVEL SUPERIOR

MEDICINA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões) e Raciocínio Lógico (05 questões), Gestão Pública (03 questões), Noções de Direitos Humanos (02 questões), Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais (02 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões) e um tema para redação.
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

Grid for marking answers, numbered 1 to 50, with empty boxes for selection.

RASCUNHO

- 1) Assinale abaixo a alternativa em cuja frase a palavra “bastante” possa ser corretamente classificada como um advérbio.
 - a) Há bastante comida para o jantar.
 - b) O vinho não é bastante.
 - c) Ele já foi bastante rico.
 - d) Chega, você já falou o bastante!
- 2) Quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro, de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
 - a) Matá-lo-ei ou não terei paz novamente.
 - b) Matá-lo eu irei ou não terei paz novamente.
 - c) Eu o matarei ou não terei paz novamente.
 - d) Matarei-o ou não terei paz novamente.
- 3) Na frase “Ele deve passar fome, pois está muito magro”, a palavra “pois” funciona como um articulador das orações e estabelece entre elas a relação de:
 - a) soma.
 - b) oposição.
 - c) explicação.
 - d) conclusão.
- 4) Com base no exercício anterior, é possível classificar a conjunção “pois”. A partir disso, poderíamos substituí-la adequadamente pelo conectivo:
 - a) por que.
 - b) porquê.
 - c) por quê.
 - d) porque.


Leia as afirmativas abaixo para responder as questões 5 e 6:

- I. Sua decisão implicará grandes perdas.
- II. Amor implica em sacrifício.
- III. Os funcionários devem obedecer o regimento.


- 5) As frases que apresentam erro quanto à regência verbal são:
 - a) I e II, apenas.
 - b) II e III, apenas.
 - c) I e III, apenas.
 - d) I, II e III.
- 6) Interpretando as afirmativas I e II, assinale abaixo a alternativa que apresenta – correta e respectivamente, sem alterar o sentido original das frases – sinônimos para o verbo “implicar”.
 - a) originar/rechaçar.
 - b) acarretar/requerer.
 - c) rechaçar/acarretar.
 - d) requerer/recusar.
- 7) Assinale abaixo a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra de “abóbora”, “bobó” e “míssil”, respectivamente.
 - a) música/cipó/terrível.
 - b) cérebro/mó/difícil.
 - c) necrotério/ebó/pênsil.
 - d) titânico/pó/fácil.

- 8) Veja as três palavras que seguem. Complete as lacunas com o artigo.
 ___ púbis; ___ cal; ___ mascote.
 Em concordância com o gênero das palavras apresentadas, assinale abaixo a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
 - a) o/a/a.
 - b) a/a/o.
 - c) o/o/a.
 - d) a/o/o.


- 9) Em uma entrevista para saber se as pessoas utilizariam os produtos A, B ou C, chegou-se a seguinte conclusão: 229 pessoas utilizariam o produto A, 223 utilizariam o produto B, 196 utilizariam o produto C, 79 utilizariam os produtos A e B, 89 os produtos A e C, 69 os produtos B e C, 37 os três produtos e 53 nenhum dos três. Nessas condições, é correto afirmar que:
 - a) 275 pessoas utilizariam somente um dos produtos.
 - b) 112 pessoas utilizariam somente o produto C.
 - c) 225 pessoas utilizariam os produtos A e C, mas não utilizariam o produto B.
 - d) 500 pessoas foram entrevistadas.
- 10) O serviço de obras de uma prefeitura pavimentou um quinto de uma avenida num primeiro dia de trabalho, pavimentou um quarto do restante num segundo dia de trabalho e ainda faltam pavimentar 13500 metros da avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa R\$ 72,00, então o custo para pavimentar toda a avenida é igual a :
 - a) R\$ 162.000,00
 - b) R\$ 2.160.000,00
 - c) R\$ 216.000,00
 - d) R\$ 1.620.000,00
- 11) Observando o 1º, 2º e 3º quadrados abaixo, tem-se 2 quadradinhos brancos no 1º; 6 quadradinhos brancos no 2º e 12 quadradinhos brancos no 3º. Se continuarmos a formar quadrados até a 7ª posição então a soma de todos os quadradinhos brancos até a 7ª posição será igual a:



1º



2º



3º

- a) 168
- b) 126
- c) 240
- d) 112

- 12) Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que:
 - a) o condicional entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
 - b) a disjunção entre P e Q é verdade.
 - c) a conjunção entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
 - d) o bicondicional entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
- 13) A frase “Se Carlos trabalha, então ganha dinheiro” é equivalente a frase:
 - a) Carlos não trabalha e ganha dinheiro.
 - b) Carlos trabalha ou ganha dinheiro.
 - c) Carlos não trabalha ou ganha dinheiro.
 - d) Se Carlos não trabalha, então não ganha dinheiro.

- 14) Para fins de monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG - 2012/2015), serão elaborados:
 - a) Relatórios Estatísticos de Resultados.
 - b) Relatórios de Acompanhamento e de Resultados.
 - c) Relatórios de Gestão Fiscal.
 - d) Relatórios Institucionais de Monitoramento.

15) Analise as seguintes afirmativas, referentes à disciplina constitucional dos servidores públicos.

- I. A Constituição reserva o percentual de 5% (cinco por cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.
- II. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
- III. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.

16) Com relação à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei da Transparência), assinale a alternativa CORRETA:

- a) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
- b) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar.
- c) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar.
- d) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à informação, poderá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

17) Com relação ao direito à instrução previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha do gênero de instrução que será ministrada às crianças e aos adolescentes.
- b) A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
- c) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.
- d) A instrução elementar será obrigatória.

18) Com relação aos direitos previstos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, mas não lhe é assegurado o direito de mudar de nacionalidade.
- b) Toda pessoa tem o direito de ser, dentro de seu país, reconhecida como pessoa.
- c) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, mas não poderá regressar ao seu próprio país.
- d) Toda pessoa tem o direito de não ser perseguida, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.

CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

19) Analise as seguintes afirmativas:

- I. A violação ao Código de Conduta Ética praticada por servidor público poderá ensejar a aplicação da censura ética, no caso de grave lesividade ou se verificada a reincidência na prática de ato cuja sanção aplicada tenha sido a suspensão.
- II. A autoridade que violar o Código de Conduta Ética fica sujeita à sanção de advertência. Cessado o vínculo com a Administração Pública, será aplicável a sanção de censura ética.
- III. A Comissão de Ética, após o devido processo legal, decidiu que José Paulo, servidor público do Estado de Minas Gerais, cometeu infração cuja sanção aplicável é a advertência verbal. Nessa hipótese, a decisão poderá ser aplicada imediatamente pela própria Comissão de Ética.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

20) Indique a alternativa CORRETA:

- a) Os atos praticados sob domínio de assédio moral deverão ser mantidos a fim de se garantir a segurança jurídica das relações entre a Administração Pública e os administrados.
- b) Na aplicação das penas previstas em lei, no caso de assédio moral, serão consideradas a extensão do dano, as atenuantes, as agravantes e as reincidências.
- c) A pretensão punitiva administrativa do assédio moral prescreve em um ano para a pena de censura.
- d) Poderá ser responsabilizado administrativamente o agente público, pela prática de assédio moral, independentemente da sentença prolatada em ação cível que julgou indevida a reparação pelos danos causados à vítima.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre a epidemiologia da hipertensão arterial (HAS), assinale a alternativa incorreta:

- a) A prevalência é ligeiramente maior entre os homens.
- b) A prevalência em indivíduos entre 60 e 69 anos é maior que 50%.
- c) Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais prevalente em indivíduos de cor não-branca.
- d) Não há relação clara entre a ingestão de álcool, mesmo por períodos prolongados de tempo, com o risco de HAS.

22) De acordo com medidas da pressão arterial em consultório, um paciente de 60 anos, diabético, em uso metformina vem apresentando níveis tensionais entre 140-142 x 92-94 mmHg, sem medicação anti-hipertensiva. Não há história de morte por doença cardiovascular em familiares próximos. Não há dados relevantes ao exame físico e os exames complementares mostram:

Glicemia de jejum = 110 mg/dl

Hemoglobina glicada = 6,5%

Urina I = normal

Albuminúria = 19 mg/24 horas

ECG: Sokolow-Lyon > 38 mm e alterações inespecíficas da repolarização ventricular.

A melhor conduta inicial seria:

- a) Apenas tratamento não farmacológico.
- b) Hidroclorotiazida 12,5mg/dia + Enalapril 5 mg 2 x dia + medidas não farmacológicas.
- c) Hidroclorotiazida 25 mg/dia + medidas não farmacológicas.
- d) Captopril 25 mg 2 x dia + medidas não farmacológicas.

23) No tratamento de uma emergência hipertensiva em paciente com insuficiência coronariana aguda, é **contraindicado o uso (parenteral) de:**

- a) Metoprolol.
- b) Nitroglicerina.
- c) Hidralazina.
- d) Nitroprussiato de sódio.

24) Sobre a epidemiologia da insuficiência cardíaca (IC) crônica, assinale a alternativa **incorreta:**

- a) Em regiões endêmicas, a doença de Chagas é a causa da IC em mais de 40% dos pacientes.
- b) A IC com fração de ejeção (FE) preservada é mais frequente no sexo masculino e a IC com FE reduzida no sexo feminino.
- c) Em zonas rurais, estudos mostram que a etiologia mais frequente é a hipertensão arterial.
- d) Houve redução da mortalidade da IC por doença de Chagas no Estado de São Paulo, entre 1985 e 2006.

25) Em paciente com insuficiência cardíaca assintomática, com disfunção ventricular, **não deve ser indicado no tratamento farmacológico inicial:**

- a) Hidroclorotiazida.
- b) Carvedilol.
- c) Captopril.
- d) Associação de betabloqueador com inibidor da enzima conversora da angiotensina.

26) A fibrinólise pré-hospitalar em pacientes com infarto agudo do miocárdio:

- a) Nunca deve ser indicada.
- b) Deve ser indicada sempre, desde que não haja contraindicações.
- c) Deve ser indicada apenas para pacientes com instabilidade hemodinâmica.
- d) Deve ser indicada na impossibilidade de angioplastia ou expectativa de transporte/transferência > 90 minutos para hospital com angioplastia.

27) Sobre o eletrocardiograma (ECG) na abordagem inicial de um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale a alternativa **incorreta:**

- a) Em caso de supradesnivelamento do segmento ST em derivações da parede inferior (DII, DIII e AVF), recomenda-se a obtenção de derivações direitas e V7,V8.
- b) A realização de ECGs seriados nas primeiras horas do atendimento inicial aumenta intensamente a sensibilidade do método.
- c) A presença de supradesnivelamento do segmento ST > 1,0 e < 2 mm em derivações contíguas no plano frontal não pode ser considerado dado sugestivo de IAM.
- d) O bloqueio de ramo esquerdo novo ou o supradesnivelamento do segmento ST > 2,0 mm em derivações precordiais sugere alta probabilidade de IAM.

28) Considerando os valores referenciais do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos, todos os valores abaixo podem ser considerados **desejáveis, exceto:**

- a) LDL-colesterol entre 130-159 mg/dl
- b) HDL-colesterol < 60 mg/dl
- c) Triglicérides < 150 mg/dl
- d) Colesterol não HDL entre 130-159 mg/dl

29) Sobre as miocardites analise os itens abaixo:

- I. A miocardite pode decorrer de diversas causas infecciosas e não infecciosas sendo a miocardite secundária por infecção viral a forma mais prevalente.
- II. Na América do Sul e especialmente em algumas regiões do Brasil a miocardite chagásica causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, é a forma frequente de miocardite ou cardiomiopatia dilatada.
- III. Dentre as colagenoses temos a artrite reumatoide, a dermatomiosite e o lúpus eritematoso sistêmico como as de maior prevalência na agressão inflamatória miocárdica.

Estão corretos os itens.

- a) Apenas I.
- b) I,II e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.

30) A cardioversão elétrica **não** está inicialmente indicada em casos de:

- a) Taquicardia ventricular sem pulso.
- b) Fibrilação ventricular.
- c) Parada cardíaca em assistolia.
- d) Taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica.

31) Das doenças glomerulares abaixo **não** cursa habitualmente com síndrome nefrítico:

- a) Nefropatia por IgA.
- b) Glomerulonefrite membranoproliferativa.
- c) Glomerulonefrite associada à púrpura de Henoch-Schönlein.
- d) Glomerulosclerose segmentar e focal.

32) Nos dias atuais o tratamento farmacológico sistêmico de escolha da escabiose é a (o):

- a) Pamoato de pirantel.
- b) Terbinafina.
- c) Ivermectina.
- d) Permetrina.

33) Um paciente diabético há mais de 20 anos, com 65 anos de idade, apresenta quadro de hipertensão arterial controlada com captopril. Sua filtração glomerular estimada pela fórmula CKDF-EPI é de 83 ml/min e apresenta aos exames glicemia controlada e proteinúria de 24 horas de 700 mg. A classificação funcional desse paciente, considerando-se as diretrizes atuais da doença renal crônica seria:

- a) G2A3
- b) G1A3
- c) G2A2
- d) G1A4

34) Considerando as medidas de nefroproteção propostas pelas diretrizes atuais da doença renal crônica (DRC), **não deve ser um objetivo ou estratégia:**

- a) Manter bicarbonato sérico > 22 mEq/l.
- b) Manter pressão arterial < 130 x 80 em diabéticos com proteinúria.
- c) Manter hemoglobina glicada < 6% em todos os diabéticos.
- d) Evitar dietas com teor proteico > 1,3 g/kg/dia em pacientes com DRC.

35) Segundo a classificação internacional das doenças (CID-10) para episódio depressivo são sintomas fundamentais: a presença de humor deprimido; perda de interesse e fadabilidade. E são sintomas acessórios; concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzidas; ideias de culpa e inutilidade; visões desoladas e pessimistas do futuro; sono perturbado e apetite diminuído. Um episódio grave é aquele em que há:

- a) Dois sintomas fundamentais e mais que três acessórios.
- b) Dois sintomas fundamentais e pelo menos dois acessórios.
- c) Pelo menos um sintoma fundamental.
- d) Três sintomas fundamentais e mais que quatro acessórios

36) Sobre o tratamento do transtorno da ansiedade social (TAS), analise as sentenças abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta de cima para baixo.

- () Estudos mostram que a farmacoterapia tende a provocar resultados um pouco melhores do que a terapia cognitivo comportamental, porém o tratamento combinado se mostra superior às monoterapias.
 - () Após a remissão dos sintomas do TAS, a manutenção do tratamento medicamentoso não diminui a possibilidade de recaídas.
 - () Os benzodiazepínicos são usados freqüentemente no tratamento dos transtornos ansiosos. O clonazepam mostrou-se efetivo no tratamento do TAS com taxas de resposta significativamente superiores às do grupo placebo.
- a) V,V,V
 - b) V,F,V
 - c) F,F,F
 - d) F,V,F

37) Sobre o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), pode-se afirmar que:

- a) A migrânea pode simular um acidente vascular cerebral.
- b) Cegueira ipsilateral sugere acometimento da artéria cerebral anterior.
- c) A ressonância magnética é o exame de imagem de escolha nas fases iniciais do AVCI.
- d) Mesmo que um quadro clínico típico de AVCI reverta totalmente em até duas horas não podemos o paciente teve um ataque isquêmico transitório.

38) Sobre os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, é incorreto afirmar:

- a) A ressonância magnética convencional é exame menos sensível que a tomografia computadorizada.
- b) A ruptura de aneurismas é a causa mais comum de hemorragia subaracnóidea não traumática.
- c) O sintoma clássico da hemorragia subaracnóidea é cefaleia severa, referida pelo paciente como a pior cefaleia de sua vida.
- d) A hemorragia subaracnóidea é mais comum no sexo feminino.

39) Um paciente de 59 anos, sabidamente diabético há 7 anos, vem fazendo uso regular de metformina na dose de 850 mg 3 x dia. Sua glicemia de jejum realizada há 1 semana mostra valores de 146 mg/dl. O paciente é aderente às recomendações dietéticas. A melhor conduta seria:

- a) Associar um segundo hipoglicemiante oral.
- b) Associar insulina.
- c) Suspender metformina e introduzir insulina.
- d) Aumentar a dose de metformina.

40) Mulher adulta de 63 anos, assintomática, realizou por iniciativa própria os seguintes exames:

- 1/10/2013- Glicemia de jejum = 123 mg/dl
- 8/10/2013 - Glicemia de jejum = 120 mg/dl
- 1/10/2013 – hemoglobina glicosilada = 6,6%
- 8/10/2013 – hemoglobina glicosilada = 6,8%

A paciente deve ser considerada:

- a) Pré-diabética.
- b) Não diabética.
- c) Diabética.
- d) Portadora de intolerância à glicose.

41) Paciente de 65 anos, após viagem de ônibus de longa duração apresentou febre alta (de até 38,5°C), diarreia com presença de muco e cólicas. Apresenta-se à consulta normotenso e taquicárdico, com queda de estado geral. São solicitados hemograma e cultura de fezes. A conduta inicial deve ser:

- a) Não prescrever antibióticos e aguardar resultado de hemograma.
- b) Prescrever quinolona oral e aguardar resultado da cultura.
- c) Não prescrever antibióticos e aguardar resultado da cultura.
- d) Prescrever metronidazol.

42) Você atende um paciente masculino de 61 anos, portador de insuficiência cardíaca crônica, classe funcional I, que fez uso há dois meses de amoxicilina para tratamento de sinusite, em uma Unidade Básica de Saúde. O estado geral está de regular para bom, com temperatura de 37,8°C, PA de 124 x 84 mmHg, frequência cardíaca de 96 bpm, frequência respiratória de 18 mrpm, sem outros dados relevantes. A ausculta pulmonar revela crepitações finas na base esquerda (E), sendo que a radiografia de tórax é compatível com pneumonia em lobo inferior E. A conduta mais adequada é:

- a) Prescrever levofloxacina oral em regime ambulatorial.
- b) Prescrever claritromicina por via oral em regime ambulatorial.
- c) Penicilina G cristalina por via venosa em regime de internação.
- d) Ceftriaxone via intramuscular em regime ambulatorial.

43) Considerando as diferenças entre o sarampo e a rubéola, é incorreto afirmar que:

- a) A tosse produtiva e o corrimento seromucoso do nariz, caracteristicamente, precedem o período exantemático do sarampo.
- b) A evolução do exantema no sentido céfalo-caudal pode ocorrer em ambos.
- c) A Poliartralgia associada é caracteristicamente encontrada na rubéola.
- d) O Período de convalescença com manchas que se tornam escurecidas, surgindo descamação fina, é característico do sarampo.

44) A conduta inicial na exacerbação da asma classificada como grave deve ser:

- a) Oxigenoterapia, hidrocortisona por via venosa e a seguir nebulização com β 2-agonista.
- b) Oxigenoterapia e hidrocortisona por via venosa.
- c) Oxigenoterapia, nebulização com β 2-agonista associado com aminofilina via venosa.
- d) Oxigenoterapia e nebulização com β 2-agonista associado com brometo de ipratrópio.

45) No hiperparatireoidismo primário, além da hipercalcemia e da elevação sérica do hormônio da paratireoide (PTH), outras alterações bioquímicas associadas ao quadro, embora menos frequentemente observadas e de menor valor diagnóstico, incluem:

- a) Hipofosfatemia, elevações da $1,25(\text{OH})_2$ - vitamina D e do AMP cíclico urinário.
- b) Hipercalcúria, reduções da $1,25(\text{OH})_2$ - vitamina D e do AMP cíclico urinário.
- c) Hipofosfatemia, hipocloremia, elevação do bicarbonato sérico.
- d) Hiperfosfatemia, hipocloremia, elevação do bicarbonato sérico.

46) Uma criança deve receber ao nascer as vacinas:

- a) Tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e Haemophilus influenza tipo B), vacina contra a poliomielite, vacina contra Rotavírus e BCG.
- b) BCG e anti-hepatite B
- c) DPT (difteria, tétano, coqueluche) e vacina contra a poliomielite.
- d) DPT, tríplice viral e antimeningocócica.

47) Sobre a giardíase, assinale a alternativa incorreta:

- a) Pode ser feita a identificação de cistos ou trofozoítos, no exame direto de fezes, pelo método de Faust.
- b) A infecção pode ser adquirida pela ingestão de água proveniente da rede pública, com falhas no sistema de tratamento.
- c) É descrita a transmissão envolvendo atividades sexuais, resultante do contato oro-anal.
- d) O tratamento com tinidazol deve ser evitado em pré-escolares.

48) Entre as recomendações abaixo assinale a que não é eficaz na prevenção da ascaridíase:

- a) Não andar descalço.
- b) Ingerir vegetais cozidos.
- c) Lavar bem e desinfetar verduras cruas.
- d) Higiene pessoal e na manipulação de alimentos.

49) Um paciente com trauma cranioencefálico apresenta ao exame as seguintes condições:

- I. Apresenta abertura ocular apenas ao estímulo doloroso.
- II. Resposta verbal com palavras inapropriadas.
- III. Resposta motora com flexão anormal.

A pontuação pela escala de coma de Glasgow seria:

- a) 8
- b) 7
- c) 9
- d) 6

50) Criança de 5 anos de idade apresenta quadro de febre (até $38,7^\circ\text{C}$) que se iniciou há cerca de uma semana e praticamente não tem se alimentado. Ao exame físico há hiperemia de orofaringe com exsudato branco sobre as amígdalas e presença de petéquias no palato. Observa-se linfadenopatia cervical posterior e anterior, submandibular, além de linfonodos epitrocleares palpáveis. O baço palpável a 3 cm do rebordo costal. Não há outros dados relevantes. O hemograma mostra 14.400 Glóbulos Brancos (30% Segmentados, 1% Eosinófilos, 60% Linfócitos e 9% Monócitos) com 21% de linfócitos atípicos; Hb = 11,1 mg/dL; plaquetas = 290.000/mm³. O provável diagnóstico é:

- a) Faringoamigdalite viral por vírus Coxsackie A.
- b) Faringoamigdalite bacteriana.
- c) Mononucleose infecciosa.
- d) Difteria.

REDAÇÃO

Transcreva a redação de 15 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Na sociedade atual, estar na moda é quase uma obrigação. Adultos, jovens e até crianças buscam uma imagem ideal. Muitas vezes, pressionados pela mídia, e vivendo numa sociedade que estimula o consumo, é difícil libertar-se.

Considerando as ideias acima, busque elaborar um texto dissertativo-argumentativo com a seguinte proposição: **Escravos da moda: como libertar-se?**

5

10

15

20

25

30

RASCUNHO