

## Língua Portuguesa

- 01.** Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:
- Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
  - Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
  - Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
  - Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
  - Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.
- 02.** Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:
- Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
  - Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
  - Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
  - Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
  - Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.
- 03.** Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:
- Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
  - Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
  - Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
  - Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.
- Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
  - Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
  - Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
  - Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
  - Nenhuma das respostas
- 04.** Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.
- \_\_\_\_\_ (A, À) tarde, iremos ao cinema com \_\_\_\_\_ (AS, ÀS) crianças, voltaremos \_\_\_\_\_ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda \_\_\_\_\_ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde \_\_\_\_\_ (AS, ÀS) duas horas.
- À, ÀS, AS, À, AS
  - A, ÀS, ÀS, À, ÀS
  - A, AS, ÀS, A, ÀS
  - À, AS, ÀS, A, AS
  - A, AS, ÀS, A, AS
- 05.** Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:
- Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
  - Custou muito caro a festa do meu aniversário.
  - É bom ficar a sós com meus pensamentos.
  - Maria entregou as correspondências em mão.
  - A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.
- 1\3\5
  - 1\3\4\5
  - 1\4\5
  - 1\2\4\5
  - 1\2\3\4\5
- 06.** Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:
- Mais de um professor participou das assembleias.
  - Mais de um professor participaram das assembleias.
  - la dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
  - Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
  - Procura-se costureiras experientes.
- 1\3\5
  - 1\5
  - 1\4
  - 2\5
  - 3\4\5
- 07.** Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:
- O jogador faz o gol e corre para o abraço.
  - O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
  - Fale agora, ou se cale para sempre.
  - Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
  - Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.
- Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
  - Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
  - Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
  - Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
  - Nenhuma das alternativas está correta.

**08.** As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

**09.** Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

**10.** Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

**11.** Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

**12.** Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

**13.** Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	( ) muita sorte (norte)
2) ENSACAR	( ) engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	( ) Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	( ) lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	( ) colocar a blusa dentro da calça(nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

### Conhecimentos Específicos

**16.** Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos sintomas do trato urinário inferior (STUI) e hiperplasia benigna da próstata (HPB).

- ( ) A enucleação endoscópica dos lobos prostáticos é tipicamente realizada com KTP laser (Greenlight laser) de baixa potência 20 watts.
- ( ) Solução salina não pode ser utilizada na irrigação durante a ressecção transuretral da próstata bipolar.
- ( ) Homens com sintomas leves no IPSS são candidatos à observação com orientação (watchful waiting).
- ( ) A contração da musculatura lisa presente na cápsula prostática e no colo vesical é mediada preferencialmente por receptores alfa1A-adrenérgicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A) F – V – V – F
- B) V – V – F – F
- C) F – F – V – V
- D) V – F – V – F
- E) F – V – V – V

**17.** Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.

Por quanto tempo uma unidade renal pode permanecer obstruída completamente por um cálculo ureteral até causar dano renal irreversível?

- A) 5 dias.
- B) 1 semana.
- C) 3 meses.
- D) 6 meses.
- E) 2 a 6 semanas.

**18.** Em relação à contraindicação para o tratamento da disfunção erétil com inibidores da fosfodiesterase 5 (PDE5), assinale a alternativa CORRETA.

- A) Miocardiopatia dilatada em uso de digitálico.
- B) Miocardiopatia hipertensiva em uso de diurético.
- C) Hipertensão arterial sistêmica em uso de betabloqueadores.
- D) Diabetes mellitus em uso de metformina
- E) Miocardiopatia isquêmica em uso de nitratos.

**19.** Com relação aos fatores importantes para a escolha de tratamento de cálculos renais, entre litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOC), remoção ureteroscópica flexível e nefrolitotripsia percutânea, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Anormalidades anatômicas.
- B) Localização do cálculo
- C) Massa corporal.
- D) Composição do cálculo
- E) Tamanho do cálculo.

**20.** Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas em relação à Incontinência Urinária e ao Estudo Urodinâmico.

- ( ) A Incontinência Urinária de Esforço só pode ser diagnosticada com Estudo Urodinâmico.
- ( ) A síndrome da Bexiga Hiperativa é diagnosticada somente no Estudo Urodinâmico.
- ( ) A hiperatividade do detrusor só é diagnosticada com Estudo Urodinâmico.
- ( ) A Incontinência Paradoxal está relacionada com quadro de Obstrução Urinária infravesical (OIV).
- ( ) A obstrução infravesical só fica caracterizada pelo estudo fluxo/pressão (Q/p).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A) F – F – V – V – F
- B) F – F – V – V – V
- C) F – V – F – V – F
- D) V – V – F – F – V
- E) V – F – V – F – F

**21.** Sobre varicocele, é CORRETO afirmar que:

- A) varicocele Grau II são aquelas palpáveis sem manobra de Valsalva
- B) as varicoceles apresentam-se somente do lado esquerdo em 1/3 dos casos.
- C) a maioria dos casos de varicocele é sintomática.
- D) a maioria dos portadores de varicocele é infértil.
- E) a análise seminal deve ser considerada método diagnóstico da varicocele.

**22.** Com relação ao câncer de próstata, analise as afirmativas abaixo.

- I. Na avaliação do PSA em elevação, após o tratamento do câncer de próstata clinicamente localizado, merece destaque o Score de Gleason e o tempo de duplicação do PSA.
- II. O uso de medicamentos análogos do LHRH em câncer de próstata metastático induz imediata e consistente diminuição da testosterona circulante chegando a níveis de castração. Seu uso de forma contínua mimetiza o efeito da orquiectomia, podendo ser uma alternativa à castração cirúrgica.
- III. O Bloqueio Androgênico Completo (orquiectomia bilateral + antiandrogênico periférico) em pacientes com câncer de próstata metastático apresenta índices de sobrevida global superiores, quando comparado com a orquiectomia bilateral isolada ou com o uso isolado de antiandrogênico periférico. Isso confere ao Bloqueio Androgênico Completo o status de tratamento hormonal de primeira linha.
- IV. Existe considerável evidência científica de que a combinação de tratamento hormonal com radioterapia externa traz benefício em termos de sobrevida global, sobrevida livre de doença e sobrevida livre de progressão, no entanto o tempo ideal de manutenção da hormonioterapia após a radioterapia ainda está por ser definido.
- V. O uso de hormonioterapia em pacientes com câncer de próstata de baixo risco aumenta significativamente a mortalidade geral de causa não oncológica.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- B) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

**23.** Um homem de 25 anos, vítima de acidente de moto e trauma abdominal fechado, é admitido na emergência. Você é chamado para avaliá-lo. O paciente encontra-se estável hemodinamicamente e consciente, com hematoma na região lombar e hematúria macroscópica maciça. Frente ao quadro, qual a melhor conduta?

Assinale a alternativa correta:

- A) Ultrassonografia
- B) Urografia excretora
- C) Laparotomia exploratória
- D) Laparoscopia diagnóstica
- E) Tomografia com contraste

**24.** Em relação à disfunção erétil, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.

- ( ) 35 – 75% dos portadores de diabetes mellitus desenvolverão disfunção erétil.
- ( ) Pacientes portadores de disfunção erétil arteriogênica deverão ser avaliados para doença coronariana.
- ( ) Hipertensão arterial sistêmica é um grande risco para disfunção erétil vasculogênica.
- ( ) O tratamento oral da hipertensão arterial sistêmica sempre leva à disfunção erétil.
- ( ) O uso de cimetidina para tratamento de úlceras gástricas pode levar ao aparecimento de disfunção erétil.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A) V – V – F – V – V
- B) F – F – V – V – F
- C) V – V – V – F – V
- D) F – V – F – F – V
- E) V – V – V – V – F

**25.** Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.

Menino de 11 anos, cujos pais buscam atendimento de emergência, em virtude de um quadro de dor em hemiescroto esquerdo, de início súbito há aproximadamente 6 horas. Nesse período vomitou três vezes. Ao exame físico é observado aumento de volume no hemiescroto do mesmo lado da dor, acompanhado de hiperemia. Qual a etiologia mais frequente?

- A) Torção de uma Hidátide de Morgani.
- B) Torção do cordão espermático.
- C) Trauma local.
- D) Púrpura de Henoch-Shoenlein.
- E) Anemia falciforme

**26.** Sobre o a Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O tratamento clínico com bloqueadores da 5 alfa redutase está relacionado à disfunção erétil e alterações da ejaculação.
- B) Intoxicação por amônia é uma causa de síndrome pós RTU.
- C) Um fluxo máximo (Qmax) menor que 15ml/seg pode ser sinal de obstrução infravesical ou doença do músculo detrusor.
- D) Infecção urinária recorrente, resíduo urinário elevado e azotemia são indicações absolutas para tratamento cirúrgico.
- E) Intoxicação por amônia é uma causa de síndrome pós RTU.

**27.** Assinale o mecanismo de ação dos slings utilizado atualmente para tratamento da incontinência urinária de esforço.

- A) Redução da hiper mobilidade do colo vesical
- B) Aumento do apoio na uretra média
- C) Obstrução da uretra
- D) Produção de uma reação inflamatória periuretral
- E) Redução da hiper mobilidade do colo vesical

**28.** Assinale o tipo histológico de seminoma no qual encontramos altos níveis de hCG.

- A) Seminoma clássico
- B) Seminoma espermatocítico
- C) Teratoma
- D) Seminoma anaplásico
- E) Teratoma

**29.** Em relação à palpação do reto, em mulheres, é INCORRETO afirmar:

- A) A cérvix só não é palpada se ausente cirurgicamente.
- B) O toque bidigital não auxilia na delimitação de variações anatômicas.
- C) Tumores fibróides uterinos podem ser palpados.
- D) Um tampão vaginal pode ser confundido com lesão na parede retal.
- E) Palpação do útero retroverso fletido é indicativa de dificuldade na retossigmoidoscopia rígida.

**30.** Um paciente masculino, de 65 anos de idade, clinicamente bem, tem como diagnóstico adenocarcinoma no ceco. O diagnóstico foi feito por meio de fragmentos de biópsia obtidos por colonoscopia. A tomografia computadorizada pré-operatória é normal. Qual a conduta recomendada para esse paciente?

Assinale a alternativa correta:

- A) Colectomia direita.
- B) Colectomia direita, seguida de quimioterapia, na dependência do resultado da histopatologia da peça operatória.
- C) Quimioterapia, seguida de colectomia direita.
- D) Colectomia direita, seguida de rádio e quimioterapia, na dependência do resultado da histopatologia da peça operatória.
- E) Radioterapia, seguida de colectomia direita

**31.** O cólon normal:

Assinale a alternativa correta:

- A) absorve água, sódio e bicarbonato; secreta potássio e cloro.
- B) absorve água, potássio e cloro; secreta sódio e bicarbonato.
- C) absorve água, cloreto de sódio e bicarbonato; secreta potássio.
- D) absorve água, sódio e cloro; secreta potássio e bicarbonato.
- E) absorve água e sódio; secreta cloro, bicarbonato e potássio.

**32.** Com relação aos tumores de testículo, é incorreto afirmar:

- A) Ocorrem entre 15 e 45 anos.
- B) 95% são tumores germinativos.
- C) Seminomas representam 50% dos casos.
- D) Alfa feto proteína elevada é comum nos seminomas.
- E) Representam 1% dos tumores malignos dos homens.

**33.** Assinale a alternativa incorreta.

- A) 20% a 50% dos pacientes retomam a espermatogênese dois a três anos após o término do tratamento quimioterápico.
- B) A radiação direta do testículo é dose-dependente, sendo que doses maiores de 0,15Gy causam azoospermia reversível.
- C) Em torno de 18% dos pacientes são azoospermicos antes de qualquer tratamento para tumores de testículo.
- D) As drogas quimioterápicas são citotóxicas para os testículos, eliminando ou reduzindo as células germinativas.
- E) Aproximadamente 98% dos pacientes submetidos a RT periaórtica ficam azoospermicos.

**34.** Num espermograma, o paciente será considerado astenospermico se:

Assinale a alternativa correta:

- A) SPTZ grau D menor que 10%.
- B) SPTZ grau D menor que 15%.
- C) SPTZ grau A menor que 50% ou somatório A+ B inferior a 70%.
- D) SPTZ grau A menor que 20% ou somatório A + B inferior a 30%.
- E) SPTZ grau A menor que 35% ou somatório de A + B inferior a 50%

**35.** O diagnóstico de uma determinada doença é uma decisão baseada na avaliação de um conjunto de informações clínicas obtidas de um paciente em uma ou mais ocasiões. Entretanto, avalia-se que no atendimento ambulatorial, são extremamente comuns situações em que decisões clínicas precisam ser tomadas com base apenas em dados emiológicos. Assim, considera-se que:

Assinale a alternativa correta:

- A) fatores que se contrapõem ao ganho diagnóstico dos exames subsidiários são seus custos e aplicabilidade externa.
- B) a semiologia baseada em evidências exige que o diagnóstico clínico seja realizado a partir dos dados da história e exame físico e de seus resultados.
- C) a utilidade do exame clínico não se limita apenas ao enfoque diagnóstico, podendo ser útil também no estabelecimento prognóstico e plano terapêutico.
- D) dados da história e exame físico nem sempre possuem disponibilidade universal e em muitas ocasiões podem acarretar mais risco aos pacientes.
- E) os achados semiológicos de maior acurácia diagnóstica fortalecem potenciais riscos invasivos para o paciente.

**36.** Em relação ao herpes genital, assinale a resposta certa.

- A) A infecção é causada, na maioria das vezes, pelo vírus tipo I.
- B) Períodos de latência são incomuns.
- C) O período de incubação varia de 1 a 90 dias.
- D) As lesões primárias se manifestam como pápulas indolores em genitália ou ânus e linfonodomegalia inguinal bilateral dolorosa.
- E) O diagnóstico diferencial pode incluir Síndrome de Reiter, psoríase e líquen plano.

**37.** Em relação a um paciente que apresenta achado incidental em exame tomográfico de cisto renal tipo Bosniak I, assinale a alternativa correta.

- A) Não há necessidade de se manter vigilância.
- B) Deve ser acompanhado anualmente através de exame tomográfico.
- C) O risco de malignidade varia de 0 a 5%.
- D) Deve ser abordado cirurgicamente se o diâmetro for maior que 8cm.
- E) Este tipo de cisto apresenta conteúdo homogêneo, sem calcificações e com finos septos.

**38.** Qual o segmento ureteral mais comumente afetado no paciente que apresenta uretrite tuberculosa?

- A) Junção ureteropielica.
- B) Junção ureterovesical.
- C) Terço ureteral proximal.
- D) Terço ureteral médio.
- E) Terço ureteral distal.

Assinale a alternativa correta:

**39.** Qual dos sintomas abaixo tende a aparecer primariamente como resposta da bexiga à obstrução infravesical?

Assinale a alternativa correta:

- A) Hesitação pré-miccional.
- B) Fluxo urinário intermitente.
- C) Urgência.
- D) Gotejamento pós-miccional.
- E) Aumento do resíduo pós-miccional.

**40.** São complicações da hiperplasia prostática benigna, EXCETO:

Assinale a alternativa correta:

- A) infecção do trato urinário.
- B) litíase vesical.
- C) incontinência urinária.
- D) refluxo vesicoureteral.
- E) hematúria