

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

CIRURGIÃO DENTISTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2015

COMPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – CIRURGIÃO DENTISTA

01 - O movimento da Reforma Sanitária brasileira teve seu apogeu com a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), a criação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária e com a instituição do Sistema Único de Saúde, pela Constituição de 1988. A Constituição de 1988 promove avanços e são inquestionáveis os progressos assegurados no campo da saúde. Assinale a alternativa abaixo que NÃO pode ser considerado um avanço no campo da saúde trazido pela Constituição de 1988.

- A) a mudança na forma de organização do Sistema - com destaque para a descentralização - tendo na esfera federal do governo a única responsável pela direção do sistema
- B) a mudança de concepção de saúde
- C) o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde
- D) a mudança da lógica curativa sobre a preventiva, ao propor o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais
- E) a participação da comunidade, enquanto a alimentadora, a orientadora e controladora do sistema

02 - Definir o gerenciamento do processo de descentralização nos três níveis de governo, através da Comissão Intergestores Tripartite, das Comissões Intergestores Bipartites e dos Conselhos Municipais, bem como as condições de gestão para municípios (Incipiente, Parcial e Semi-Plena) e estados (Parcial e Semi-Plena), que buscam exatamente contemplar os diferentes estágios em que se encontram estados e municípios, em relação à descentralização. A descrição anterior pode ser atribuída a um objetivo pertencente a qual instrumento normatizador do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A) NOB 01/91
- B) NOB 01/92
- C) NOB 01/93
- D) NOB 01/96
- E) NOB 01/94

03 - Leia as afirmativas abaixo relacionadas ao controle social no Sistema Único de Saúde:

I - As diretrizes para criação, reformulação, assim como funcionamento dos conselhos de saúde foram definidos pela Resolução no 333/03, na qual consta que os mesmos devem “atuar na formulação e proposição de estratégia no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros”.

II - A Lei no 8.142/90 estabelece a representação de diferentes segmentos da sociedade civil nas conferências e conselhos de saúde, nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal.

III - O Conselho de Saúde tem caráter permanente e consultivo. Composto paritariamente por representantes do governo, prestadores profissionais de serviço da saúde e usuários.

IV - Os conselhos podem ser instrumentos privilegiados para fazer valer os direitos, rompendo com as tradicionais formas de gestão, possibilitando a ampliação dos espaços de decisões/ações do poder público, impulsionando a constituição de esferas públicas democráticas.

V - A Lei n.º 8.142 estabeleceu uma periodicidade de três anos para a realização das Conferências de Saúde, que deveriam contar, necessariamente, com a participação dos movimentos sociais organizados, das entidades ligadas à área da Saúde, dos gestores e dos prestadores de serviços de saúde.

Podemos AFIRMAR que:

- A) Apenas as afirmativas I; II; III e IV estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I; II e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- D) As afirmativas I; II; III; IV e V estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

04 - Assinale abaixo a alternativa que corresponde ao conjunto de reformas institucionais do SUS, acordado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo em que redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social.

- A) NOB 01/91
- B) NOAS
- C) Lei 8142/90
- D) Pacto da Atenção Básica
- E) Pacto pela Saúde

05 - A cárie de estabelecimento precoce, também conhecida como “cárie de mamadeira”, é considerada um sério problema de saúde pública, que atinge crianças no mundo todo. Sobre este problema de saúde pública, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A cárie de estabelecimento precoce apresenta um padrão de desenvolvimento que é indefinido e simétrico, iniciando pelo terço incisal da face vestibular dos dentes anteriores superiores.
- B) O sinal clínico inicial da doença cárie na infância é a presença de manchas brancas e opacas, que são áreas desmineralizadas pela presença de biofilme dental. A evolução é o aparecimento de cavidades com perda de estrutura dental que, se não interrompida, pode levar a destruição de toda a coroa do dente.
- C) A American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) classifica cárie precoce na infância como a presença de um ou mais dentes decíduos cariados (lesões cavitadas ou não), perdidos (devido à cárie) ou restaurados antes dos 71 meses de idade.
- D) Crianças que apresentam defeito de desenvolvimento de esmalte são mais vulneráveis ao desenvolvimento da doença cárie se expostas às situações de risco.
- E) O consumo frequente de sacarose, associado ao inadequado controle do biofilme dental podem provocar este tipo de situação.

06 - Em relação à Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

I - A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável.

II - A Atenção Básica representa a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, em consonância com o princípio da equidade.

III - Um aspecto fundamental para efetivação da Atenção Básica é a promoção de saúde, que é uma estratégia de articulação transversal que objetiva a melhoria na qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde, por meio da construção de políticas públicas saudáveis

IV - A Atenção Básica pode ser definida como um conjunto de ações, individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

V - A Atenção Básica tem como um dos seus fundamentos estimular a participação popular e o controle social.

Escolha a alternativa correta:

- A) Existem três afirmativas corretas.
- B) Existe apenas uma afirmativa correta.
- C) Todas as afirmativas estão corretas.
- D) Existem quatro afirmativas corretas.
- E) Existem duas afirmativas corretas.

07 - Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”. Esse documento aponta para uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção. Identifique abaixo o que NÃO pode ser considerado como um destaque dessas diretrizes:

- A) O cuidado como eixo de reorientação do modelo.
- B) A co-responsabilização dos serviços.
- C) Desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do cuidado, como por exemplo, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso.
- D) Desenvolvimento de ações complementares e imprescindíveis voltadas para as condições especiais de vida como saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, dentre outras.
- E) Priorizar a atenção aos escolares do sistema público de primeiro grau com enfoque curativo-reparador em áreas estratégicas do ponto de vista econômico.

08 - Quantos dos princípios operacionais abaixo podem ser atribuídos à Estratégia Saúde da Família?

- Descrição da clientela
 - Territorialização
 - Trabalho em equipe multiprofissional
 - Intersetorialidade
 - Planejamento local e situacional
 - Práticas centradas no cuidado individual
 - Vínculo
- A) 3
 - B) 4
 - C) 5
 - D) 6
 - E) 7

09 - A notificação consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais e/ou agregados de casos ou surtos definidos na Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. A partir da portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, é CORRETO afirmar que:

- A) A notificação compulsória é obrigatória apenas para os médicos.
- B) A notificação compulsória será realizada diante somente da confirmação de doença ou agravo.
- C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- D) A autoridade de saúde que receber a notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 72 horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS.
- E) As autoridades de saúde garantirão a divulgação das informações pessoais integrantes da notificação compulsória a que estejam sob sua responsabilidade.

10 - Realizando uma comparação entre os resultados obtidos, a partir do levantamento epidemiológico SB BRASIL 2003 com o SB BRASIL 201, é INCORRETO afirmar que:

- A) O CPO - D aos 12 anos caiu 26% nos últimos sete anos no país.
- B) Todas as regiões do Brasil melhoraram o índice CPO-D entre 2003 e 2010 – exceto a região Centro-oeste, que teve ligeiro aumento.
- C) A proporção de crianças livres de cárie aos 12 anos cresceu de 31% para 44%.
- D) Caiu pela metade o número de adolescentes (15-19 anos) que sofreram algum tipo de perda dentária.
- E) Aumenta acesso da população adulta (35 a 44 anos) ao tratamento da cárie.

11 - Sintomas como: diarreia, dor abdominal, disfagia, hipersalivação, lesão da mucosa, náuseas, vômitos e alterações eletrolíticas podem ser atribuídos à:

- A) Fluorose
- B) Infecção cruzada
- C) Resina composta
- D) Intoxicação aguda por flúor
- E) Dentifrícios não fluoretados

12 - O mercúrio está presente na composição do amálgama. É o único metal que evapora à temperatura ambiente e tem alta potência de toxicidade. Quando o amálgama é removido, pode haver a vaporização e dispersão de partículas mercúrio e haver inalação, ingestão ou o contato com a pele, acarretando efeitos colaterais a quem está manipulando (dentista e equipe auxiliar). Para minimizar a exposição ao mercúrio – inalação, ingestão e contato com a pele é importante que sejam seguidas algumas recomendações de biossegurança. Assinale abaixo a alternativa que NÃO está de acordo com as medidas preconizadas durante a remoção das restaurações de amálgama:

- A) Deverá ser feitas com uso de sugador e brocas com um bom poder de corte e sob isolamento relativo.
- B) Uso de Equipamento de proteção individual completo;
- C) Irrigação abundante se possível com água gelada no reservatório para utilizar com a caneta de alta rotação.
- D) Colocar o resíduo do amálgama em um pote fechado com água, deixando longe de fontes de calor, como a autoclave
- E) Dispensar os resíduos em uma coleta especial de lixo.

13 - O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática diária. Precauções-padrão ou básicas são medidas de prevenção que devem ser utilizadas, independente de diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível no indivíduo-fonte. As seguintes medidas devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, com EXCEÇÃO de:

- A) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
- B) Manipular cuidadosamente o material perfuro-cortante.
- C) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas das seringas. Se o paciente precisar de complementação anestésica de uma única seringa, a agulha pode ser reencapada pela técnica de deslizar a agulha para dentro da tampa deixada sobre uma superfície (bandeja do instrumental ou mesa auxiliar).
- D) Transferir os materiais e artigos, durante o trabalho a quatro mãos, com toda a atenção e, sempre que possível, utilizando-se uma bandeja.
- E) Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso e preenchê-las apenas até a sua capacidade limite total.

14 - Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. O profissional deve estar atento às características da região e da população a ser atendida, pois diferentes vacinas podem ser indicadas. Em relação ao esquema vacinal contra as principais doenças infecciosas relacionadas à prática odontológica, é correto afirmar que:

- A) Para a hepatite B, a vacinação deve ser feita em três doses, em períodos de zero, seis meses e dois anos de intervalo; um mês após o esquema vacinal completo, recomenda-se a realização de testes sorológicos para verificar a soro conversão das pessoas vacinadas.
- B) A vacina SRC (Tríplice viral), contra sarampo, caxumba e rubéola, deve ser feita duas doses, com intervalo de seis meses.
- C) A vacinação contra tuberculose (BCG – ID) deve ser realizada em dose única para aqueles que não forem reagentes ao teste tuberculínico.
- D) A vacina contra influenza e pneumococos tem seu esquema composto por uma dose a cada ano para gripe e reforço após dez anos para pneumonia.
- E) A vacinação contra difteria e tétano (vacina DT) requer duas doses no esquema básico e uma dose de reforço a cada cinco anos.

15 - A gengivite é a doença periodontal mais frequente na população, estando amplamente distribuída em todo o mundo como um problema de saúde pública. Acomete o periodonto de proteção, sendo o primeiro estágio da inflamação periodontal. O tratamento da gengivite é melhor descrito de que forma:

- A) A partir de bochechos a base de clorexidina a 0,12% por 15 dias, juntamente com o uso de anti-inflamatórios.
- B) A primeira fase é associada à causa (remoção do biofilme), depois, se houver indicação, realiza-se a fase corretiva (raspagem e alisamento corono radicular), que serão seguidas pela fase de manutenção.

- C) Solicitação de Rx, para verificar o quanto de osso foi perdido, então realiza-se a terapia periodontal básica.
- D) Primeiro se faz uso de antibióticos, para remoção da fase aguda, somente após procede-se à terapia periodontal básica.
- E) A raspagem e o alisamento da coroa e da raiz do dente envolvido é recomendada, pois irá provocar uma modificação biológica no periodonto de sustentação, que pode estar inicialmente comprometido.

16 - Paciente JAOM compareceu à Unidade Básica de Saúde apresentando o elemento dentário 26 com um quadro de abscesso. Existe alguma implicação na dissolução da solução anestésica nesta situação? Justifique.

- A) Não. A anestesia pode ser realizada normalmente.
- B) Sim. A presença de inflamação deixa os tecidos com pH básico, por isso não há a dissolução do anestésico local, pois o mesmo também é uma solução básica.
- C) Sim. A presença de inflamação deixa os tecidos com pH maior, por isso não há a dissolução do anestésico local, pois o mesmo é uma solução ácida.
- D) Sim. Os tecidos infectados tendem a ser um meio mais ácido que o habitual. Como há redução no pH local, há menor fração não-ionizada de anestésico local e por isso o efeito será mais lento e reduzido.
- E) Não. A anestesia pode ser realizada normalmente, porém a quantidade da solução anestésica deve ser o dobro da normal.

17 - A fluoretação da água de abastecimento público configura o principal método coletivo de uso do flúor. Considerando esse método, é INCORRETO afirmar que:

- A) Todos os métodos preventivos baseados na utilização de flúor promovem aumento de sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de des e remineralização, independentemente da forma de utilização, seja sistêmica (Ex: fluoretação da água) ou seja tópica (Ex: aplicação tópica de flúor).
- B) A fluoretação das águas de abastecimento público se fundamenta no fato de que compostos de flúor, na forma sólida ou solução aquosa, podem ser adicionados às águas de abastecimento público para agirem na prevenção da cárie dentária. Os produtos mais frequentemente empregados no Brasil para fluoretação das águas são o fluorsilicato de sódio e o ácido fluossilícico.
- C) Desde 1974, a agregação de flúor ao tratamento das águas de abastecimento (fluoretação das águas) é obrigatória no Brasil, com base na Lei Federal nº 6.050, de 24/5/1974 e regulamentada pelo Decreto nº 76.872, de 22/12/1975.
- D) Ações de vigilância sanitária devem ser realizadas de modo que as empresas fornecedoras de água orientem sua operação para atingir e manter o padrão. Não sendo perene o efeito preventivo obtido durante o período de exposição, a interrupção da fluoretação faz cessar o benefício.
- E) A efetividade da fluoretação das águas de abastecimento público depende da continuidade da sua execução, durante anos seguidos, e da manutenção do teor adequado de flúor. O teor adequado e a variação aceitável são definidos de acordo com a variação da temperatura no local. O Valor Máximo Permitido – VMP de fluoreto é 2,5 ppm, ou seja, 2,5 mg de fluoreto por litro de água.

18 - O dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor. Sua utilização tem sido considerada responsável pela diminuição nos índices de cárie observados hoje em todo mundo. Marque abaixo a alternativa CORRETA sobre o uso dos dentifrícios fluoretados:

- A) Crianças em idade pré-escolar, na fase de desenvolvimento do esmalte dentário dos dentes permanentes, apresentam risco para o desenvolvimento de fluorose dentária. Dessa forma, tem sido recomendado para esse público dentifrício com baixa concentração de fluoretos (cerca de 500 ppm F).
- B) A concentração de flúor adicionada aos dentifrícios, usualmente em torno de 800 a 1000 ppm, tem, comprovadamente, efeito sobre a prevalência e gravidade da cárie nas populações.
- C) O NaF não deve ser agregado a dentifrícios contendo Ca como abrasivo, por exemplo, o carbonato de cálcio, pois ocorre a ligação do flúor com o cálcio do abrasivo, formando-se fluoreto de cálcio (CaF₂) dentro do tubo e não no dente.
- D) O dentifrício fluoretado apresenta uma ação benéfica na prevenção das cáries porque aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca de 90 minutos após a escovação.
- E) A concentração de flúor adicionada aos dentifrícios em torno de 1.100 ou 1.500 ppm é indicada para toda a população em pequenas quantidades (cerca de 0,3 gramas, equivalente a um grão de arroz), com exceção das crianças menores de nove anos de idade.

19 - Mucosa vermelha ou ulcerada, coberta com uma pseudomembrana, predominantemente na mucosa jugal, língua e assoalho, gosto desagradável, ardência, hálito amoniacal, além de alterações do paladar, gengivite, xerostomia e parotidites são características clínicas de qual patologia descrita abaixo?

- A) Diabetes Mellitus
- B) Estomatite Urêmica
- C) Hipofosfatasia
- D) Doença de Addison
- E) Pioestomatite Vegetante

20 - A emergência consiste em agravo a saúde com iminente risco de vida. Este evento caracteriza-se por ser uma situação imprevista, na qual não pode haver demora no atendimento. Leia as afirmativas abaixo relacionadas com as emergências médicas no consultório odontológico e assinale a alternativa CORRETA:

1- Na tentativa de se prevenir situações emergenciais é imprescindível a realização de uma pré- avaliação da saúde geral do paciente e seu estado emocional antes do atendimento odontológico, conhecendo os riscos da utilização das drogas a serem empregadas e minimizando o trauma emocional.

2- As situações de emergências médicas podem acontecer a qualquer momento em um consultório odontológico, não apenas durante o tratamento, mas também na sala de espera, por exemplo

3- A Angina Pectoris é definida como uma dor torácica retroesternal transitória, ocasionada pela diminuição regional do fluxo sanguíneo coronário quando o trabalho cardíaco e demanda de oxigênio excedem a capacidade do sistema arterial coronariano de fornecer sangue oxigenado. Dentre os principais sintomas, a dor ou desconforto no peito é o principal, sendo descrito como um “esmagamento ou queimadura”, acompanhado de sudorese aumentada, palidez e agitação.

4- Os sinais e sintomas da hipoglicemia se desenvolvem rápida e progressivamente, porém caracterizasse inicialmente por náuseas, sensação de fome e alteração no humor e espontaneidade. Em seguida ocorre sudorese, taquicardia, aumento da ansiedade, não cooperação e agressividade. Posteriormente, em fase tardia, são comuns convulsões, perda de consciência, diminuição da pressão arterial e temperatura corporal. Diante desse quadro deve-se interromper o atendimento odontológico e fazer com que o paciente ingira carboidratos simples de rápida absorção (doce, refrigerante, mel), caso ele esteja consciente.

5 - A síncope é caracterizada como a perda temporária e momentânea da consciência, devido a uma diminuição da oxigenação cerebral, consequência da redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Seus sinais e sintomas correspondem à palidez, hipotensão, taquicardia, escurecimento da visão, zumbido, sonolência e sensação de vazio gástrico. Diante deste quadro o cirurgião-dentista deve interromper o tratamento, avaliar o grau de consciência do paciente, colocá-lo em posição supina com os membros inferiores levemente abaixados em relação à cabeça (10 a 15 graus). Deve-se estender a cabeça para frente, propiciando a passagem de ar, e aguardar de 2 a 3 minutos à recuperação do paciente.

- A) Existem três afirmativas corretas e duas falsas.
- B) Existem duas afirmativas corretas e três falsas.
- C) Existem quatro afirmativas corretas e uma falsa.
- D) Existem uma afirmativa correta e quatro falsas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

21 - A metemoglobinemia pode ser definida como uma alteração hematológica, em que hemoglobina é oxidada formando a metemoglobina, impedindo a molécula de transportar oxigênio. Desenvolve-se dessa forma um quadro semelhante à cianose, na ausência de alterações cardíacas ou respiratórias. A metemoglobinemia é capaz de resultar de erros inatos do metabolismo, ou ser provocada ainda por agentes químicos que aumentam a taxa de oxidação da hemoglobina. Este último mecanismo é responsável pela doença tóxica ou adquirida, a qual já foi bem demonstrada após a administração de doses elevadas de qual anestésico local abaixo utilizado no tratamento odontológico?

- A) Bupivacaína
- B) Mepivacaína
- C) Articaina
- D) Lidocaína
- E) Prilocaína

22 - Abordando a cárie dentária, analise as sentenças abaixo e escolha a alternativa CORRETA:

1. As filosofias de tratamento da cárie têm sido voltadas para uma abordagem mais conservadora, baseadas no controle do processo da doença, de modo a adiar ao máximo o procedimento restaurador.
2. Evidências de que a doença cárie e seus aspectos clínicos, as lesões de cárie, podem ser controladas por tratamento não invasivos já estão bem estabelecidas na literatura.
3. Após o controle da atividade de cárie do paciente, lesões iniciais em esmalte (lesão sem cavitação), brancas, lisas e brilhantes, podem ter sua progressão paralisada, tornando-se opacas e rugosas.
4. O tratamento restaurador está diretamente ligado a um correto diagnóstico da lesão quanto a sua extensão e possibilidade de controle.
 - A) As sentenças 1, 2 e 3 estão corretas.
 - B) As sentenças 2 e 3 estão corretas.
 - C) As sentenças 2, 3 e 4 estão corretas.
 - D) Todas as sentenças estão corretas.
 - E) As sentenças 1, 2 e 4 estão corretas.

23 - Atualmente, sabe-se que, pelo menos, 25 doenças diferentes estão relacionadas ao tabagismo e, nas últimas décadas, a literatura vem demonstrando uma associação entre o tabagismo e a doença periodontal. Com base nisso, identifique a alternativa FALSA a respeito do tabagismo e da doença periodontal.

- A) Fumantes apresentam maior velocidade de progressão da doença periodontal e maior risco de perda dentária.
- B) Sendo o tabagismo um importante fator de risco para a periodontite, a alta prevalência de fumantes em qualquer população torna o hábito de fumar um alvo possível para intervenção em saúde pública.
- C) O cirurgião-dentista inserido na Estratégia Saúde da Família (ESF) exerce papel importante na prevenção e promoção da saúde ao conscientizar o usuário quanto aos malefícios causados pelo tabagismo, tanto na saúde geral como na saúde bucal.
- D) Nos fumantes, os sinais da doença periodontal podem ser exacerbados pelas alterações na resposta inflamatória gengival, facilitando o diagnóstico precoce.
- E) O fumo, além de ser fator de risco para doença periodontal pode predispor ao mau hálito, câncer de boca e a manchas nos dentes.

24 - No tocante ao câncer de boca, qual das alternativas abaixo NÃO pode ser considerada verdadeira:

- A) O cirurgião-dentista é o profissional mais indicado para suspeitar, confirmar, encaminhar o paciente para o tratamento e acompanhá-lo, tentando reabilitá-lo funcional e esteticamente, a fim de dar-lhe condições para sua reinserção social.
- B) A literatura tem associado o câncer de boca à pobreza, já que indicadores de mortalidade e morbidade são piores nas áreas de baixo nível socioeconômico.
- C) O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e os Registros Hospitalares de câncer (RCH) têm representado importantes bases de dados para ocorrência das mais variadas formas de câncer no país, com exceção do câncer de boca.

D) Os dois principais fatores de risco relacionados ao câncer de boca são o hábito de fumar e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

E) O prognóstico do paciente com câncer de boca depende da área da cavidade oral comprometida e do estadiamento do sistema TNM (Classificação de Tumores Malignos).

25 - A _____ é consequência do uso de anticonvulsivantes à base de fenil-hidantoína e apresenta como características clínicas a hiperplasia gengival generalizada, com a alteração se manifestando mais em crianças do que em adultos. Aumento do volume da gengiva, podendo cobrir parcialmente as coroas dentárias, possibilitando a criação das chamadas bolsas falsas.

O espaço acima pode ser preenchido com:

- A) Hiperplasia Dilatatória
- B) Hiperplasia Fibrosa
- C) Fibrose Gengival Adquirida
- D) Periodontite Agressiva
- E) Gengivite Atípica

26 - A implantação de diretrizes ergonômicas para orientação de postura adequada, formas de tratamento, manuseio de instrumentais e adequação do consultório odontológico no tratamento de pacientes é extremamente importante. Identifique abaixo a alternativa que NÃO está correta em relação aos requisitos que devem ser respeitados para a adoção de uma postura saudável para o trabalho sentado durante o atendimento odontológico:

- A) Para que o trabalho sentado seja ergonomicamente correto, deve-se trabalhar com as costas relativamente retas e apoiadas no encosto do mocho, os pés devem permanecer completamente apoiados sobre o solo, distribuindo o peso uniformemente, reduzindo a carga sobre as nádegas e sobre a região posterior das coxas, além de manter a posição de equilíbrio, pois a pressão aplicada na região poplíteia pode levar a edema das pernas e pressão sobre o nervo ciático.
- B) A posição da cabeça do dentista deve ser ligeiramente inclinada para frente e para baixo, evitando a curvatura excessiva do pescoço, e a distância média recomendada entre os olhos do profissional e a boca do paciente deve ser de 30 a 40 cm.
- C) As coxas devem estar paralelas ao chão e com o ângulo formado com a perna entre 90° e 120°, pois quanto menos aumenta essa angulação, maior será a compressão da circulação venosa, o que causa desconforto e favorece o aparecimento de varizes nos membros inferiores.
- D) O tronco pode ser inclinado para frente, a partir da sua junção com o quadril, até um máximo de 10° a 20°, mas inclinações para os lados/lateralmente e rotações devem ser evitadas.
- E) O pedal de acionamento deve estar posicionado próximo em relação a um dos pés de maneira que o pé não tenha que ser direcionado lateralmente durante sua operação.

27 - A Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde (BRASIL, 1994), recomenda considerar no processamento de artigos que:

- A) Independentemente do processo a ser submetido, todo artigo deverá ser considerado como contaminado, sem levar em consideração o grau de sujidade presente.
- B) Os passos seqüenciais devem ser limpeza ou descontaminação, desinfecção e/ou esterilização e estocagem, conforme o objetivo do artigo.
- C) É necessário classificar o artigo de acordo com o risco potencial de infecção envolvido em seu uso e definir o tipo de processamento a que será submetido (desinfecção ou esterilização).
- D) Para que a remoção da sujidade ou matéria orgânica não se constitua em risco à pessoa que os manuseia e ao local onde esta limpeza ou descontaminação é realizada, é imprescindível o uso de EPI.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

28 - Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, para instituir a Aplicação Tópica de Flúor (ATF) recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal NÃO é recomendada para populações nas quais se constate uma das seguintes situações:

- A) exposição à água de abastecimento sem flúor
- B) exposição a flúor na água há menos de 6 meses
- C) exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F)
- D) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade
- E) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas a vila é ainda demasiado rural, falta-lhe a geometria dos espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não são apenas casa destruídas: é o próprio tempo desmoronado. [...]

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e cantam, homens falam alto, donos do tempo.

COUTO, Mía. *Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 27-28. (Fragmento).

29 - Das afirmações seguintes:

- I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão.
- II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência.
- III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO aparecem, no trecho, em um contexto comum porque explicitam atributos próprios dos termos a que se referem.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Apenas o item I está correto.
- E) Estão corretos apenas os itens I e II.

30 - Das afirmações seguintes:

I. O uso dos adjetivos EXAUSTO e DESMORONADO (1º parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua descrição de “Luar-do-Chão”.

II. No segundo parágrafo identificamos o verbo “empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna de orgulho dos que a usufruem.

III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções claramente particulares.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)?

- A) secos
- B) alto
- C) derramada
- D) mau-olhado
- E) cheirosa

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor eu a imagem de decadência pode ser algo percebido somente pelo narrador. Que expressão é essa?

- A) mais além
- B) no entanto
- C) mau-olhado
- D) à primeira vista
- E) donos do tempo

33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem presente no cartum abaixo:



- A) pleonasmos
- B) metonímia
- C) hipérbole
- D) catacrese
- E) eufemismo

34 - Observe as orações seguintes:

I. Ando muito distraída ultimamente.

II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar.

Assinale a alternativa incorreta com relação as orações:

- A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal.
- B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de ligação e está associado a um predicativo de sujeito.
- C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está associado a um adjunto adverbial.
- D) A oração I apresenta predicado nominal.
- E) A oração II apresenta predicado verbal.

35 - A alternativa que completa corretamente a sentença “__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de consulta” é:

- A) À - à - a
- B) A - a - à
- C) A - à - a
- D) A - à - à
- E) A - a - a

36 - Leia a tira seguinte:




A legião. *Jornal da Tarde*, São Paulo, 15 out. 2003.

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo do seguinte processo de formação das palavras:

- A) parassíntese
- B) derivação regressiva
- C) composição por aglutinação
- D) derivação imprópria
- E) neologismo

A questão 37 refere-se a tira seguinte:



DAVIS, Jim. *Garfield* — Toneladas de diversão. Porto Alegre: L&PM, 2006. p. 102.

37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte voz verbal:

- A) voz passiva pronominal
- B) voz passiva analítica
- C) voz ativa
- D) voz reflexiva
- E) nenhuma das respostas anteriores.

38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é possível identificar a seguinte conjunção:

- A) subordinativa concessiva
- B) subordinativa condicional
- C) subordinativa conformativa
- D) subordinativa consecutiva
- E) coordenativa explicativa

39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, a função sintática do termo destacado é:

- A) objeto direto
- B) aposto
- C) índice de indeterminação do sujeito
- D) sujeito de infinitivo
- E) objeto indireto

40 - A regência nominal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) O casal estava aflito pela chegada do filho.
- B) Você está apto à função.
- C) O estudo deveria ser acessível para todos.
- D) Ela ficou imbuída em lembranças.
- E) Tenho respeito para com meus pais.