

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA – QUADRO DE APOIO À
SAÚDE / CP-CSM-S/2015)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) Qual desses produtos utilizados em curativos promove o desbridamento autolítico?
- (A) Papaína.
 - (B) Hidrocoloide.
 - (C) Colagenase.
 - (D) Fibrinolisinina.
 - (E) Ácidos graxos essenciais.
- 2) O choque que tem como característica clínica a estimulação parassimpática e a hipotensão com bradicardia, é denominado
- (A) neurogênico.
 - (B) hipovolêmico.
 - (C) cardiogênico.
 - (D) séptico.
 - (E) anafilático.
- 3) A hiperglicemia matinal ocorre por diversos fatores. Dentre esses fatores, aquele que se caracteriza por um nível glicêmico relativamente normal, até aproximadamente 3h da manhã, quando os níveis de glicose sanguínea começam a se elevar, é denominado
- (A) resistência à insulina.
 - (B) efeito Somoghi.
 - (C) fenômeno da alvorada.
 - (D) elevação da insulina.
 - (E) declínio da insulina.
- 4) O mecanismo do trabalho de parto é a sequência de movimentos passivos. Como é denominado o movimento pelo qual a cabeça do feto penetra na pelve?
- (A) Flexão.
 - (B) Rotação externa.
 - (C) Extensão.
 - (D) Descida.
 - (E) Acomodação.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 5) Assinale a opção que apresenta uma característica da doença de Whipple.
- (A) A perda da superfície de absorção ileal leva à absorção reduzida de vitamina B12.
 - (B) A hiperacidez no duodeno inativa as enzimas pancreáticas.
 - (C) Má digestão de lipídios e proteínas pela atividade reduzida das enzimas pancreáticas.
 - (D) Invasão bacteriana da mucosa intestinal.
 - (E) Defesas intestinais locais diminuídas, hiperplasia linfoide e linfopenia.
- 6) Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, o suicídio é dividido em três categorias sociais: egoístas, altruístas e anômicos. O suicídio anômico aplica-se às pessoas que
- (A) não se integram fortemente a nenhum grupo social.
 - (B) são propensas a suicídio em decorrência de excessiva integração dentro de um grupo, sendo o ato do suicídio resultado da integração.
 - (C) a integração na sociedade é tão perturbada que não é possível seguir normas de comportamentos habituais, apresentando instabilidade.
 - (D) apresentam fantasias, desejo de vingança, poder e culpa.
 - (E) sentem necessidade de automutilação, com cortes superficiais na pele, alegando não sentir dor.
- 7) De acordo com Hockenberry & Winkelstein (2006), dentre os períodos de desenvolvimento por idade da criança, aquele descrito como o período que se estende do momento em que a criança atinge a locomoção em pé até entrar na escola é denominado
- (A) pré-natal.
 - (B) infância.
 - (C) primeira infância.
 - (D) meio da infância.
 - (E) fim da infância.

- 8) No paciente com diagnóstico de morte encefálica, o tratamento tem por objetivo a manutenção do doador, considerando o consentimento familiar. Com relação a essas informações, é INCORRETO afirmar que
- (A) a morte encefálica provoca o desaparecimento de mecanismos hipotalâmicos centrais de termorregulação.
 - (B) ocorrem alterações da função renal e depressão miocárdica.
 - (C) deve-se aumentar o volume minuto ou diminuir o espaço morto para manter a normocapnia.
 - (D) deve-se reduzir a hiperventilação e manter os menores níveis possíveis de fração de inspiração de oxigênio.
 - (E) a hiperglicemia é frequente em pacientes com morte encefálica.
- 9) Na avaliação dos reflexos no recém-nascido, o reflexo De Lusca consiste em
- (A) ao acariciar a bochecha ao lado da boca, o lactente vira a cabeça para este lado e começa a sugar.
 - (B) a pupila se contrai quando uma luz intensa brilha em sua direção.
 - (C) toque rápido sobre a glabella provoca o fechamento rápido dos olhos.
 - (D) um ruído súbito e alto provoca a abdução dos braços com a flexão dos cotovelos.
 - (E) o lactente cessa os movimentos de sucção na área perioral em resposta à estimulação.
- 10) De acordo com o Código de ética dos profissionais de enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), uma das responsabilidades e deveres desse profissional é
- (A) obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão.
 - (B) apoiar iniciativas que visem ao aprimoramento profissional.
 - (C) exercer a enfermagem com liberdade e autonomia.
 - (D) aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos.
 - (E) exercer a profissão com competência e responsabilidade.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 11) Que patologia apresenta uma degeneração neuronal que envolve neurônios motores superiores e/ou inferiores, com manifestação de espasticidade e reflexos tendinosos hiperativos?
- (A) Doença de Huntington.
 - (B) Esclerose lateral amiotrófica.
 - (C) Distrofias musculares.
 - (D) Doença de Alzheimer.
 - (E) Doença de Parkinson.
- 12) O ofidismo é o envenenamento provocado pela ação das toxinas, através de aparelho inoculador de serpentes, podendo determinar alterações locais ou sistêmicas. As manifestações sistêmicas de um acidente crotálico causado por serpentes do gênero *Crotalus* têm como consequência:
- (A) edema tenso e equimose.
 - (B) dor e adenomegalia.
 - (C) paralisia neuromuscular.
 - (D) necrose com amputação.
 - (E) náusea, vômito e diarreia.
- 13) A concussão é uma lesão cranioencefálica que apresenta como característica:
- (A) lesão grave do cérebro com possível hemorragia superficial.
 - (B) acúmulo de sangue no espaço epidural.
 - (C) coleção de sangue entre a duramáter e o cérebro.
 - (D) perda temporária da função neurológica sem danos evidentes.
 - (E) distorção do cérebro e aumento da pressão intracraniana.

- 14) Sobre os cuidados no tratamento do edema cerebral pós-trauma cranioencefálico (TCE), é INCORRETO afirmar que
- (A) nas primeiras horas, a hiperventilação é a forma mais rápida e efetiva de controlar a pressão intracraniana (PIC).
 - (B) deve-se manter a cabeça reta e entre 30 e 45 graus.
 - (C) a alcalose excessiva devido à hiperventilação empregada diminui o risco de isquemia.
 - (D) é recomendado o uso do manitol apenas com a monitorização da pressão intracraniana (PIC).
 - (E) o manitol pode provocar alterações no equilíbrio hidro-eletrolítico, especialmente hiponatremia.
- 15) As gestantes portadoras do vírus HIV deverão iniciar a profilaxia da transmissão vertical com terapia antirretroviral tripla a partir de qual semana da gestação?
- (A) 12^a
 - (B) 14^a
 - (C) 18^a
 - (D) 22^a
 - (E) 32^a
- 16) Em caso de necessidade de desfibrilação em um paciente com hipotermia, que cuidado deve ser tomado, para que o procedimento seja eficaz?
- (A) Corrigir a acidose metabólica.
 - (B) Administrar drogas antiarrítmicas.
 - (C) Ventilação mecânica com oxigênio umedecido.
 - (D) Reaquecimento do paciente.
 - (E) Monitorização e controle dos sinais vitais.

- 17) O Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-vacinação, do Ministério da Saúde, destaca as atribuições dos diferentes níveis do sistema de saúde com relação à notificação dos eventos adversos. Assinale a opção que apresenta uma atribuição em nível municipal.
- (A) Orientar os vacinados, familiares e/ou responsáveis.
 - (B) Notificar imediatamente ao nível nacional os casos graves.
 - (C) Detectar, notificar e definir conduta frente à eventual ocorrência de surtos de eventos adversos.
 - (D) Incentivar e apoiar os estados na análise de dados.
 - (E) Adotar medidas imediatas frente à ocorrência de surtos de eventos adversos.
- 18) A hipertensão intra-abdominal e a síndrome compartimental aguda geram alterações fisiológicas. Dentre as opções abaixo, assinale a que NÃO corresponde a essas alterações.
- (A) O aumento da pressão intratorácica.
 - (B) A diminuição da complacência pulmonar.
 - (C) A diminuição do pico de pressão inspiratória .
 - (D) A diminuição do fluxo celíaco e portal.
 - (E) O aumento da pressão venosa central.
- 19) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação dos povos indígenas, com quantos meses de idade é administrada a vacina varicela (atenuada) em crianças indígenas?
- (A) 5
 - (B) 6
 - (C) 9
 - (D) 12
 - (E) 15
- 20) Assinale a opção que apresenta sinais e sintomas de anafilaxia.
- (A) Hipotermia, bradicardia, tosse e prurido generalizado.
 - (B) Hipotermia, broncoespasmo, náuseas e taquicardia.
 - (C) Hemorragia, diarreia, vômitos e congestão nasal.
 - (D) Confusão mental, edema, bradicardia e congestão nasal.
 - (E) Prurido generalizado, taquicardia e congestão nasal.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 21) Para o controle e a prevenção da infecção são adotadas medidas baseadas na transmissão. As precauções adotadas contra a transmissão por grandes gotículas são utilizadas em casos comprovados ou suspeitos de
- (A) sarampo.
 - (B) varicela.
 - (C) tuberculose.
 - (D) impetigo.
 - (E) meningite.
- 22) Nenhuma vacina está livre totalmente de provocar eventos adversos, porém os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas do calendário de imunizações são muito menores do que os das doenças contra as quais elas protegem. Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, é INCORRETO afirmar que
- (A) a vacina BCG-ID pode causar, como evento adverso, linfadenopatia regional supurada e reação lupóide.
 - (B) a púrpura trombocitopênica pós-vacinal contraindica doses subsequentes da vacina contra a hepatite B.
 - (C) o principal evento adverso associado à vacina oral contra a poliomielite é a paralisia pós-vacinal, tanto no vacinado como no contactante.
 - (D) a vacina contra a febre amarela é constituída por vírus inativados e é contraindicada em crianças com menos de nove meses.
 - (E) é recomendado vacinar a tríplice viral em transplantados de medula óssea com o intervalo de dois anos após o transplante.
- 23) Quando os achados da radiografia de tórax são inconclusivos para o diagnóstico de doença pulmonar, a biopsia pleural poderá ser realizada, sendo empregadas várias técnicas não cirúrgicas.
- Assinale a opção que apresenta uma dessas técnicas.
- (A) Evocação brônquica transcateter.
 - (B) Toracoscopia videoassistida.
 - (C) Cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão.
 - (D) Broncoscopia terapêutica.
 - (E) Espirometria de incentivo.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 24) Com relação à hanseníase, assinale a opção correta.
- (A) Crianças com menos de um ano de idade, já vacinadas, não necessitam da aplicação de outra dose de BCG quando em contato intradomiciliar com portadores de hanseníase.
 - (B) Casos com mais de cinco lesões de pele são chamadas paucibacilar.
 - (C) A baciloscopia de pele negativa exclui o diagnóstico de hanseníase.
 - (D) A baciloscopia positiva classifica o caso de hanseníase como paucibacilar.
 - (E) A ocorrência de reações hansênicas contraindica o início do tratamento com poliquimioterapia.
- 25) De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, assinalando, a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.
- () Mulheres com mais de 64 anos e que nunca fizeram o exame citopatológico devem realizar dois exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
 - () O carcinoma mamário ductal *in situ* é uma proliferação epitelial neoplásica intraductal que respeita a barreira da membrana basal.
 - () É recomendado a mulheres de 50 a 60 anos a realização de mamografia a cada três anos, e o exame clínico das mamas anualmente.
 - () Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, não podem ser excluídas do rastreamento citológico, mesmo apresentando exames anteriores normais.
 - () O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode levar a resultados falso-positivos causados pela atrofia secundária ao hipoestrogenismo.
- (A) (V) (F) (F) (V) (F)
 - (B) (F) (F) (V) (F) (V)
 - (C) (F) (V) (V) (F) (F)
 - (D) (V) (V) (V) (F) (F)
 - (E) (V) (V) (F) (F) (V)

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 26) A hemorragia retroperitoneal que ocorre após uma intervenção coronária percutânea é caracterizada por
- (A) dor lombar e queda significativa do hematócrito.
 - (B) trombose da artéria no local da punção.
 - (C) estase causada pela turbulência do fluxo de sangue.
 - (D) comunicação entre uma artéria e uma veia.
 - (E) cavidade extraluminal em comunicação com uma artéria.
- 27) O Ministério da Saúde, em sua publicação sobre atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento, descreve as ações estratégicas da Área Técnica Saúde do Idoso com objetivo de promover o envelhecimento saudável e ativo. Assinale a opção que apresenta uma ferramenta de identificação de situações de risco potenciais para a saúde da pessoa idosa.
- (A) Oficinas estaduais de prevenção de osteoporose, quedas e fraturas de pessoas idosas.
 - (B) Caderno de atenção básica.
 - (C) Curso de aperfeiçoamento em envelhecimento.
 - (D) Curso de gestão em envelhecimento.
 - (E) Caderneta de saúde da pessoa idosa.
- 28) Um estiramento ou tração muscular é uma lesão em uma unidade musculotendinosa causada por uso, distensão ou estresse excessivo, enquanto a entorse é uma lesão nos ligamentos e fibras musculares de uma articulação causada por uma torção. Levando-se em consideração os três tipos de graduação de acordo com o grau da lesão, classifica-se como estiramento e entorse de segundo grau a ruptura
- (A) de mais fibras musculares, caracterizando-se por perda notável da força, edema, espasmo e equimose, instabilidade articular, hipersensibilidade.
 - (B) de algumas fibras musculares, com edema de menor gravidade, leve espasmo, sem perda de função.
 - (C) completa, com dor intensa, edema aumentado e movimento articular anormal com perda de função.
 - (D) de mais fibras, sem perda de função evidente, dor à movimentação, sem instabilidade articular.
 - (E) completa, com perda parcial da função, leve espasmo muscular e edema aumentado.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 29) Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. De acordo com o Ministério da Saúde, é correto afirmar que
- (A) a sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, sendo considerada como verdadeiro evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-fetal.
 - (B) recomenda-se a toda gestante, sempre que possível, a triagem para toxoplasmose por meio da detecção de anticorpos da classe IgG e, caso positivo, significa que a doença está ativa, devendo ser instituído o tratamento.
 - (C) de acordo com o protocolo do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), a gestante pode ser considerada imunizada com, no mínimo, duas doses da vacina antitetânica, sendo que a segunda dose deve ser realizada até trinta dias antes da data provável do parto.
 - (D) o risco de transmissão do HIV pelo leite materno é elevado, entre 7% a 22%, renovando-se a cada mamada, e a transmissão só ocorre pelas mães sintomáticas.
 - (E) durante o pré-natal, deverá ser realizado, no mínimo, cinco consultas, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e duas no último trimestre.
- 30) A anorexia nervosa é caracterizada por comportamento obstinado e proposital direcionado a perder peso, e a necessidade de assistência médica torna-se fundamental na ocorrência de
- (A) hipertermia, vômito, taquicardia, diarreia e lanugo.
 - (B) hipotermia, edema de membros inferiores, bradicardia, hipotensão e lanugo.
 - (C) hipertensão, edema palpebral, constipação, lanugo e vômito.
 - (D) hipotermia, hipertensão, edema de membros inferiores e lanugo.
 - (E) hipotensão, hipertermia, amenorreia e vômito.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 31) Segundo Malagutti e Kakiyama (2011), a Escala Preditiva de Braden é um instrumento de avaliação de risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão. Um cliente admitido no Serviço de Pronto-Atendimento de uma Unidade de Saúde teve sua pontuação nessa escala igual a 6 (seis). Considerando a classificação do grau de risco para desenvolvimento de úlceras por pressão, esse cliente apresenta um risco
- (A) mínimo.
 - (B) médio.
 - (C) moderado.
 - (D) alto.
 - (E) elevado.
- 32) Os inibidores do receptor de glicoproteína IIb/IIIa são drogas utilizadas em cardiologia intervencionista. Das opções abaixo, qual complicação está associada à administração dessas drogas?
- (A) Sangramento.
 - (B) Trombose.
 - (C) Infecção.
 - (D) Hipóxia.
 - (E) Hiperpneia.
- 33) Que condição obstétrica é caracterizada pelo desenvolvimento total ou parcial da placenta no segmento uterino inferior, com sangramento vaginal indolor?
- (A) Placenta prévia.
 - (B) Coriocarcinoma.
 - (C) Descolamento de placenta.
 - (D) Incompetência cervical.
 - (E) Mola hidanteforme.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 34) A política Nacional de Humanização estabelece que todos os profissionais de saúde façam acolhimento. Para determinar a agilidade no atendimento de pronto-socorro e centros de saúde, utiliza-se a avaliação com classificação de risco. O risco de um paciente com mais de 25% de superfície corporal queimada é classificado como:
- (A) amarelo.
 - (B) vermelho.
 - (C) azul.
 - (D) verde.
 - (E) branco.
- 35) Na infância, febre e mal estar, seguidos de 24 horas com coriza, tosse, conjutivite e pontos de Koplik na mucosa bucal, são sinais e sintomas de qual doença contagiosa?
- (A) Sarampo.
 - (B) Rubéola.
 - (C) Caxumba.
 - (D) Coqueluche.
 - (E) Catapora.
- 36) Os fármacos de uso compatível com amamentação são aqueles que seu uso é potencialmente seguro durante a lactação. Dentre os fármacos listados abaixo, qual faz parte dessa categoria?
- (A) Levopromazina.
 - (B) Clonazepan.
 - (C) Diazepan.
 - (D) Lorazepan.
 - (E) Gabapentina.
- 37) Na escala de coma de Glasgow, a resposta verbal inapropriada e a descerebração recebem a seguinte pontuação, respectivamente:
- (A) 5 e 1
 - (B) 4 e 4
 - (C) 3 e 2
 - (D) 2 e 3
 - (E) 1 e 6

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

38) São fatores predisponentes à infecção puerperal, EXCETO:

- (A) ruptura prematura de membrana.
- (B) infecção pré-parto e anemia.
- (C) lacerações das vias reprodutoras.
- (D) trabalho de parto precipitado.
- (E) hemorragia pós-parto.

39) Correlacione as Teorias da Administração às suas características.

TEORIAS	CARACTERÍSTICAS
I - Científica	() Determina com regras e normas o comportamento do administrador.
II - Clássica	() Considera as recompensas sociais no desempenho dos indivíduos.
III- Das Relações Humanas	() Preocupação com o comportamento organizacional.
IV - Burocrática	() Relação funcional entre variáveis dependentes e independentes.
V - Comportamentalista	() Ênfase na especialização do operariado como fator de produção.
VI - Dos Sistemas	() Caracteriza-se pela impessoalidade nas relações humanas. () As organizações são aceitas como subsistemas do sistema maior.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- (A) (II) (III) (V) (-) (I) (IV) (VI)
- (B) (III) (V) (-) (IV) (VI) (I) (II)
- (C) (II) (III) (-) (V) (I) (IV) (VI)
- (D) (II) (III) (V) (VI) (I) (IV) (-)
- (E) (I) (IV) (II) (III) (VI) (V) (-)

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 40) Em um atendimento pré-hospitalar, a vítima por trauma grave (com comprometimento do ABC), que está sentada e em uma cena sem segurança, deve ser retirada com uma técnica que englobe estabilização, alinhamento da cabeça e colocação do colar cervical. Sabendo que o tronco e os membros inferiores são controlados por outro profissional, assinale a opção que apresenta a técnica utilizada para retirar a vítima.
- (A) Retirada rápida.
 - (B) Imobilização tipo ked.
 - (C) Movimento em bloco.
 - (D) Alinhamento esternal.
 - (E) Bandagens elásticas.
- 41) Com relação à prevenção e controle das principais infecções hospitalares, de acordo com a publicação do Ministério da Saúde sobre Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: limpeza e desinfecção de superfície (2010), uma das abordagens do enfermeiro do trabalho é
- (A) Dinâmica de grupo.
 - (B) Prevenção de doenças ocupacionais.
 - (C) Prevenção de problemas posturais.
 - (D) Alimentação saudável.
 - (E) Apresentação de materiais e equipamentos.
- 42) Qual é a principal manifestação clínica da síndrome nefrótica?
- (A) Azotemia.
 - (B) Proteinúria.
 - (C) Tromboembolia.
 - (D) Edema.
 - (E) Sepsis.
- 43) As lesões musculoesqueléticas na criança apresentam importância devido aos aspectos próprios dessa população. A imaturidade e a flexibilidade do esqueleto da criança podem gerar um determinado tipo de fratura, definida como fratura
- (A) corretiva.
 - (B) patológica.
 - (C) por avulsão.
 - (D) em galho verde.
 - (E) por impactação.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 44) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo.
O planejamento é considerado uma função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos devem ser atingidos. Conforme a abrangência, um planejamento tático constitui-se de planos de _____ alcance, _____ e _____.
- (A) médio / menos genérico / mais detalhado
 - (B) longo / mais genérico / sintético
 - (C) médio / mais detalhado / analítico
 - (D) longo / menos genérico / mais detalhado
 - (E) longo / genérico / mais sintético
- 45) A máscara laríngea é um dispositivo para ventilação com o objetivo de permitir acesso às vias aéreas durante anestésias convencionais. Assinale a opção que apresenta uma complicação da utilização da máscara laríngea.
- (A) Edema de língua.
 - (B) Laceração do esôfago.
 - (C) Trauma de epiglote.
 - (D) Lesões das cordas vocais.
 - (E) Dor e pneumoperitônio.
- 46) De acordo com a publicação do Ministério da Saúde sobre Medidas de Prevenção de Infecção relacionada à Assistência à Saúde(2013), com quantos dias é recomendada a troca de um cateter umbilical venoso?
- (A) 4
 - (B) 6
 - (C) 12
 - (D) 14
 - (E) 28

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

47) Suponha que ao ser atendido em um serviço de Pronto-atendimento, um homem diz ter sido mordido por um cão sem suspeita de raiva. Em sua avaliação, o enfermeiro observa que esse homem possui ferimentos graves na cabeça, face e mãos. Considerando o esquema para tratamento profilático antirrábico humano com a vacina de cultivo celular, disponível no guia de bolso de doenças infecto parasitárias do Ministério da Saúde (2010), qual a conduta que deverá ser adotada?

- (A) Lavar os ferimentos com água e sabão, observar o animal e não tratar.
- (B) Iniciar o tratamento com duas doses da vacina, uma no dia da ocorrência e outra no terceiro dia.
- (C) Iniciar o tratamento com soro e cinco doses da vacina.
- (D) Iniciar imediatamente o tratamento com soro.
- (E) Iniciar imediatamente o tratamento com cinco doses da vacina.

- 48) Com relação aos transtornos de personalidade, correlacione os tipos de personalidade apresentados a suas características.

TIPOS DE PERSONALIDADE	CARACTERÍSTICAS
I - Paranoide	() São indivíduos com oscilação de humor, sintomas psicóticos e depressivos.
II - Esquizoide	() Caracterizam-se por exibir um padrão de reclusão social por toda a vida. São frios, não se envolvem com acontecimentos cotidianos e preocupações dos outros.
III- Borderline	() Caracterizam-se por suspeita e desconfiança persistente das pessoas em geral. São hostis, irritáveis e fanáticos.
IV - Narcisista	() Caracterizam-se por comportamentos excitáveis, dramáticos e extrovertidos, tendo alta necessidade de chamar a atenção.
V - Histriônica	() Apresentam um sentimento de autoimportância, com sentimento de ter direitos e privilégios, não sabendo lidar com as críticas.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- (A) (V) (IV) (I) (II) (III)
- (B) (IV) (III) (II) (I) (V)
- (C) (I) (II) (V) (III) (IV)
- (D) (III) (II) (V) (I) (IV)
- (E) (III) (II) (I) (V) (IV)

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15

- 49) A dobutamina é uma das drogas utilizadas no tratamento do choque em Unidades de Terapia Intensiva. Assinale a opção que apresenta uma das propriedades dessa droga.
- (A) Aumenta a resistência vascular periférica.
 - (B) Tem como efeito colateral a bradicardia.
 - (C) Pouco efeito beta-adrenérgico.
 - (D) Maior efeito alfa-adrenérgico.
 - (E) Apresenta ação inotrópica.
- 50) Anorexia, tetania, reflexos hiperativos e calcificações do tecido mole nos pulmões são sinais e sintomas de
- (A) hipercloremia.
 - (B) hipocalemia.
 - (C) hipercalcemia.
 - (D) hiperfosfatemia.
 - (E) hipofosfatemia.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : CSM-S/15