



HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

EDITAL 03/2015

501 - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha.

Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.

- Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o Caderno de Questões corresponde ao cargo em que está inscrito, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno ou outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **4h (quatro horas)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas **2h (duas horas)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção, e o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
- Os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, se esta corresponde ao cargo em que está inscrito e se a totalidade da quantidade de questões sobre as quais será avaliado está correta.
- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

05/2015



CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

501- GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA



CONCURSOS PÚBLICOS

Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no s

ursos.org.br) a partir do dia **19 de maio de 2015**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Vacina contra meningite B chega ao Brasil

A vacina é a primeira a prevenir contra as cepas do tipo B que afetam principalmente bebês e adolescentes

No dia 05/05/2015, foi lançada a primeira vacina contra meningite do tipo B no Brasil. Embora já existam no país vacinas contra os tipos A, C, W e Y da doença, essa é a primeira amplamente eficaz contra as cepas do tipo B. A meningite B é causada por uma bactéria (*Neisseria meningitidis*) e atinge principalmente bebês e adolescentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 53% dos casos de doença meningocócica diagnosticados em crianças com menos de cinco anos em 2014 foram causados pelo sorogrupo B.

Para Renato Kfourir, pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), a vacina chega ao mercado brasileiro como mais uma arma, e principal forma de prevenção, contra a doença meningocócica. “Essa é uma doença de evolução rápida e alta letalidade. No Brasil, a cada dez pacientes tratados, dois morrem da doença e cerca de 20% dos sobreviventes enfrentam sérias sequelas, como problemas neurológicos e amputações”, explica Kfourir.

A dificuldade do diagnóstico também é um problema para o tratamento e influenciam a alta letalidade da doença. “Os sintomas iniciais – dor de cabeça, febre alta, vômito, rigidez na nuca e prostração – podem ser facilmente confundidos com outras enfermidades, o que dificulta o diagnóstico e, conseqüentemente, atrasa o início do tratamento, diminuindo as chances de sobrevivência e, em casos de sucesso, aumentando os riscos de sequelas”, explica Kfourir.

O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, realizado com antibióticos, são fundamentais para controlar sua evolução.

Esquema vacinal – O esquema vacinal funciona da seguinte forma: para bebês de dois a cinco meses de idade, são necessárias três doses, com um intervalo de dois meses entre elas, além de uma dose de reforço aplicada entre 12 e 23 meses de idade.

Para crianças entre 6 e 11 meses, o indicado são duas doses, também com dois meses de intervalo entre elas e um reforço no segundo ano de vida. Já para indivíduos entre 1 e 50 anos, são indicadas duas doses, com dois meses de intervalo, sem necessidade de reforço.

[...]

Incidência no Brasil – De acordo com o Ministério da Saúde, em 2014 foram notificados 1.500 casos de meningite no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

De acordo com Marco Aurélio Safadi, infectologista do Hospital São Luiz Morumbi, o meningococos C é o principal responsável pelos casos da doença no país. No entanto, desde a inclusão da imunização contra meningite C na rede pública de saúde em 2010, a meningite B tem se tornado, proporcionalmente, a principal causa da doença.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza quatro vacinas para prevenção da meningite: a BCG, a pentavalente, a meningocócica C e a pneumocócica. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não existe um pedido de incorporação da nova vacina ao sistema público.

De acordo com Renato Kfourir, pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), em breve a vacina deve entrar no calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sbim.

<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/vacina-contra-meningite-b-chega-ao-brasil/>

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
 - I. Foi lançada, em maio deste ano, a vacina contra o tipo B de meningite. Antes, não havia nenhum tipo de vacina contra este tipo de meningite, causada por uma bactéria que somente atinge bebês e adolescentes.
 - II. Aproximadamente mais da metade dos casos de doença meningocócica diagnosticados em crianças com menos de cinco anos, tendo como base o ano de 2014, era do tipo B, segundo o Ministério da Saúde.
 - III. Os 1.500 casos de meningite no Brasil, notificados em 2014, nas Regiões Sul e Sudeste, eram do tipo C, principal responsável pelos casos da doença no Brasil. A meningite do tipo B começou a ganhar as mesmas proporções somente em 2015.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com o contexto, analise a frase transcrita do texto e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo do vocábulo destacado.

“Os sintomas iniciais – dor de cabeça, febre alta, vômito, rigidez na nuca e **prostração** [...]”

- (A) Convulsão.
- (B) Fraqueza.
- (C) Prurido.
- (D) Vermelhidão.
- (E) Epilepsia.

3. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a alternativa em que as palavras devam ser acentuadas, respectivamente, de acordo com as **mesmas** regras de acentuação das palavras apresentadas abaixo, transcritas do texto.

Rápida/ Ministério/ Saúde

- (A) Fanatico/ Ozonio/ saída
- (B) Ótimo/ história/ cateter
- (C) Amavel/ café/ anzol
- (D) Ambar/ jacare/ alguém
- (E) Umido/ torax/ viuva

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Minha filha estava animada para assistir ao espetáculo de fantoxes.
- (B) Sujei minha calça de pixe.
- (C) Analise o objetivo da coalizão.
- (D) Não hezite, faça o que deve ser feito.
- (E) Decidiu-se ler a respeito do plebissito.

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Tanto a mãe quanto o filho ficou surpreso com a decisão da Justiça.
- (B) Perto de 300 pessoas morreu com a queda do avião.
- (C) Na época da minha adolescência, costumavam-se ir a bailes na companhia dos pais.
- (D) Não se deve poupar esforços para ver o assassino atrás das grades.
- (E) Deve ter havido graves problemas na área financeira para a empresa ter falido.

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta.

- (A) As questões à seguir dizem respeito ao assunto sobre o qual estudamos ontem.
- (B) A loja concedia desconto de 15% à 70%.
- (C) Estamos abertos de segunda à sexta-feira.
- (D) Cheguei à casa do diretor com meia hora de antecedência.
- (E) Não dirijo a palavra à qualquer pessoa.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à colocação de pronomes, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos falaram que era tudo mentira.
- (B) Quem te disse isso?
- (C) É a pessoa que orientou-nos?
- (D) Jamais cumprimentam-se.
- (E) Nada falaram-me a respeito do novo funcionário.

RACIOCÍNIO LÓGICO

8. Sendo os conjuntos numéricos $A = \{6, x, 11, 16, y\}$ e $B = \{4, x, 11, 15, 20, 25\}$, e sabendo que $A \cap B = \{8, 11, 20\}$, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\frac{y^2}{x^2}$.

- (A) 0,16.
- (B) 0,64.
- (C) 2,50.
- (D) 4,75.
- (E) 6,25.

9. Foi realizada uma pesquisa sobre o salário de cada funcionário de uma empresa e os resultados foram dispostos na tabela abaixo.

Faixa salarial	Número de funcionários
Acima de R\$15.000	3
De R\$10.000 a R\$14.999	5
De R\$5.000 a R\$9.999	6
De R\$1.000 a R\$4.999	34
Abaixo de R\$999	11

É correto afirmar que o percentual de funcionários desta empresa que recebe salário abaixo de 5 mil reais é, aproximadamente,

- (A) 79,8%.
- (B) 76,3%.
- (C) 72,4%.
- (D) 65,3%.
- (E) 60,4%.

10. Em determinada escola, para que o aluno seja promovido para a série seguinte sem necessidade de cursar recuperação no ano seguinte, ele deve obter presença igual ou superior a 75% das aulas durante o ano vigente e média de nota igual ou superior a 7 (sete). Se o aluno cumprir apenas um desses requisitos, não importa qual, ele será promovido, mas precisará fazer recuperação durante todo o ano seguinte. Se o aluno não cumprir nenhum desses requisitos, ele ficará retido na mesma série e deverá cursá-la novamente no ano seguinte.

Ao término do ano letivo, analisou-se a situação de três alunos:

- I. Pedro terminou o ano com presença igual a 65% e média de nota igual a 7,5 (sete e meio).
- II. Ana terminou o ano com presença igual a 73% e média de nota igual a 6 (seis).
- III. Beatriz terminou o ano com presença igual a 96% e média de nota igual a 6,5 (seis e meio).

A respeito destes alunos, é correto afirmar que

- (A) nenhum deles foi promovido.
- (B) nenhum deles foi retido.
- (C) todos eles foram promovidos mas precisarão fazer recuperação no ano seguinte.
- (D) um deles foi retido na mesma série e os outros dois foram promovidos, mas precisarão fazer recuperação no ano seguinte.
- (E) um deles foi retido na mesma série, um deles foi promovido sem necessidade de fazer recuperação no ano seguinte e um deles foi promovido, mas precisará fazer recuperação no ano seguinte.

11. Uma loja tem a meta de vender 105 unidades de determinado produto no decorrer de um mês (30 dias). Nos primeiros 10 dias, foram vendidos o equivalente a $\frac{2}{5}$ dessa meta. Nos 10 dias seguintes foram vendidos mais $\frac{3}{7}$ da meta. Nos últimos 10 dias, foram vendidas 41 unidades do produto.

É correto afirmar que a meta

- (A) foi atingida e ultrapassada em 23 produtos vendidos.
- (B) foi atingida e ultrapassada em 4 produtos vendidos.
- (C) foi atingida exatamente.
- (D) não foi atingida por 2 produtos a serem vendidos.
- (E) não foi atingida por 11 produtos a serem vendidos.

12. Considere a seguinte sequência numérica:

3, 9, 21, 39, 63, ...

Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência.

- (A) 85.
- (B) 93.
- (C) 97.
- (D) 101.
- (E) 105.

13. O candidato de um concurso público está resolvendo uma prova que tem 3 horas de duração. Na primeira hora ele resolveu $\frac{1}{6}$ da prova. Na segunda hora ele resolveu mais

$\frac{7}{9}$ da prova. Assinale a alternativa que apresenta a fração da prova que resta para ser resolvida na terceira hora.

- (A) $\frac{1}{9}$.
- (B) $\frac{5}{18}$.
- (C) $\frac{1}{18}$.
- (D) $\frac{1}{6}$.
- (E) $\frac{5}{6}$.

POLÍTICAS DE SAÚDE/ LEGISLAÇÃO

14. Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, em algum momento, foi importante o combate à varíola por meio da "Lei da Vacina Obrigatória". Assinale a alternativa que apresenta o período histórico referente a tal fato.

- (A) República Velha (1889-1930).
- (B) Império (1822-1889).
- (C) Ditadura Vargas (1930-1945).
- (D) Governo de João Goulart (1961-1964).
- (E) Ditadura Militar (1964-1985).

15. A Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, em sua Quarta Diretriz, dispõe que as decisões do Conselho de Saúde, por regra – desconsiderando-se as exceções – devem ser aprovadas pelo seguinte tipo de quórum:
- (A) quórum simples (2/3 – dois terços – do total de membros do Conselho).
 - (B) quórum mínimo (metade mais um dos seus integrantes).
 - (C) quórum absoluto (número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes).
 - (D) quórum absoluto (2/3 – dois terços – do total de membros do Conselho).
 - (E) quórum qualificador (número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes).
16. De acordo com o artigo 199 da Constituição Federal de 1988, sobre assistência à saúde desenvolvida pela iniciativa privada, assinale a alternativa correta.
- (A) As instituições privadas podem participar de forma prioritária do Sistema Único de Saúde, por meio de contrato de direito público ou convênio.
 - (B) Às instituições privadas é proibida a participação do Sistema Único de Saúde, ressalvadas aquelas instituições constituídas antes da Constituição Federal de 1988, por meio de contrato de direito privado.
 - (C) As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito privado, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 - (D) As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito privado, tendo preferência as entidades com finalidade lucrativa.
 - (E) As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
17. Sobre o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/1990), acerca das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, assinale a alternativa correta.
- (A) São foros de pactuação, entre gestores e usuários, de aspectos eminentemente técnicos, dentre eles, operacionais, do SUS.
 - (B) São foros criados para dirimir conflitos, via arbitragem, entre gestores referentes aos aspectos operacionais do SUS.
 - (C) São foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS.
 - (D) São foros de negociação e pactuação entre usuários do SUS, sobre os seus aspectos operacionais.
 - (E) São foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, apenas em nível municipal.
18. Sobre a Conferência de Saúde, nos moldes do que dispõe a Lei nº 8.142/1990, a qual trata da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) É órgão executivo, com caráter permanente e deliberativo.
 - (B) Reúne-se a cada quatro anos com representação dos vários segmentos sociais com o intuito de avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
 - (C) Reúne-se a cada quatro anos, tendo natureza de órgão executivo, sendo composto apenas por representantes do governo e prestadores de serviço.
 - (D) É órgão permanente e deliberativo que tem, entre suas funções, avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde com caráter permanente e deliberativo.
 - (E) A Conferência de Saúde é órgão subordinado ao Conselho de Saúde, detendo função meramente consultiva.
19. De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras atribuições, sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale a alternativa correta.
- (A) A RENAME é apenas um parâmetro a ser considerado pelos Estados e Municípios, os quais podem lançar relações específicas e mesmo divergentes a ela.
 - (B) Não há qualquer impedimento das relações estaduais e municipais conterem medicamentos ainda sem registro perante a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), havendo apenas necessidade de comunicação à mencionada agência.
 - (C) O RENAME é de competência do Ministério da Saúde, no entanto, o Formulário Terapêutico a ser adotado é de competência estadual.
 - (D) O chamado Formulário Terapêutico Nacional (FTN) acompanha a RENAME, tendo, por intuito, subsidiar a prescrição, dispensação e uso dos medicamentos indicados nessa última.
 - (E) A atualização dos chamados Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, relacionados à RENAME, é de competência municipal, devendo ocorrer a cada dois anos.

20. Conforme se verifica da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 58.052/2012, que tratam de acesso às informações detidas por órgãos públicos a um particular, é correto afirmar que um prontuário médico de um hospital público estadual, é documento

- (A) privado, contendo informações consideradas pessoais, não podendo ter suas informações divulgadas nem mediante o consentimento do paciente.
- (B) público, contendo informações consideradas impessoais, portanto, podem ser apresentadas a quaisquer interessados.
- (C) público, contendo informações pessoais, somente podendo ser apresentadas mediante ordem judicial ou consentimento do paciente.
- (D) privado, contendo informações pessoais, somente podendo ser apresentadas mediante ordem judicial ou consentimento do paciente.
- (E) particular manipulado pelo órgão público, contendo informações impessoais e burocráticas, não havendo, portanto, necessidade de observar regra de sigilo.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)

21. Paciente de 55 anos relata perda de pequena quantidade de sangue vaginal após realização de esforço físico há dois anos. Possui como antecedentes mãe falecida por câncer endometrial, menarca aos 14 anos (ciclos regulares, intervalos de 30 com duração média de 5 dias, menopausa aos 50). Assinale a alternativa que **não** apresenta uma causa de sangramento uterino em mulheres na pós-menopausa.

- (A) Atrofia do endométrio.
- (B) Polipose uterina.
- (C) Neoplasia maligna de endométrio.
- (D) Mioma subseroso.
- (E) Hiperplasia do endométrio.

22. Assinale a alternativa correta em relação à doença inflamatória pélvica.

- (A) A ultrassonografia transvaginal apresenta alta sensibilidade e especificidade em casos leves e atípicos.
- (B) A cultura em células de McCoy é técnica preconizada para a pesquisa de infecções causadas por *Chlamydia trachomatis*.
- (C) O principal agente etiológico é a *Gardnerella vaginalis*.
- (D) Caso haja necessidade de intervenção cirúrgica, a culdocentese é o procedimento de escolha.
- (E) Na presença de DIU, este deverá ser retirado após o início da antibioticoterapia.

23. Sobre a vaginite inflamatória descamativa, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por corrimento vaginal, dispáurenia e presença de bactérias, fungos ou protozoários comuns aos corrimentos vaginais.
- (B) O penfigoide de membranas mucosas faz parte do diagnóstico diferencial.
- (C) O diagnóstico é realizado por meio do teste das aminas.
- (D) O Líquen plano erosivo não faz parte do diagnóstico diferencial.
- (E) Não existem estudos relacionando a vaginite inflamatória descamativa com a presença do *Streptococcus* do grupo B.

24. Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico do cancroide.

- (A) *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Klebsiella granulomatis*.
- (C) *Haemophilus ducreyi*.
- (D) *Treponema pallidum*.
- (E) *Mycoplasma genitalium*.

25. Sobre a Donovanose, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma de suas características é a ausência de acometimento dos linfonodos inguinais.
- (B) A sua característica clínica mais marcante é a presença das lesões ulcerosas extremamente dolorosas.
- (C) Preconiza-se o uso de ceftriaxona intramuscular em dose única como forma de tratamento.
- (D) A doença é transmitida exclusivamente pela via sexual.
- (E) O diagnóstico é feito pela dosagem sorológica de anticorpos em que se confirma a presença dos corpúsculos de Donovan.

26. Assinale a alternativa que apresenta a principal causa de Dismenorreia.

- (A) Endometriose.
- (B) Ansiedade.
- (C) Depressão.
- (D) Abuso sexual.
- (E) Dispareunia.

27. O climatério representa a transição do período reprodutivo (menacme) ao não reprodutivo (senectude). Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) No climatério, ocorre a diminuição da produção de hormônios estrogênicos pelo estroma ovariano.
- (B) Com o avançar da idade, o compartimento ovariano que permanece ativo é o estroma.
- (C) Com o avançar da idade, o compartimento ovariano que permanece ativo é a teca-folicular, que produz principalmente androgênios.
- (D) Com o avançar da idade, o compartimento ovariano que permanece ativo é o teca-folicular, ou seja, prevalece a síntese estrogênica e estroprogesterônica.
- (E) Prevalece a síntese estrogênica e estroprogesterônica pelo estroma ovariano.

28. Sobre o Câncer de mama, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal manifestação clínica é o fluxo papilar.
- (B) Os nódulos geralmente são dolorosos e situados com maior frequência em quadrante súpero-lateral.
- (C) A retração cutânea ou do mamilo decorre da infiltração neoplásica dos ligamentos de Cooper.
- (D) O tipo histológico mais comum de carcinoma de mama é o tubular.
- (E) O tipo histológico de pior prognóstico é o mucinoso.

29. Com relação ao trastuzumabe, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando a expressão do proto-oncogene HER-1 é positiva, preconiza-se o uso da droga.
- (B) A associação do trastuzumabe com taxanes não aumenta a sobrevida de pacientes com câncer de mama metastático.
- (C) Quando a expressão do proto-oncogene HER-4 é positiva, preconiza-se o uso da droga.
- (D) É administrado, semanalmente ou a cada 3 semanas, durante 1 ano.
- (E) Quando a expressão do proto-oncogene HER-3 é positiva, preconiza-se o uso da droga.

30. Com relação à puberdade precoce, assinale a alternativa correta.

- (A) A puberdade precoce central é mais comum em meninos.
- (B) A síndrome de McCune-Albright é classicamente heterossexual em meninas.
- (C) A síndrome de McCune-Albright não está associada a outras endocrinopatias.
- (D) A síndrome de McCune-Albright manifesta-se classicamente pela hipertrofia do clitóris.
- (E) A síndrome de McCune-Albright é classicamente definida pela tríade clínica de displasia fibrosa óssea, manchas café-com-leite na pele e puberdade precoce.

31. Assinale a alternativa **incorreta** sobre o câncer de colo uterino.

- (A) Os tipos virais do HPV mais frequentemente encontrados nas neoplasias invasoras do colo uterino são o 45 e o 31.
- (B) O pico de infecção pelo HPV ocorre entre 20 e 24 anos.
- (C) De maneira ideal, devem ser biopsiadas todas as alterações observadas ao exame colposcópico.
- (D) O estadiamento clínico, o tamanho do tumor, a invasão estromal e o comprometimento vasculolinfático são dados importantes para o prognóstico.
- (E) A colposcopia deve ser realizada em todos os casos em que a citologia se mostre duvidosa, sugestiva ou conclusiva para neoplasia.

32. A adenomiose caracteriza-se pela infiltração do endométrio entre as fibras do miométrio. Essa invasão dificulta a mobilidade e a contração uterina que, associada à secreção de prostaglandinas pelas células endometriais ectópicas, levam a sangramento intenso, culminando com a metrorragia. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A Ressonância magnética é considerada padrão ouro para o diagnóstico de imagem da patologia.
- (B) É incomum a história de manipulação uterina prévia.
- (C) O tratamento mais eficaz é a histerectomia.
- (D) A confirmação diagnóstica é feita com exame histopatológico.
- (E) Uma terapêutica alternativa é o dispositivo intrauterino (DIU) de levonogestrel, quando existe o desejo reprodutivo.

33. Assinale a alternativa correta sobre o sangramento uterino anormal.

- (A) O uso de tamoxifeno não faz parte do diagnóstico diferencial.
- (B) Em mulheres com menos de 40 anos, a principal hipótese diagnóstica é o adenocarcinoma de endométrio.
- (C) O uso de dispositivo intrauterino pode causar metrorragia.
- (D) A principal causa de sangramento uterino é o leiomioma subseroso.
- (E) A metrorragia é a manifestação clínica mais comum dos sangramentos uterinos disfuncionais.

34. Com relação à endometriose, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum em múltíparas.
- (B) É mais comum na raça negra.
- (C) Sintomas intestinais cíclicos, como dor para evacuar durante a menstruação, são incomuns.
- (D) As mulheres portadoras da patologia costumam apresentar dor e infertilidade.
- (E) A dispareunia de profundidade é incomum.

35. Sobre a embriologia dos órgãos genitais femininos, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A duplicação do útero ocorre pela falta de fusão dos ductos paramesonéfricos.
- (B) As células germinativas aparecem pela primeira vez entre as células endodérmicas do saco germinativo.
- (C) Os ductos paramesonéfricos desenvolvem-se nos ductos genitais principais das mulheres.
- (D) A atresia de um dos ductos paramesonéfricos pode causar atresia cervical.
- (E) A proteína SRY é o fator determinante do ovário.

36. Até o quarto mês de gestação são identificadas três porções da decídua. Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

- (A) A decídua capsular é muito vascularizada e responsável pela formação do cório liso.
- (B) A decídua basal é pouco perfundida e constituirá a porção materna da placenta.
- (C) A decídua *vera* é responsável pela formação do cório liso.
- (D) A estrutura da decídua é similar à do endométrio.
- (E) A decídua capsular constituirá a porção materna da placenta.

37. Quando existem indicações para antecipação do parto, opta-se pela indução do trabalho de parto. Assinale a alternativa que **não** apresenta uma contraindicação da indução do trabalho de parto.

- (A) Vício pélvico.
- (B) Placenta prévia.
- (C) Gestação múltipla.
- (D) Sorologia positiva para o HIV.
- (E) Pós-datismo.

38. A ocitocina é o principal e mais seguro método para a indução do trabalho de parto. Assinale a alternativa que apresenta uma complicação do uso da medicação.

- (A) Hiponatremia.
- (B) Hipernatremia.
- (C) Hipotonia uterina.
- (D) Bradissistolia.
- (E) Hipocalemia.

39. Sobre a infecção puerperal, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) É a principal causa de febre no puerpério.
- (B) O agente etiológico mais comum é o *Mycoplasma hominis*.
- (C) A cesárea, de forma isolada, é considerada o principal fator de risco.
- (D) Pacientes com febre, especialmente acima de 38,5°C, nas primeiras 24 horas pós-parto, devem ser tratadas para endometrite.
- (E) A rotura prematura de membranas é um fator de risco importante para o desenvolvimento da endometrite.

40. A doença hipertensiva específica da gravidez caracteriza-se pela presença de hipertensão arterial, edema e/ou proteinúria a partir da vigésima semana de gestação em pacientes previamente normotensas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria dos casos ocorre em mulheres múltíparas.
- (B) Ocorre com maior frequência em mulheres jovens.
- (C) A maioria dos casos ocorre em nulíparas.
- (D) A síndrome HELLP ocorre com maior frequência em mulheres de camadas socioeconômicas mais favorecidas.
- (E) A falta de assistência pré-natal não influencia na evolução da doença para formas graves.

41. Assinale a alternativa que apresenta o **principal** agente etiológico da corioamnionite pós ruptura prematura de membranas ovulares.

- (A) *Bacteroides sp.*
- (B) *Streptococcus* do grupo B.
- (C) Fusobactérias.
- (D) *Peptoestreptococcus*.
- (E) *Bacteroides fragillis*.

<p>42. Assinale a alternativa correta sobre a administração de imunoglobulina anti-D em gestantes Rh negativo com parceiro Rh positivo.</p> <p>(A) Deve ser administrada em gestantes, sensibilizadas, com 28 semanas de gestação.</p> <p>(B) Deve ser administrada após procedimento invasivo (cordocentese) e repetida no momento do parto.</p> <p>(C) Deve ser administrada após procedimento invasivo e repetida a cada 12 semanas até o parto.</p> <p>(D) Não está indicada em gravidez molar.</p> <p>(E) Não há indicação de administração quando ocorre óbito intrauterino.</p>	<p>46. Assinale a alternativa que apresenta o diâmetro útil de Pinard.</p> <p>(A) Diâmetro traçado do promontório até o ponto retrossinfisário de Crouzat.</p> <p>(B) Diâmetro traçado do promontório até borda superior da sínfise púbica.</p> <p>(C) Diâmetro que parte da eminência ileopectínica esquerda.</p> <p>(D) Diâmetro que parte da eminência ileopectínica direita.</p> <p>(E) Diâmetro situado entre as duas tuberosidades isquiáticas.</p>
<p>43. Assinale a alternativa que apresenta o principal fator de risco para o trabalho de parto prematuro espontâneo.</p> <p>(A) Antecedente de parto prematuro.</p> <p>(B) Mioma subseroso.</p> <p>(C) Ruptura prematura de membranas.</p> <p>(D) Malformações fetais.</p> <p>(E) Talassemia.</p>	<p>47. Sobre o sinal de Hunter, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) É a presença de máculas hipocrômicas em região facial.</p> <p>(B) É a hiperpigmentação da projeção da linha alba.</p> <p>(C) É a pigmentação periareolar.</p> <p>(D) É o eritema palmar.</p> <p>(E) Trata-se de telangectasias abdominais.</p>
<p>44. Com relação à amamentação, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) O leite materno contém grande quantidade de ferro.</p> <p>(B) A maior parte da gordura presente no leite materno fica depositada nos alvéolos anteriores da mama.</p> <p>(C) O leite de puérperas pré-termo apresenta redução de 15% da lactose.</p> <p>(D) A ocitocina é extremamente importante para a produção de lactose.</p> <p>(E) A amamentação aumenta os riscos de desenvolvimento de câncer de mama.</p>	<p>48. Considerando a toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) Gestantes com pesquisa de IgG e IgM negativas são consideradas suscetíveis e devem ter seguimento sorológico a cada oito semanas.</p> <p>(B) As gestantes suscetíveis devem receber orientações higienodietéticas.</p> <p>(C) A tríade clássica de sintomas da toxoplasmose congênita caracteriza-se por coriorretinite, hidrocefalia e calcificações intracranianas.</p> <p>(D) O risco de infecção fetal é diretamente proporcional à idade gestacional.</p> <p>(E) O risco de acometimento fetal é diretamente proporcional à idade gestacional.</p>
<p>45. Uma paciente com 33 semanas de idade gestacional apresentou sangramento vaginal indolor e abundante há uma hora. Ao exame: sinais vitais maternos normais; tônus uterino normal, sem contrações; frequência cardíaca fetal regular; apresentação cefálica, com o polo cefálico flutuante; o exame especular evidenciou colo uterino normal com tampão mucoso sanguinolento. De acordo com o quadro clínico descrito, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.</p> <p>(A) Carcinoma de colo uterino.</p> <p>(B) Descolamento de placenta.</p> <p>(C) Placenta prévia.</p> <p>(D) Trabalho de parto prematuro.</p> <p>(E) Ruptura da vasa prévia.</p>	<p>49. Sobre o manejo do diabetes gestacional, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) A necessidade de insulina mantém-se próxima da pré-gestacional, entre a 7ª e a 15ª semana de gestação.</p> <p>(B) A introdução da insulina se faz necessária quando o controle glicêmico não é atingido com medidas dietéticas e atividade física.</p> <p>(C) A dose de insulina regular é calculada de acordo com o peso materno, variando de 1,0 a 1,5UI/Kg/dia.</p> <p>(D) A dose de insulina NPH é calculada de acordo com o peso materno, variando de 1,0 a 1,5UI/Kg/dia.</p> <p>(E) História familiar de diabetes não é um preditor de necessidade de introdução de insulina em pacientes com diabetes gestacional.</p>

50. Considerando a infecção urinária durante a gestação, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O principal patógeno encontrado é a *Escherichia coli*.
- (B) A bacteriúria assintomática é a forma mais comumente encontrada.
- (C) Os quadros de pielonefrite geralmente são bilaterais e estão associados ao aumento da morbidade materno-fetal.
- (D) A maioria dos casos de pielonefrite ocorre no segundo e no terceiro trimestre.
- (E) As gestantes com pielonefrite devem ser tratadas em regime hospitalar, pelo menos no início do tratamento.

